



جامعة الدول العربية
المنظمة العربية للتنمية الزراعية

النباتات الطبية والعطرية
والسامة
في الوطن العربي



جامعة الدول العربية
المنظمة العربية للتنمية الزراعية

التبانات الطبية والعطرية
والستامة
في الوطن العربي

مع تحيات د. سلام حسين الهلالي

salamalhelali@yahoo.com

<https://www.facebook.com/salam.alhelali>

[https://www.researchgate.net/profile/
Salam_Alhelali?ev=hdr_xprf](https://www.researchgate.net/profile/Salam_Alhelali?ev=hdr_xprf)

07807137614



المحتويات

الصفحة

٣	تقديم
٥	الباب الأول :
٥	مقدمة
٩	نبذة تاريخية
١٢	مناطق الوطن العربي
١٣	تصنيف النباتات
١٤	الباب الثاني : النباتات الطبية
١٥	الفصل الأول : نباتات تحتوى على قلويدات
٧٠	الفصل الثاني : نباتات تحتوى على جليكوسيدات وصابونيات
١٤٥	الفصل الثالث : نباتات تحتوى على مواد مخاطية وصمغ ولبن نباتي
١٧٢	الفصل الرابع : نباتات تحتوى على راتنجات وبلاسم وتانينات
١٩٤	الفصل الخامس : نباتات طبية أخرى لا يعرف تركيبها على وجه الدقة
٢٢٨	الباب الثالث : النباتات العطرية
٢٣١	الفصل الأول : نباتات تحتوى على زيوت طيارة أو عطرية
٣٠٠	الفصل الثاني : نباتات تحتوى على زيوت ثابتة أو دهنية
٣٤٣	الباب الرابع : النباتات السامة
٣٨٠	الفهارس :
٣٨١	فهرس I : النباتات مرتبة في مجموعات حسب تركيبها الكيميائى
٣٩١	فهرس II : النباتات مرتبة حسب اسمائها العلمية
٤١٤	فهرس III : النباتات مرتبة حسب الفصائل النباتية التى تنتمى إليها
٤٤٤	فهرس IV : النباتات مرتبة حسب تأثيرها الفارماكولوجى
٤٧٥	المراجع :
٤٧٥	المراجع العربية
٤٧٦	المراجع الأجنبية
٤٧٧	فريق الدراسة

تقديم

بناء على قرار مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته العادية السادسة عشرة ببغداد في ٢٦ — ٢٨ يناير (كانون ثاني) ١٩٨٧ ، والذي أكد على إجراء دراسة شاملة عن النباتات الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربي ، تم تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين في هذا الموضوع لإجراء هذه الدراسة ، وتمهيدا لذلك وحتى يمكن تنفيذ الدراسة على الوجه الأكمل ، قامت الإدارة العامة للمنظمة بإعداد استبيان شامل وأرسلته لكل الأقطار العربية لتجميع المعلومات الضرورية عن هذه النباتات ، ولقد تلقت المنظمة معلومات قيمة من معظم الأقطار العربية .

اجتمع الفريق بمقر المنظمة بالخرطوم لدراسة وتحليل وتجميع بيانات الاستبيان والمصادر المختلفة ، وقد تم وضع تقرير شامل يتحوى على ثلاثة أبواب رئيسية ، بالإضافة إلى المقدمة والفهارس التفصيلية . وقد استعرضت المقدمة أهمية وضرورة إجراء هذه الدراسة ، ونبذة تاريخية عن دور ومعرفة النباتات الطبية والعطرية والسامة في الدول العربية ، وما ساهمت به الدراسات السابقة في مختلف العصور في هذا المجال .

وخصص الباب الأول للنباتات الطبية ، والتي قسمت إلى مجموعات حسب محتواها من المركبات الأساسية ، وهى : مجموعة النباتات التى تحتوى على قلويدات ، والنباتات التى تحتوى على جليكوسيدات ، النباتات التى تحتوى على اللبن النباقي والصمغ ، النباتات التى تحتوى على الراتنجات والبلاسم ، ومجموعة النباتات التى لم يعرف تركيبها الكيميائى على وجه الدقة ولكنها تستخدم فى الطب الشعبى .

أما الباب الثانى ، فخصص للنباتات العطرية والتى قسمت إلى مجموعتين حسب نوع الزيوت التى تحتويها ، وهى : مجموعة النباتات التى تحتوى على الزيوت العطرية ومجموعة النباتات التى تحتوى الدهون أو الزيوت الثابتة .

وفى الباب الثالث تم استعراض النباتات السامة حتى يمكن التعرف عليها واستبعاد أضرارها ، مع بيان الأهمية الطبية لبعضها .

ولقد تضمنت دراسة النباتات التى شملتها المجاميع السابقة والتى وصل عددها إلى ٢٥٥ نباتا ، أماكن وجود كل منها فى الوطن العربى وأماكن نشأتها ، ثم شرحا وافية لوصفها النباقي ، مع ذكر الأجزاء النباتية التى تستخدم طبيا ، وكذلك المواد الفعالة الموجودة فيها والتى أمكن

التعرف عليها ، ثم الأثر الطبى الذى تحدثه هذه المواد ، بالإضافة إلى ذكر ما جاء فى الموسوعات العربية الطبية عن هذه النباتات .

واختتم التقرير بأربعة فهارس مفصلة وشاملة لتعين الباحث أو القارئ فى الرجوع إلى النباتات التى يبحث عنها والحصول على المعلومات المطلوبة فى سهولة ويسر ، ولقد رتبت النباتات فى الفهرس الأول حسب المجموعات التى سبق ذكرها ، ورتبت فى الفهرس الثانى ترتيباً أبجدياً حسب أسمائها العلمية مع ذكر أماكن انتشارها فى الوطن العربى وتركيبها الكيميائى وطبيعتها إن كانت برية أو منزوعة ، وفى الفهرس الثالث رتبت النباتات حسب تأثيرها الفارماكولوجى ، أما فى الفهرس الرابع فرتبت النباتات حسب الفصائل النباتية التى تنتمى إليها هذه النباتات .

وإدراكاً من المنظمة لأهمية موضوع هذا التقرير ، ولفائدة المعلومات التى يكتونها للدارسين والباحثين على اتساع وطننا العربى ، فقد رأت طباعته فى صورة مرجع علمى لتعم الفائدة منه .

وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص شكرى وامتنانى لجميع معالى وزراء الزراعة العرب ولمعاونتهم على تعاونهم المقدر والذى ساعد فى إتمام هذه الدراسة على هذه الصورة الطبية ، كما يسعدنى أن أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء فريق الدراسة على هذا الجهد الكبير فى إتمام مهمتهم وإعداد التقرير النهائى القيم ، والذى نرجو أن يعم نفعه وفائدته بما يعود بالخير على وطننا العربى .
والله الموفق ؟

المدير العام

الدكتور حسن فهمى جمعة

الباب الأول

مقدمة

كان من نتيجة الزيادة الرهيبة في عدد سكان العالم وارتقاء الوعي الطبى والعلاجى بين الشعوب ، أن ازداد الطلب على العقاقير حتى وصل إلى حد الطفرات الهائلة ، وخاصة في السنين الأخيرة . وهناك مصدران أساسيان للعقاقير ، أولهما المواد الفعالة المستخلصة من النباتات الطبية ، وهى للأسف قليلة ولا تفى بحاجة الإنسان ومتطلباته ، لعدم الاهتمام بالنباتات الطبية ورعايتها والإكثار منها ، والمصدر الثانى هو المركبات الكيميائية المصنعة التى انتشرت وتنوعت كنتيجة للتطور العظيم في فروع الكيمياء المختلفة ، وكذلك في وسائل استخلاص المواد الفعالة من النباتات الطبية .

ولقد كان من المتوقع ، بعد انتشار العقاقير المصنعة وتنوعها ، أن يتراجع المرض وتزداد السيطرة عليه ، ولكن الذى حدث هو العكس تماما ، فقد عرف الإنسان الحديث أمراضا لم تكن معروفة من قبل ، بل ودخلنا عصر الأمراض المزمنة . وربما يرجع السبب في ذلك إلى عدة أمور ، منها أن الأدوية العديدة التى يتناولها المريض تعمل في أغلب الأحيان على اختفاء أعراض المرض فقط ، بينما يبقى المرض كامنا ليتحول إلى الحالة المزمنة ، بجانب أنها قد تؤثر على مناعته في مقاومة الأمراض الأخرى . لذلك فإن الأدوية المصنعة في المعامل ما زال الكثير منها يفتقر إلى معلومات أوفى ، وفي كل يوم تقدم لنا مراكز الأبحاث ، وكذلك منظمة الصحة العالمية ، كشفا جديدا عن الدور الخفى الذى تلعبه المخلفات الكيميائية التى صنعها الإنسان ، وعن آثار جانبية كثيرة ومعظمها خطر . وأصبحت هناك قائمة سوداء للأدوية السامة تزداد تدريجيا ، ويضاف إليها أحيانا بعض الأدوية التى أصبح استعمالها مألوف بين الناس ، ومن هذه العقاقير الكلورمايسين والنوفالجين والفالسيوم . ومن الأدوية الخطيرة والعقاقير الموجودة والشائعة ، وألتى تحدث آثارا جانبية عند الأطفال الرضع ، كنتيجة لتناول الأم كثيرا منها ، ونذكر على سبيل المثال المضادات الحيوية والأسبرين وأقراص منع الحمل والأدوية المعالجة لضغط الدم وأدوية علاج الحساسية والأتروين — الذى يضر بالكليتين ويسبب حدوث تشنج للرضع — والتندريل والبيتازولدين — الذى يؤدى إلى حدوث مشاكل في دم الرضيع — ومدرات البول التى تحدث جفافا واختلالا في الدم كذلك . بل إن الإنسان عندما استخلص

الجزء الفعال فقط من النباتات ، وتعرف على تركيبه الكيميائي وشيد مثله في المعمل وأعطاه للمريض في صورة مركزة على هيئة أقراص أو شراب أو حقن ، لاحظ أن لمثل هذا الدواء المصنع في كثير من الأحيان آثارا جانبية على جسم الإنسان ، بينما أرادت حكمة الخالق عز وجل أن تجعل تركيزات هذه المواد الفعالة في النبات مخففة سهلة ويمكن للأجسام التفاعل معها برفق في صورتها الطبيعية ، بجانب أن النبات الواحد قد يحتوى على العديد من المواد الفعالة التي تتعاون معا في معالجة المريض .

إن كل نبتة أو عشبة هي في الواقع صيدلية كاملة تحتوى على مواد فعالة تنوعت بنسب وضعها الله سبحانه وتعالى بحكمته وتقديره . فمثلا بالنسبة للبصل ، وهو من الأطعمة الشعبية المحبوبة والمعروفة في العالم أجمع ، قد نندهش إذا عرفنا أنه يحتوى على مواد هاضمة وأخرى تنظم احتراق واستهلاك المواد السكرية ، كما يفعل الأنسولين تماما ، كما يحتوى على زيت طيار عطري يكسبه رائحته الخاصة ، وهذا الزيت مطهر قوى المفعول يقتل الجراثيم ، كما يحتوى البصل كذلك على أملاح تقوى الأعصاب وأخرى تقى الشرايين من التصلب ، وهذا إلى جانب مواد تقوى بصيلات الشعر دون سقوطه . إن كل هذه الفوائد تختزن في بصلة واحدة ، فهل يمكن لعقار واحد مصنع أن يملك كل هذه الفوائد مجتمعة ؟ .

نحن لا يمكننا أبدا أن نتقص من حجم الانتصارات العظيمة التي حققها الطب الحديث ، ولكن بجانب ذلك فقد أثبتت البحوث أن لكثير من هذه العقاقير الطبية آثارا جانبية ضارة ، مما جعل المؤتمرات الطبية والصيدلية تنادى بضرورة الحد من تداول هذه الأدوية ، والعودة إلى النباتات الطبية والاهتمام بها ، بصفتها مصدرا آمنا لصناعة العقاقير .

وفي أمريكا والدول الأوربية ، بدأت توصيات هذه المؤتمرات تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي . وكانت الخطوة الأولى قيام فريق من العلماء بالبحث عن نباتات جديدة قد تكون مصدرا للدواء ، وذلك بدراسة النباتات المذكورة في المراجع المكتوبة والمصورة ، وكذلك دراسة النباتات المحفوظة في المعشبات ، والتي تحوى الملايين منها ، وجمع كل المعلومات عنها ، والتي دونها جامعوها بعد أن استقوها من أفواه سكان المناطق التي جمعت منها هذه النباتات . وكان من نتيجة ذلك اكتشاف نباتات جديدة لها فوائد طبية وأخرى اقتصادية لم تكن معروفة من قبل . وبجانب هذه الدراسات ، بدأ الاهتمام بالتعرف على الحكمة في استخدام العقاقير المعروفة لدى قبائل الهنود الحمر ، ومعرفة النباتات التي تستخدمها هذه القبائل في مداواة مرضاهم والتحقق من صلاحيتها . وكما هو موجود في الولايات المتحدة ، كذلك توجد نهضة علمية مماثلة في الاتحاد السوفيتي لدراسة النباتات التي تستخدم في الطب الشعبي والتي

يمارسها الفلاحون في قراهم ، كل ذلك من أجل اكتشاف نباتات طبية جديدة تغنيها عن استخدام العقاقير المصنعة .

وبالرغم من كثرة النباتات الطبية والعطرية ، البرية والمنزرعة ، في البلاد العربية ، ورغم ما لهذه النباتات من دور هام وبارز في إقامة صناعة الدواء والعطور وبعض الصناعات الأخرى ، بالرغم من ذلك ، فإن تنميتها والاستفادة منها لم تنظم على المستوى القومي حتى الآن ، ولا زالت الاستفادة منها تعتمد على الجهود الذاتية لبعض الأفراد الذين يصدرونها للخارج بهدف الكسب المادى فقط . وللأسف لا توجد أى رقابة على جمع هذه النباتات وطرق الاستفادة منها ، على الرغم من أهميتها في الطب الشعبى في البلاد العربية ، وما لها من تاريخ قديم . فقد استخدمها المصريون القدماء من قديم الزمان ، ويشهد على ذلك ما دونه المصريون في بردياتهم ، مثل برديات إيبيرز وإدوين سميث وهرست ، والمصريون هم أول من استخدم الأعشاب من أجل التداوى ، فقد استخدموا الخشخاش في علاج التهاب الأمعاء وتسكين الآلام ، والنعناع والمر لعلاج القروح والتهابات الجلد والاضطرابات المعوية ، وزيت الخروع لعلاج الإمساك وتقوية الشعر ، وقشر الرمان كطارد للديدان ، والحنظل لعلاج الإمساك وطرده للديدان ، وكل هذه النباتات لا زالت تستخدم حتى اليوم وفي نفس الأغراض .

أما العرب فيرجع إليهم الفضل في تأسيس أول مزاخر الأدوية (صيدليات) بدمشق ، والتي كانت تمتلئ بأوراق وجذور وأزهار وثمار وبذور النباتات . مثل السنمكى والكافور والجوز المقى والقرنفل وغير ذلك من النباتات . وهنا لا يمكن أن ننسى فضل علماء العرب ، فقد كان لهم باع طويل وواسع في مجال المعالجة بالنباتات . فابن سينا ألف كتابه المشهور « القانون » ، الذى قسم فيه الألم إلى ١٥ درجة ، وسجل لعلاج الأمراض ما يزيد على ٧٦٠ دواء . كما أن ابن البيطار هو أول عالم عربى ألم بخواص النباتات ، ووضع فيها كتابه « الجامع الكبير » ، الذى احتوى على ألفين من الوصفات ، ثم كتاب « المغنى فى الأدوية المفردة » ، وكتاب « الدرة البهية فى منافع الأبدان » . وكذلك أبو على يحيى بن جرلة الذى ألف كتابه « المنهاج » ، وجمع فيه أسماء الحشائش والعقاقير والأدوية . والرازى وقد وضع كتابا عن الأعشاب أسماه « كتاب الأبنية عن حقائق الأدوية » ، وقد وصف فيه ما يقرب من ٥٠٠ عشبة . وأخيرا كتاب دوايد الانطاكي « تذكرة داود » ، هذا الكتاب المشهور الذى يعرفه العامة قبل الخاصة ، ويعتبر دستورا للعلاج والشفاء ، وهو مرجع رئيسى لكل من يشتغل بالطب الشعبى .

وقد يعتقد البعض أو يظن أن الرجوع إلى استخدام النباتات الطبية في معالجة الأمراض إنما هو ضرب من التخلف والردة ، وربما كان من الممكن أن يجد هذا الرأى بعض القبول إذا كنا قد استطعنا بالفعل قهر المرض وإعادة الصحة وتخفيف آلام هؤلاء الذين يقاسون ويعانون المرض وويلاته ، ولكننا نرى عكس ذلك تماما . ففي أحيان كثيرة يقف الطب الحديث عاجزا ولا يملك أن يقدم لهم شيئا . ومع ذلك ، فنحن لا نستطيع بأى حال أن ننقص من حجم الانتصارات التى حققها الطب الحديث ، كما ذكرنا سابقا ، إلا أننا نحس حقيقة أننا بحاجة إلى ترشيد المسيرة العلمية في معالجة الأمراض وشفاء الأبدان . فقد ابتعدنا عن الطبيعة وسننها ، وبقدر ابتعادنا عنها بقدر شقائنا وآلامنا التى باتت تنخر في عظامنا بلا رحمة ولا شفقة ، ومن هنا كانت الدعوة المستنيرة للرجوع إلى الطبيعة والنباتات الطبية .

إن مستقبل صناعة الدواء في الوطن العربى يحتم علينا أن نفكر في هذا الموضوع بنظرة قومية لإقليمية ، بمعنى أن يكون التفكير على مستوى الوطن العربى كله . وإن مقومات نجاح هذه الصناعة متوافرة في الأقطار العربية ، ومنها الموقع الجغرافى المتميز ، والمناخ الملائم للبلدان العربية ، وتنوع النباتات الطبية في المنطقة العربية ، وتوفر الأيدى العاملة والخبرات العربية في مجال البحوث الدوائية والزراعية والصناعية .

وإن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشد بتقديم مثل هذا المؤلف العلمى القيم حفز هم المسئولين عن صناعة الدواء في الوطن العربى للاهتمام بتنمية النباتات الطبية والعطرية ، عن طريق دراسة النباتات الطبية البرية التى تنمو في وطننا العربى ، وجمع المعلومات عنها . من المراجع المنشورة ، ومن سكان المناطق التى تنمو بها ، والرجوع إلى التراث العظيم والكنوز الثمينة من مؤلفات الأقدمين ، والتى تموج ب ذخيرة من المعلومات ، وتشجيع الهيئات العلمية للاهتمام بهذه النباتات بتشجيع زراعتها وإرشاد المزارعين إلى طرق زراعتها والعناية بها . والحمد لله ، ففي بعض البلاد العربية اليوم العدد الكبير من الشركات الدوائية ، والتى يمكنها أن تساهم بقسط وافر في هذا الموضوع ، الذى سوف يغنينا مستقبلا عن استيراد الأدوية من الخارج ، مما يعود على البلاد العربية بالخير والنفع الوفير .

ويشمل هذا الكتاب وصفا واضحا لأهم النباتات الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربى ، برية ومزروعة ، مع ذكر موطنها في البلاد العربية ، كما يشمل شرحا وافيا للخواص الطبيعية والكيميائية لكل منها والجوهر أو المواد الفعالة فيها ، وتأثير هذه المواد فارماكولوجيا ، ثم ما كتبه العرب عن بعض هذه النباتات . كما يشمل الكتاب كذلك عددا من الفهارس للنباتات ، مرتبة حسب أسمائها العربية واللاتينية ، والفصائل التى تنتمى إليها ، وكذلك

حسب فوائدها الدوائية الفارماكولوجية والمواد الكيميائية التى تحويها هذه النباتات .

نبذة تاريخية

خلال الآلاف العديدة من السنين التى عاش فيها الإنسان على وجه الأرض ، جرب النباتات التى تنمو من حوله وخبر صفاتها وأحوالها ، مفتشا عن الطعام فى معظم الأوقات ، لكنه تعلم أيضا خلال تذوقه للنباتات أن بعضها بسبب له المرض وبعضها الآخر يمكن أن يشفيه ويبحث الألم منه . ولا شك أن أفراد الشعوب البدائية قد تعلموا أشياء كثيرة عن النباتات . وقد أعطى الله سبحانه وتعالى الحيوان الأعجمى خصائص غريزية ، يهتدى بها إلى هذه النباتات دون مرشد أو دليل ، كلما احتاج إليها فى علاج مرض طارئ أو هزال عارض ، مما جعل الإنسان يفكر كيف يستفيد من هذه الغريزة ومن تلك الخصائص وذلك بمرافقة هذه الحيوانات وتتبعها فى أكلها ومشربها كلما احتاج إلى الدواء أو الغذاء ، غير أن الخرافة والسحر كانا يمتزجان بالجهود الأولى التى كان يبذلها الإنسان . وفى الصين ، ظهر عام ٢٧٠٠ ق . م . أول كتاب طبى للأعشاب ، وأصبح هذا الكتاب أساسا لجميع المعلومات الصينية التى كتبت بعد ذلك عن النباتات ، وأشهرها كتاب « الأعشاب الكبير The Great Herbal » .

وفى بلاد بابل القديمة ، كانت المعلومات التى تتعلق بالنباتات المستعملة فى الطب تسجل على الأسطوانات الحجرية والطينية . وهناك ألواح مدون عليها ما يزيد على ٢٥٠ نباتا ، من بينها الكاسيا والهندباء والكمون والكرم والمر . وقانون حمورابى المحفور على الصخر ، والذى يرجع تاريخه إلى ١٧٢٨ ق . م ، ينص على استعمال النباتات الطبية لشفاء الكثير من الأمراض .

وفى مصر ، تدل الكتابات القديمة والصور الملونة على جدران المعابد والقبور ، وكذلك بقايا الأعشاب التى وجدت بالمقابر بجانب الجثث المخططة ، على استعمال هذه النباتات منذ ٣٠٠٠ سنة ق . م . وأهم مصادر المعلومات عن الطب المصرى القديم ، والعقاقير والتداوى بها ، جاء عن طريق مجموعات من لفائف البردى ، اكتشفت فى المقابر المصرية القديمة . وأهم هذه البرديات : برديات إيرز George Ebers ، وبرديات إدوين سمث Edwin Smith ، وبرديات هرست Hearst ، وبرديات برلين . ويعتبر « إيمحتب » أول طبيب فى العالم ، وقد استخدم الكثير من الأعشاب كالمر والأفيون والصبار والشوكران فى علاج المرضى . وفى مصر القديمة ، كانت هناك مدارس للطب ملحقة بالمعابد ، ولقد نالت المدرسة

المصرية الطبية القديمة شهرة عالمية ، وكان خريجوها موضع احترام العالم . وظل العالم كله يعالج مرضاه بنفس الطرق الفرعونية القديمة حتى حدثت ثورة الطب في بداية القرن التاسع عشر الميلادي .

أما عن العرب ، فيمكن تقسيم التاريخ الطبي عندهم إلى أربعة عصور :

(١) عصر ما قبل الإسلام (٢) العصر الإسلامي الأول

(٣) عصر العباسيين (٤) العصر الأندلسي

ولم يكن لدى العرب قبل الإسلام معلومات كثيرة عن الطب والتداوى . ولقد ذكر ابن خلدون أنهم اعتمدوا في علاجهم على نصائح شيوخ القبائل ، وقد نالوا بعض المعرفة من البلاد المجاورة مثل بلاد الشام والفرس خلال رحلاتهم إلى هذه البلاد بقصد التجارة .

وبعد ظهور الإسلام وفتوحاته التي امتدت من أسبانيا غربا إلى حدود الصين شرقا ، جاب علماء العرب هذه الأقطار ، والتحموا مع العلماء في هذه البلاد وجمعوا ودونوا ملاحظاتهم على الطبيعة عن النباتات ، كما ترجموا إلى العربية جميع الأعمال المصرية والفارسية . ويعزى إليهم الفضل في تأسيس مزاخر الأدوية (صيدليات) في بغداد التي كانت تمتلئ بالأوراق والجذور والأزهار والثمار والبذور ، والتي كانوا يستخدمونها لعلاج الكثير من الأمراض . وكانت بغداد عاصمة الخلافة أكبر المراكز العلمية في العالم . وكان الخلفاء محبين للعلم والعلماء ، وخاصة ما يتصل منها بالعلوم الطبية ، فشجعوا العلماء على ترجمة المراجع إلى العربية . وفي عصر الرشيد أنشئت مدارس الطب التي كانت تحوى المكتبات الزاخرة بالمراجع الطبية .

ومن أشهر علماء العرب :

— الرازى (٨٦٥ — ٩٢٥ م) — ألف ما يزيد على ٢٥٠ كتابا في مختلف المواضيع الطبية أهمها « الحاوى في الطب والأقربازين » .

— ابن سينا (٩٨٠ — ١٠٣٦ م) — كان فيلسوفا وطيبا وكتب كتابه عن النباتات الطبية والعقاقير وقد أعيد طبعه عدة مرات .

— البيروني (٩٦٥ — ١٠٣٨ م) — الذى كتب كتابه ودون فيه أسماء النباتات الطبية واستعمالاتها .

— الإدريسي (١١٠٠ — ١١٦٦ م) — أمير عربى وجوال كتب كتابه عن العقاقير .

— أحمد الغافقى (١١٦٤) — أشهر أطباء الإسلام ، كتب كتابه عن العقاقير « الأدوية المفردة » واعتمد فيه على تجاربه الشخصية .

— ابن البيطار — يعتبر من أهم علماء العرب في علم النبات ، عاش في القرن ١٣ الميلادي ، وسافر إلى بلاد الإغريق والروم والمغرب ليجمع كل ما جمعه العلماء من معرفة عن النباتات وعلسومها . ألف عددا من الكتب أهمها « الجامع في مفردات الأدوية والأغذية » ، وصف فيه ١٤٠٠ نوع من العقاقير ، منها ٣٠٠ نوع لم يسبقه أحد إلى وصفها . ترجم كتابه إلى اللغة اللاتينية ، وكان العلماء في أوروبا يعتمدون عليه بشكل أساسي حتى عصر النهضة الأوروبية .

— داود الانطاكي — وكان ضريرا لا يبصر ، وبالرغم من ذلك سمي بالبصير ، وأشهر مؤلفاته تذكرته المشهورة . إن جزءا كبيرا مما كتبه داود منقول عن كتب اليونان وخاصة « العقاقير المبسطة » للعالم اليوناني جالينوس .

ومن العرب تعلم الإغريق أشياء كثيرة عن طريق الكتابات المصرية والبابلية القديمة . ويعتبر « أبقرات » من أعظم علماء اليونان القدماء ، ويكفي أبقرات تخليدا أنه صاحب القسم الذي يردده الأطباء في أنحاء العالم قبل ممارستهم لمهنتهم . ومن علماء الإغريق تيوفراستس ، عالم النباتات والأعشاب ، وأهم أعماله كتاب الموسم .

لم يضيف الرومان شيئا من المعلومات يذكر عن النباتات الطبية ويزيد عما كتبه الإغريق القدماء ، لكن ديوسقوريدس ألف كتابا عن الأعشاب هو Materia medica ذكر فيه ٩٥٨ عقارا مع شرح فوائدها .

وفي القرن الثاني الميلادي ، كتب جالينوس الكثير من المؤلفات الطبية ، وقد بقي المصطلح جالينوس Galinical يستعمل حتى الآن في وصف المستحضرات المحتوية على مركبات عضوية دون الكيميائية الخالصة .

وبعد انتهاء العصور المظلمة ، جاء عصر العشابين Herbalists . وفي غضون هذه الفترة ، بقيت النباتات تزرع في حدائق الأديرة ، وتستعمل لعلاج المرض . وبعد اختراع الطباعة ، أخذت كتب الأعشاب تطبع في كل قطر من الأقطار الأوروبية . وباكتشاف أمريكا ، أضيفت مجموعة كبيرة من النباتات الطبية الأمريكية في كتاب « الأزتيكية Aztec Herbal » من تأليف مارتين دي لاكروز . وحينما استوطن الأوروبيون أمريكا ، وجدوا الهنود الحمر يستعملون نباتات أخرى مختلفة تماما عما كانوا يعرفونه ، فتعرفوا عليها وعلى صفاتها الطبية . على أن نسمة من الهواء المنعش قادمة من عالم العلم الرحيب أخذت تهب وتكتسح أمامها في القرن التاسع عشر ما كان معروفا من الأفكار البليدة حول الأدوية العشبية واستعمالاتها . وقد حدث هذا عندما أخذ الكيميائيون يستخلصون المركبات الفعالة من النباتات المختلفة ، مثل

الكينين من قلف شجر السنكونا والستركنين من نبات الجوز المقيء ، والأيميتين من نبات عروق الذهب ، والأثرويين من نبات ست الحسن ، والإيفيدرين من الإيفيدرا . وسرعان ما استخلصت من النباتات عدة مئات من المركبات الكيميائية الخاصة وصنعت على هيئة حبوب أو أقراص أو شراب .

ونظرا لازدياد الطلب على العقاقير ، لارتفاع الوعي الطبى بين الشعوب ، بدأ استعمال العقاقير المصنعة بدلا من العقاقير الطبيعية ، وللأسف كان من نتيجة استخدام هذه العقاقير ظهور آثار جانبية ضارة على المرضى ، مما دعى المؤتمرات الطبية إلى المادة بضرورة العودة إلى النباتات الطبية والخامات الدوائية الطبيعية ، والاهتمام بها بصفتها مصدرا آمنا لصناعة الأدوية ، والحد من تداول العقاقير المصنعة لخطورتها وتأثيراتها الجانبية .

مناطق الوطن العربى

لسهولة دراسة النباتات الطبية والعطرية والسامة فى الوطن العربى ومعرفة مواطنها ومدى انتشارها ، قسم الوطن العربى إلى أربع مناطق :

(١) المنطقة الأولى : وهى مجموعة الدول الواقعة شمال أفريقيا والمطلّة على البحر المتوسط وتشمل جمهورية مصر العربية ، الجماهيرية العربية الليبية ، الجمهورية التونسية ، المملكة المغربية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

(٢) المنطقة الثانية : وهى مجموعة الدول الواقعة شرق البحر المتوسط وشمل : الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية العراقية ، المملكة الأردنية الهاشمية ، لبنان وفلسطين .

(٣) المنطقة الثالثة : وهى مجموعة دول شرق البحر الأحمر وتشمل : المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة الكويت ، دولة البحرين ، دولة قطر ، دولة الإمارات العربية المتحدة .

(٤) المنطقة الرابعة : وهى مجموعة الدول الواقعة غرب وجنوب البحر الأحمر : وتشمل : جمهورية السودان ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، الجمهورية العربية اليمنية ، جمهورية الصومال الديمقراطية ، جمهورية جيبوتى .

تصنيف النباتات

- لسهولة الرجوع إلى النباتات المذكورة في هذا الكتاب ودراستها ومعرفة مكوناتها وفوائدها ، قسمت إلى ثلاث مجاميع رئيسية وهي :
- (١) مجموعة النباتات الطبية : وقد قسمت إلى :
- نباتات تحتوى على مواد قلوية .
 - نباتات تحتوى على جليكوسيدات .
 - نباتات تحتوى على راتنجات وبلاسم .
 - نباتات تحتوى على اللين النباتي والصمغ والمواد المخاطية .
 - نباتات أخرى لا يعرف تركيبها على وجه الدقة .
- (٢) مجموعة النباتات العطرية : وقد قسمت إلى :
- نباتات تحتوى على زيوت طيارة أو عطرية .
 - نباتات تحتوى على زيوت ثابتة أو دهنية .
- (٣) مجموعة النباتات السامة .

الباب الثاني

النباتات الطبية

هناك طرق عديدة لتصنيف النباتات الطبية :

(١) التصنيف الذى يعتمد على التركيب الكيميائى للمواد الفعالة الموجودة فى أنسجة النباتات .

(٢) التصنيف الذى يعتمد على الشكل الظاهرى للعضو النباتى وطبيعته والذى يستخلص منه العقار .

(٣) التصنيف الذى يعتمد على التأثير الفارماكولوجى للنباتات .

(٤) التصنيف الذى يعتمد على الفصائل المختلفة التى تنتمى إليها النباتات .

وفى هذا الكتاب اتبع التصنيف الأول ، وبذلك قسمت النباتات إلى المجموعات الآتية :

(أ) نباتات تحتوى على قلويدات Alkaloids .

(ب) نباتات تحتوى على جليكوسيدات Glycosides وصابونيات .

(ح) نباتات تحتوى على مواد مخاطية وصمغ ولبن نباتى .

(د) نباتات تحتوى على راتنجات وبلاسم وتانينات

(هـ) نباتات تستخدم فى الطب الشعبى للدول العربية ولم يعرف تركيبها على وجه الدقة .

ولقد خصص لكل من هذه المجموعات فصل مستقل .

الفصل الأول

نباتات طبية تحتوى على قلويدات

معنى القلويد :

القلويدات هي مواد نتروجينية عضوية قاعدية . وقد توجد القلويدات فى جميع أجهزة النباتات ، كما فى الداتورة *Datura stramonium* L. ، أو فى أجزاء خاصة من النبات ، فتوجد فى القلف كما فى نبات الرمان *Punica granatum* L. ، أو فى الجذور كما فى البلادونسا *Atropa belladonna* L. ، أو فى الثمار كما فى الفلفل الأسود *Piper nigrum* L. أو فى البذور كما فى الجوز المقيئ *Nux vomica* ، أو فى الأوراق كما فى السكران *Hyocyamus omaticus* L. ومن المعروف أن القلويد يتكون غالبا فى أى نبات فى عضو واحد أو عضوين خاصين منه وليس فى النبات كله ، فمثلا فى نبات الطباق *Nicotiana tabacum* يتكون القلويد فى الجذور ومنها ينتقل إلى الأوراق ولا تحتوى البذور على أى قلويد . وكذلك فى نبات الخشخاش يوجد قلويد المورفين فى الثمار ، بينما البذور تكون خالية منه ، وفى العكس *Colchicum autumnale* توجد القلويدات فى البذور والكرمات ، بينما فى الكينا تتجمع القلويدات فى القلف فقط . وفى بعض النباتات تتغير كمية القلويدات فى الأعضاء المختلفة للنبات أثناء مراحل نموه أو بين الليل والنهار ، بينما فى بعض النباتات الأخرى تزداد كمية القلويد فى العضو الخاص بزيادة عمر النبات .

توجد القلويدات فى النباتات المختلفة كألاح لبعض الأحماض العضوية مثل الأسيتيك Acetic والماليك Malic والأكساليك Oxalic والترتريك Tartaric والسكسنيك Succinic والتانيك Tannic .

وفى بعض النباتات توجد القلويدات متحدة مع بعض الأحماض ، كما توجد بعض القلويدات متحدة مع السكريات مكونة ما يسمى $gluco - alkaloids$ مثل السولانين الذى يوجد فى درنات البطاطس الصغيرة جدا .

تصنيف القلويدات :

تصنف القلويدات عادة حسب طبيعة وتركيب القاعدة التي اشتقت منها فتصنف إلى المجموعات الآتية :

(١) قلويدات Non - heterocyclic مثل الإيفيدرين ، والكابسيسين والنايكوتين .

(٢) قلويدات Heterocyclic وهي تحوى الكثير منها مثل :

١ — الهجرين والتريجونيلين واللوبلين والنيكوتين والفلفلفين والكونين وكلها تقع

تحت قسم Pyridine .

ب — وتحت قسم Tropane تقع القلويدات أترويين والهيسامين والكوكايين .

ح — وتحت قسم Quinoline تقع القلويدات الكينين والسنكونين والكسبارين .

د — وتحت قسم Isoquinoline تقع القلويدات البابافرين والنايكوتين والبربريدين .

هـ — وتحت قسم Purine تقع الكافيين والثيبرومين .

وفي دراستنا هذه سوف نرتب نباتات القلويدات حسب أسمائها اللاتينية .

وتحتوى بعض النباتات بجانب القلويدات على مواد تانينية Tanins أى مواد دباغية ، وتلعب هذه المواد دورا هاما فى تقبل الإنسان لبعض الأطعمة والفاكهة والمشروبات ، فهى تعطى بعض هذه الأطعمة نكهة طيبة وطعما لذيذا عند تذوقها . ومن ناحية أخرى ، تستخدم بعض هذه النباتات كمواد قابضة لعلاج الإسهال ، كما تستخدم فى علاج الحروق والجروح .

(١)

قيصوم (قيصوم — بعثران — حزمبل)

الاسم الإنجليزي : Lavender cotton

الاسم اللاتيني : *Achillea Fragrantissima* L.

الفصيلة : Compositae المركبة



(قيصوم)

موطن النبات : مصر ، ليبيا ، الكويت ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، فلسطين
والسعودية .

الوصف النباتي : عشب معمر عطر مغطى بزغب أبيض ، له أوراق صغيرة مستننة الحافة ،
وأزهار صفراء .

الجزء الطبي : العشبة كلها ، ما عدا الجذور .

الجوهر الفعال : يحتوى النبات على قلويد الأكيسين Achiceine ، والأكلين Achilleine ،
وقلويدات أخرى .

الأثر الطبي : تستعمل الأفرع المزهرة لطرد الديدان ولعلاج اضطرابات المعدة . وهناك

نوع آخر من هذا الجنس هو *A. Santolina* ينمو برياً في كثير من
البلاد العربية المطلة على البحر المتوسط ، ويمتاز بأوراقه المركبة ، وله
أزهار صفراء ، ويستعمل لتسكين آلام الأسنان ، وذلك بحك الأفرع
المزهرة الصغيرة بالأسنان المواجوعة ، أو مضغها . كما يستعمل النبات
كطارد للديدان وخاصة النوع الأول ، وكذلك لعلاج اضطرابات
المعدة .

وفي ليبيا ولبنان وسوريا والعراق ، ينمو نوع آخر من هذا الجنس هو *A. millefolium*
ويسمونه أخيليا ذات ألف ورقة . ويحتوى النبات على زيت
طيّار مع السينول Cineol ومواد دابغة ، وأخرى منقية للدم ، وتوقف
النزيف ، ومسكنة للتشنجات . وفي العراق يستخدمون الأوراق لعلاج
الدوستاريا وطرد الغازات . والنبات طارد للحشرات وخاصة الذباب .
ويستعمل عصير العشب الغض من الخارج لمعالجة تشققات حلقة الثدي
بعمله كمادات ، كما يستعمل مرهما لتسكين آلام البواسير .

(٢)

أندروسيميم (تيكوت)

الاسم الإنجليزي : Teqout

الاسم اللاتيني : *Androcymbium gramineum* L.

الفصيلة : الزنبقية *Liliaceae*



(اندروسيميم)

- موطن النبات : ينمو برياً على الأراضي الصخرية بمنطقة شمال أفريقيا كما ينمو بالعراق والأردن والإمارات .
- الوصف النباتي : نبات عشبي معمر له كرمات وأزهار بيضاء ، تظهر بعد فصل الشتاء وأوائل الربيع .
- الجزء الطبي : كرمات النبات .
- الجوهر الفعال : قلويد الكولشيسين .
- الأثر الطبي : تخفيف آلام النقرس والمفاصل ، وإذا أخذ من الباطن زادت كمية الصفراء . إلا أن مادة الكولشيسين قد ظهرت لها بعض الأعراض الجانبية الخطيرة ، مما حد من استعمالها في الطب الحديث .

(٣)

عنصل (بصل العنصل) الجراي ، العنصل

الاسم الإنجليزي : Asphedol



(عنصل)

الاسم اللاتيني : *Asphodelus microcarpus* Sohm

الفصيلة : الزنبقية *Lillaceae*

موطن النبات : سواحل البحر المتوسط من مصر إلى المغرب ، وكذلك في الكويت ، السودان ، السعودية ، والإمارات .

الوصف النباتي : نبات معمر له جذور درنية مغزلية ، والأوراق متجمعة على سطح الأرض يخرج منها الفرع الزهري الذي يحمل الأزهار البيضاء أو الوردية .

الجزء الطبي : الجذور الدرنية والبذور .

الجوهر الفعال : تحتوي الجذور الدرنية على *asphodeline, anthraquinones* ،

colchicine من وقليل aloe - emodin, microcarpine

الأثر الطبى : للأثر و كينون تأثير قابض وهو يعالج القرحات . وفى الكويت تستخدم البذور فى إنتاج نوع من اللبن المجفف .

وفى الكويت والسعودية ينمو برى النوع *Asphodelus fistulosus* ويعرف باسم بروق ، وهو نبات حولى ساقه قصيرة تخرج من قاعدتها أوراق عديدة ، لتكون خصلة قاعدية ، وجذور النبات ليفية . والشمرخ الزهرى يخرج من مستوى سطح الأرض ويتفرع ليحمل نورات عنقودية ، والثمار عليية .

وفى الكويت تستعمل البذور فقط ، حيث تجفف بعد جمعها من النبات لتحضير مسحوق ، إذا أضيف إلى الماء يعمل محلولاً أبيض اللون مثل اللبن يشرب كمسهل ، كما يستعمل خارجياً لعلاج القروح وعمل كمادات .

(٤)

بيلا دونا (ست الحسن)

الاسم الإنجليزى : Belladonna

الاسم اللاتينى : *Atropa belladonna* L.

الفصيلة : الباذنجانية *Solanaceae*

موطن النبات : آسيا وجنوب أوروبا . ويزرع اليوم كنبات طبى فى أماكن كثيرة من الوطن العربى .

الوصف النباتى : عشب له جذور سميكة ، تخرج منها أفرع هوائية ، تحمل أوراقاً خضراء داكنة بسيطة ، وأزهاراً محمولة على أعناق منحنية ، تخرج من آباط الأوراق الأرجوانية اللون ، والثمار لبية سوداء صغيرة ، وعصيرها شديد السمية والنبات عامة سام .

الجزء الطبى : الأوراق والسيقان الجافة .

الجوهر الفعال : قلويد الأتروبين والبلا دونين .

الأثر الطبى : من الظاهر تستخدم لإزالة الآلام ، ومن الداخل تستخدم لعلاج نوبات الربو والنزلات الشعبية ، والسعال الديكى ، والمغص المعوى ،



(بيلادونا)

والصرع ، كما أنها تساعد على تخفيف آلام القلب . ومن تأثيراتها أيضا ، أنها تعمل على اتساع حذقة العين ، ولمنع التصاق القرنية بالقرنية ، أو العدسة في حالة التهابها . كما أن السيدات الإيطاليات كن يضعن قطرة من عصير النبات في عيونهن لتولد فيها لعانا وبريقا ، والظاهر أنهم لم يكن يعبان بالغشاوة في النظر التي كانت تصحب ذلك . وكل أجزاء هذا النبات سامة ، فهو يسبب ارتفاع درجة الحرارة ، فيصبح الجلد حارا يابسا ومتوردا ، ثم يولد غشاوة في البصر ، ويسبب الهلوسة . وبالنظر لهذه الأعراض التي يولدها نبات البيلادونا يقال إنه « يجعل المرء حارا كالأرنب ، وأعمى كالخفاش ، وجافا كالعظم ، وأحمر كالبنجر ، ومجنونا مثل الدجاجة » . وقد اكتسب اسمه بيلادونا من كلمتين إيطاليتين هما (بيللا) بمعنى جميلة و (دونا) بمعنى سيدة .

(٥)

عود ريح مغربي

الاسم الإنجليزي : Berberis

الاسم اللاتيني : Berberis vulgaris L .

الفصيلة : البربريدية Berberidaceae

- موطن النبات : آسيا ، ويزرع في بعض البلاد العربية كمصر وليبيا وفلسطين ولبنان .
الوصف النباتي : شجيرة شوكية تحمل أوراقا مسننة وأزهارا صفراء في نورات مدلاة ،
وثمارا لبية حمراء ، وسماء ابن البيطار برباريس ، أو أمير باريس .
الجزء الطبي : لحاء وجذور النبات .
الجوهر الفعال : ثلاثة قلويدات هي :

Berberine

— البربرين (ك. ٢. يد ١٩ هـ ١٥)

Bermanine

— والبرمانين (ك. ١٨ يد ١٩ هـ ٣)

Oxigacanthine

— وأوكسيكانثين



(عود ريح مغربي)

الأثر الطبى : لعود الريج صيت عظيم عند العامة والعطارين فى الطب الشعبى ، ويوصف عادة لشفاء الكبد ومعالجة اليرقان ومداواة الحميات ، ويعطى لإيقاف الإسهال عند الأطفال ، والقيء عند الحوامل .
أما فى الطب الحديث ، فقد وردت عدة تقارير أنه يساعد على الهضم لطعمه المر ، كما يساعد على إفراز العرق وإدرار البول وخفض درجات الحرارة .

جاء فى تذكرة داود عن عود الريج ما يأتى :
« عود الريج ، أو الماميران ، يذهب المغص والرياح واليرقان والسدد شرابا ، ويقوى الأسنان مضغا ، ويحد البصر ويجلو البياض » .
وفى مكان آخر يقول :

« البربارس ، أو عود الريج ، شجرة كالتفاح حجما ، عليه قشر ، وهو حار يابس قابض ، يقوى المعدة والكبد ، ومع الزعفران يحلل سائر الأمراض ضمادا ، وماؤه يمنع الغثيان والقيء » .
وفى الطب الحديث تستعمل أيدروكلوريد البربارس فى علاج السيالان بالحقن فى مجرى البول ، أما النبات فيستعمل كقابض ومقو ومسهل ، كما يستعمل فى حالة التهاب الملتحمة ، وباطنيا لعلاج الملاريا والتيفويد .

وفى ليبيا والجزائر والمغرب يوجد نوع آخر من الجنس **Berberis** هو (**Berberis**)
B. hispanica وجنوره وسيقانه (القلف) مرة ، وهى مقوية وخاصة للمعدة ، وتستعمل لعلاج الحمى . كما يستعمل منقوع الجذور كحمام للعيون لعلاج التهاب وآلام العيون ، كما يشرب للتخلص من الفضلات وعلاج الأسقربوط .

(٦)

بقم

الاسم الإنجليزى : Sapan

الاسم اللاتينى : *Caesalpinia sappan* L .

الفصيلة : القرنية (تحت الفصيلة البقلية) *leguminosae*

موطن النبات : المناطق الاستوائية ، ولكنها تزرع اليوم فى كثير من البلاد العربية من أجل الزينة .



(بقم)

الوصف النباتي : شجيرة متساقطة الأوراق ، والأوراق مركبة ريشية ، ثنائية فردية الطرف ، والأزهار في نورات قائمة كبيرة عنقودية ، تحمل أزهارا برتقالية مصفرة أو حمراء مصفرة ، وتخرج الأسدية الطويلة الحمراء خارج الزهرة فتكسبها جمالا .

الجزء الطبي : القلف والبذور والخشب .
الجوهر الفعال : قلويد ، وتانين وصابونيات وفيتوستيرول .
الأثر الطبي : مغلى القلف يستخدم في إيقاف النزيف الدموي ، وخاصة في الرثتين ، وهو مقو ، ويعطى للسيدات بعد الولادة ، ويستخدم أيضا لعلاج الإسهال والدستاريا . أما البذور فهي علاج لأمراض المعدة ، لأنها مسكنة . أما الخشب فهو مصدر خشب السابان Sappan wood التجاري . ويوجد نوع آخر من هذا النبات يزرع في منطقة شمال أفريقيا C. gilliesii ، وهو من النباتات السامة .

(٧)

فلفل شطة (فلفل حار)

الاسم الإنجليزي : Cayenne pepper
الاسم اللاتيني : Capsicum annum L .
الفصيلة : الباذنجانية Solanaceae
موطن النبات : البرازيل وجزر الهند الغربية والشرقية . ويزرع اليوم في كثير من البلاد العربية كالعراق ، سوريا ، مصر ، وليبيا ، وتونس والسودان .
الوصف النباتي : نبات شجيري له أوراق بسيطة بيضية ، وأزهار بيضاء أو صفراء ، له ثمار لبية تشبه القرون ، والبذور عديدة صغيرة مبطنطة ، والثمار قرمزية أو حمراء برتقالية طويلة ، مخروطية ومبطنطة ، شديدة الحراقة .
الجزء الطبي : الثمار والبذور على هيئة مسحوق مجفف .
الجوهر الفعال : قلويد طيار حار الطعم يعرف بالكبسينين (ك ١٨ يد ٢٧ هـ ٣) Capsicin . وقلويد آخر سائل طيار ومواد راتنجية ، وزيت دهني ، وهو غني بفيتامين (C) .



(فلفل شطة)

الأثر الطبى : منه شديد للمعدة ويساعد على زيادة إفرازها ، وتستعمل الشطة لمنع الحمى ، وظاهريا لمقاومة الحساسية . كما تعمل على خفض نسبة السكر في الدم . تستعمل الشطة في المروخات والمراهم لعلاج الروماتيزم . واستعمالها المطبخية أكثر من أن تذكر كمشهيات .

(٨)

قات

- الاسم الإنجليزى : Arabian tea .
الاسم اللاتينى : *Catha edulis* Forssk .
الفصيلة : القاتية *Celastraceae* .
موطن النبات : السعودية واليمن والحبشة .
الوصف النباتى : شجرة تحمل أوراقا بسيطة ، متقابلة ، وأزهارا خضراء محمولة في نوريات



(قات)

راسيمية ، إبطية .

الجزء الطبى : الأوراق الخضراء الداكنة .

الجوهر الفعال : قلويد يشبه الكافين .

الأثر الطبى : منه شديد ومكيف .

نبات القات هو مكيف شائع فى بعض أجزاء الجزيرة العربية واليمن والحبشة ، وتستخدم الأوراق جافة أو تمضغ فى حالتها الغضة ، وربما عرف القات قبل الشاى والبن .

(٩)

ونكا — فنكا

الاسم الإنجليزي : Vinca

الاسم اللاتيني : *Catharanthus roseus* G . Don

Catharanthus herbacea (*Vinca herbacea*)

Catharanthus major (*Vinca major*)

الفصيلة : الدفلية *Apocynaceae*

موطن النبات : لا يعرف موطن النبات الأصلي ، ولكنه يزرع في معظم البلاد العربية كنبات زينة .

الوصف النباتي : عشب يتميز بوجود المادة اللبنة في أنسجته ، وله أوراق بسيطة متقابلة ، وأزهاره مفردة جميلة بنفسجة اللون باهتة ، يزرع من أجل الزينة . وللنبات شهرة قديمة في علاج بعض الأمراض كإدرار البول وإيقاف النزيف والثام الجروح وعلاج مرض السكر والدستاريا ، كما ذكر ديوسكوريدس عام ٥٠ ق . م وكذلك جالينوس ، واليوم كثرت البحوث على هذا النبات ، وقد أمكن فصل الكثير من القلويدات ذات التأثيرات الطبية الهامة منه .

الجزء الطبي : النبات كله .

الجوهر الفعال : كثير من القلويدات — تتوقف على نوع النبات — ، منها ، vincristine ، vinrosidine ، vinleurosine ، vinblastine موجودة في *Vinca rosea* أو *V . minor* في *Vicamine*، *Catharanthus roseus* L .

الأثر الطبي : يتوقف على نوع النبات فمنها ما يخفف الضغط وضد الانقباضات والتأثير على القلب والتنفس ؛ ولكن أهم التأثيرات الطبية التي اكتشفت لبعض هذه القلويدات هي تأثيراتها ضد أمراض السرطان وخاصة لوكيميا الأطفال .

قصة اكتشاف نبات الفنكا (أو الونكا) :

عندما عرف أن نبات الفنكا يعالج مرض السكر ، حاول بعض العلماء



(ونكا)

استخلاص عقار من النبات يؤخذ من الفم بديلا عن الأنسولين . قام بهذا العمل العالمان Noble and Beer بجامعة أونتاريو بكندا ، وكذلك العالمان Eli Lilly , svolboda من انديانوبولس بأمریکا ، ولكن للأسف بآء نتائجهم بالفشل ولحسن الحظ لاحظ العالمان الكنديان أن الخلاصة غير النقية للنبات تقلل من عدد كرات الدم البيضاء بشكل ملحوظ خاصة ganulocysts وكذلك تقلل من نشاط نخاع العظام في الفئران . ومن هنا بدأ البحث في تأثير leukoperic على خلايا اللوكيميا leukemia ، وأدى

ذلك إلى عزل Vincalaukoblastine بواسطة Noble ومساعديه . وكان تأثير الخلاصة على الخلايا السرطانية مذهلا . واختراع svolboda ومساعدوه طريقة استخلاص Vincalaukoblastine . وأخيرا اكتشف Lilly ومساعدوه العقار leurocristine وهذا العقار يعد اليوم العقار الوحيد الذى يقهر leukeonias أى سرطان الدم فى الأطفال .

(١٠)

عروق صفر (عروق الصباغين ، أو ممران)

الاسم الإنجليزى : Calandine

الاسم اللاتينى : **Chelidonium majus L .**

الفصيلة : الخشخاشية **Papaveraceae**

موطن النبات : إنجلترا وشمال أمريكا ، ويزرع فى بعض البلاد العربية كعقار .
الوصف النباتى : يحتوى على عصارة صفراء ، ويحمل أوراقا مركبة مجزأة إلى وريقات صغيرة ، وأزهارا صفراء ، وثمارا تشبه القرون ، طويلة تتفتح بواسطة مصراعين ينفتحان من أسفل إلى أعلى ، وسماه ابن البيطار حشيشة الخطاف .

الجزء الطبى : النبات كله .

الجوهر الفعال : قلويدات ، أهمها :


— الشيليدونين (ك . ٢ . يد ١٩ هـ ١٥ يد ٢) Chelidonine

— البربرين (ك . ٢ . يد ١٩ هـ ١٥) Berberine

— والهبرين Herberine

الأثر الطبى : تستخدم العروق الصفر فى مداواة اليرقان والسعال الديكى والنزلات الشعبية ، وفى قول آخر يستعمل الممران أو ممبرون (عروق صفر) كمسهل شديد مهيج ونافع لليرقان والسعال الديكى والنزلات الشعبية . كما ثبت أنه يخفض نسبة السكر فى الدم .

جاء فى تذكرة داود ما يأتى :



(عروق صفر)

« الفوة أو عروق الصباغين نبت طيب الرائحة وهو حار يابس يفتح السدود ويطرد الفضلات كلها وينفع في اليرقان والفالج وأوجاع الظهر والنسا والمفاصل شربا مع العسل ، ويقلع البهق طلاء بالخل ، ويحسن اللون ويصلح المعدة ، وهو يضر المثانة ويصلحه كثيرا ، ويضر الرأس ويصلحه ينسون » .

وجاء في كتاب الأدوية المفردة ما يأتي :

« عروق الصباغين هي العروق الصفرة وتستعمل في مداواة أصحاب اليرقان الحادث عن سد الكبد ، ويعمل منها شراب مع الينسون . وإذا دقت العروق ونثرت على الجروح والبثور جففتها وإذا مضغت كانت نافعة لوجع الأسنان ، وعصارتها نافعة في إجلاء البصر وإجلاء البياض » .

(١١)

بن (قهوة)

الاسم الإنجليزي : Coffee

الاسم اللاتيني : *Coffea arabica* L .

الفصيلة : البنية Rubiaceae

موطن النبات : تعد منطقة اليمن والحبشة الموطن الأصلي للنبات ، ثم أدخلت زراعته إلى دول أخرى في المناطق الاستوائية ووصل سيلان وجاوة والبرازيل .

وصف النبات : شجرة معمرة يتراوح ارتفاعها من ٤ — ١٠ أمتار ، دائمة الخضرة ، أوراقها ناعمة ، أزهارها بضاء ولها رائحة طيبة ، نجمة الشكل ،



وتتجمع في آباط الأوراق ، والثمار لبية لحمية صغيرة ، يكون لونها أخضر في بداية تكوينها ثم تتحول تدريجياً إلى اللون الأصفر ثم الأحمر أو القرمزي ، تحوى كل ثمرة من بذرة إلى بذرتين .

الجزء الطبى : البذور .

الجوهر الفعال : قلويد كافين Caffein والثيوبرومين Theobromine .

الأثر الطبى : للقهوة قيمة غذائية ضئيلة ، ولكنها أكبر من القيمة الغذائية للشاي ، فالبذور تحتوى على قليل من البروتين والسكر ، وآثار من الدهن . والقهوة منبهة للقلب وتساعد على إفرازات الكلى ، وتسبب إزالة الشعور بالتعب ولذلك فهي مفيدة في حالات الإجهاد العقلى والجسدى . ولاحتواء القهوة على التانين (حامض التنيك) ، وهو مادة قابضة ، فهي تؤثر على المعدة وتؤدى إلى الإمساك .

جاء في تذكرة داود عن البن ما يأتى :

« البن ثمر لشجرة باليمن وقد جرب لتخفيف الرطوبات والسعال البلغمى والنزلات وفتح السدود وإدرار البول وقد شاع الآن اسمه بالقهوة إذا حمص وطبخ وهو يسكن غليان الدم وينفع في أمراض الجدرى والحصبة ولكنه يجلب الصداع ويورث السهر وربما أفضى إلى المالمخوليا » .

(١٢)

عكته (سورنجان — خلّاح — خميرة العطار)

الاسم الإنجليزى : Meadow Saffron .

الاسم اللاتينى : Colchicum autumnale L. .


الفصيلة : الزنبقية Liliaceae .

موطن النبات : سواحل البحر المتوسط .

الوصف النباتى : هو عشب معمر له كرمات أرضية ، ويعرف أيضاً بزعفران المروج ، له أوراق شريطية ، وأزهار وردية اللون ، والثمار علبية .

الجزء الطبى : كرمة النبات والجذور الحديثة وكذلك البذور .

الجوهر الفعال : قلويد الكولشيسين (١٧٤ يدقه ه ا ه) colchicine



(عكنة)

الأثر الطبي : تخفيف آلام الروماتزم والنقرس ، وإذا أخذ باطنيا زاد من إفراز الصفراء ، وفي نفس الوقت يستخدم كمسهل . وينمو في ليبيا وتونس النوع . C . richii ويستعمل لنفس الأغراض .

جاء في تذكرة داود ما يأتي :

« السورنجان حار يابس يقطع البلغم . بالصبر يزيل عرق النسا ، وإذا عجن بالزعفران والبيض سكن وجع العظام ، وحلل الأورام وفتح السدود ويزيل اليرقان » .

وجاء في كتاب الأدوية المفردة للسلطان الأشرف يوسف بن عمر :

« السورنجان هو العكنة بالديار المصرية ، يسهل البلغم وينفع في وجع المفاصل والنقرس » .

السمية : نظرا لوجود القلويد colichicine في النبات فهو سام ، وأكثر الأجزاء سمية هي البذور والكرمات ، وتسبب حرقانا في الحلق والمعدة ينتج عنها القيء والإسهال وضعف في النبض والفشل الكلوى وضعف التنفس ، وأخيرا الوفاة .

(١٣)

داتورة (بنج طاطورة — فدة)

الاسم الإنجليزي : Thorn Apple

الاسم اللاتيني : *Datura stramonium* L .

الفصيلة : الباذنجانية *Solanaceae*


موطن النبات : يوجد النبات في الحقول والأماكن المهملة في جميع أنحاء العالم ومنها البلاد العربية كمصر وليبيا وتونس والجزائر والسودان ولبنان وفلسطين والسعودية .

الوصف النباتي : عشب حولي خشن له رائحة كريهة ، يصل ارتفاعه من (٣٠ — ١٥٠ سم) . وأوراقه بسيطة متعرجة الحافة ، والأزهار بيضاء كبيرة وطويلة كالبوق ، والثمار علبة شوكية تحوى بذورا صغيرة سوداء كلوية الشكل .

الجزء الطبي : الأوراق الجافة والأطراف المزهرة .

الجوهر الفعال : قلويد الداتورين وهو عبارة عن خليط من الأتروبين والهيوسيامين .. كما يوجد مركب الإسكوبولامين Scopolamine الذى يستعمل للتخدير الجزئى عند الولادة ، ولمعالجة دوار البحر والطيران . ويعرف العقار بالسترامونيم *Stramonium* .

الأثر الطبي : يستعمل العقار كبديل للبيلايدونا ، لإراحة عضلات الصدر في حالات الأزمات الصدرية ، كما يستعمل لتأثيره المخدر ولذلك تستخدم الأوراق والبتلات في علاج الربو ، فتدخن في لفائف أو تسحق ويشعل المسحوق



(داتورة)

ويستنشق الدخان المتصاعد . والداتورة لها بعض التأثير المنبه على خلايا المخ .

جاء في تذكرة داود عن الداتورة ما يأتي :

« الداتورة زيت يشبه زيت الباذنجان وله زهر أبيض ، والمستعمل منه بذور داخل الثمرة ، وهو يخفف الرطوبات ويشد الأعضاء المسترخية وإذا طبخ بالخل والعسل وطلّى به حلل الأورام والاستسقاء » .

توجد أنواع كثيرة من جنس الداتورة في الوطن العربي ، أهمها :

١ — **D . metel L** . وتمتاز بأوراقها البيضاء ، وتحتوي على قلويد **Meteloidine** بالإضافة إلى الهايوسين والهايوسيامين .

٢ — **D . ferox L** . تختلف عن الأنواع السابقة في شكل الثمرة ، ولا تحتوي على الأتروين بل تحتوي على قلويد مثيل أيودين .

(١٤)

أيفيدرا (جاشية — عدام — العاذر — علنده)

الاسم الإنجليزي : Ephedra (Ma - huang)

الاسم اللاتيني : *Ephedra alata* Decne

الفصيلة : الإيفيدرية Ephedraceae

موطن النبات : قطر — البحرين — السعودية — العراق — الأردن — مصر — ليبيا — تونس — الجزائر والمغرب .

الوصف النباتي : نبات ضعيف الساق ، يميل عادة على نبات آخر ، أوراقه أثرية ، وأفرعه خضراء رفيعة . يحمل النبات مخاريط وحيدة الجنس حمراء ، أو صفراء . والنبات مستساغ جدا للحيوانات ، الأمر الذي يجعله عرضة للرعى الجائر مما قد يؤدي إلى انقراضه .

الجزء الطبي : السيقان والثمار .



(إيفيدرا)

الجوهر الفعال : قلويد الإيفدرين بنسبة ٤٠٪ من مجموع القلويدات الأخرى .
الأثر الطبي : علاج نزلات البرد والأنفلونزا والأزمات الصدرية ، والحمى الربيعية ،
ومعالجة الربو ، واحتقان الأنف والحنجرة والصدر . إلا إنه ينبه الجهاز
السمبتاوى مما يؤدى إلى زيادة ضربات القلب وتنبيه الجهاز العصبى مسببا
للأرق .

(١٥)

كليلة (فيوماريا — شاتراج — بقلة الملك)

- الاسم الإنجليزى : Common fumetory
الاسم اللاتينى : *Fumaria officinalis* L .
الفصيلة : الفيومارية *Fumariaceae*
موطن النبات : ينمو النبات برياً على سواحل البحر المتوسط فى مصر وليبيا .
الوصف النباتى : عشب حولى ضعيف الساق ، له أوراق مفصصة ، وأزهار بنفسجية أو
حمراء فى نورات راسمية .



(كليلة)


- الجزء الطبى : النبات كله .
الجوهر الفعال : يحتوى النبات على حامض الفيوماريك Fumaric acid وتانينات ، وسكر ، ومواد معدنية ، وخاصة أملاح البوتاسيوم بالإضافة إلى قلويد الفيومارين Fumarine والبروتوبين protopine .
الأثر الطبى : علاج شافٍ ضد الإكزيما والالتهابات الجلدية . والنبات قابض ومعرق ومقوى ومدر للبول ، وهو ينظم وينشط إفراز الصفراء . أثبت التجارب أن القلويدات الموجودة فى النبات تخفض من ضغط الدم على حيوانات التجارب . وفى شمال الأردن ينمو النوعان *F. parviflora* ، *F. densiflora* برىا ، كما ينمو النوع الثانى برىا فى المملكة السعودية . وفى ليبيا ينمو النوع *Fumaria capreolata* L . برىا ويحتوى أيضا على قلويد الفيومارين *fumarine* ، *protopine* وأملاح البوتاسيوم وتانينات ، وهو يستعمل فى نفس أغراض النوع *F. officinalis* .
وفى الكويت والإمارات ينمو النوع *F. parviflora* ويسمونه بقللة الملك ، ويستعمل فى الطب الشعبى لعلاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما وذلك بعمل كمادات . كما يستعمل كمستحلب لعلاج أمراض اللوز والتهاب المرارة والبواسير .

(١٦)

قرن الجديان (نعمان)

- الاسم الإنجليزى : Yellow horned poppy
الاسم اللاتينى : *Glaucium flavum* Grantz
الفصيلة : الخشخاشية *Papaveraceae*
موطن النبات : ليبيا ومصر .
الوصف النباتى : عشب حولى أو ثنائى الحول . له عصير يرتقالى ؛ والأوراق مفصصة . والأزهار صفراء ذهبية أو برتقالية ، والثمار علبة ضيقة .
الجزء المستعمل : النبات كله .

الجوهر الفعال : لقد استخلص من هذا النبات حوالي ٣٥ قلويدها أهمها :
. protopine , glaucine



(قرن الجديان)

الأثر الطبي : القلويد المستعمل طبيا هو Glaucine ويستخدم لعلاج الكحة ومخفض لضغط الدم ومضاد للأدرينالين .
وفي مصر يوجد من الجنس **Glaucium** أربعة أنواع برية أكثرها انتشارا **G . corniculatum** . وفي المملكة العربية السعودية ينمو النوع **G . arabicum** . وهذه الأنواع تحتاج إلى دراسة لمعرفة مكوناتها .

(١٧)

سكران (بنج — الفلزلز)

الاسم الإنجليزي : Henbane

الاسم اللاتيني : *Hyoscyamus muticus* L .

الفصيلة : الباذنجانية *Solanaceae*

موطن النبات : مصر ، العراق ، ليبيا ، لبنان ، السودان ؛ السعودية والإمارات ، الكويت ، تونس والجزائر . ويزرع اليوم في كثير من بلاد العالم .

الوصف النباتي : عشب ثنائي الحول وأحيانا حولي أو معمر تغطيه شعيرات ، ورائحته كريهة يحمل أوراقا كبيرة بيضية ومفصصة أو متكاملة ، وأزهارا بنفسجية غامقة ، والبتلات ذات عروق أرجوانية ، والثمرة علبه تحتوى على بذور سوداء .

كان البابليون يستعملونه بكميات قليلة لتخفيف آلام الأسنان ، كما كان معروفا أيضا بكونه مولدا للنوم والهلوسة .



(سكران)

الجزء الطبى : الأوراق والأطراف المزهرة .
الجوهر الفعال : عدة قلويدات منها الهيسيامين والسكوبولين والأثروبين .
الأثر الطبى : مادة تساعد على ارتخاء العضلات وتأثيرها يشبه تأثير الداتورة ، وتستعمل أيضا فى حالات الربو والمغص الكلوى .
جاء فى تذكرة داود ما يأتى :

« البنج هو السكران وهو يخلف حبا أسود وأصفر وأحمر وكلها فى أقماع . وهو بارد يابس يسكن الصداع المزمن وآلام المغص والنقرس والنسا إذ طبخ بالخل ، وأوراقه تذهب الحمى شربا ويسكن ورم العين ضمادا ، ويذهب بالسعال مطبوخا بالتين ومعجوننا بالعسل ووجع الأسنان تغرغرا بالخل وهو يخلط العقل ويصلحه القيء باللبن والعسل والماء » .

وفى الطب الشعبى تسخن الأوراق وتوضع على العينين لزوال آلام .
يرجع استخدام السكران فى الطب إلى قديم الأزمان فقد ذكره المصريون فى أوراق البردى التى يرجع تاريخها إلى ١٨٠٠ ق . م وذكره سقراط وابن البيطار فى مؤلفاتهما ووصفه ديوسكوريدس بصفة جلية كدواء .
وتوجد فى البلاد العربية أنواع أخرى من السكران لها نفس الخواص المذكورة تقريبا نذكر منها :

H . pusillus L . , H . albus L . , H . desertorum L .

(١٨)

جهيرة (قرين الجديان)

الاسم الإنجليزى : Horned cumin
الاسم اللاتينى : *Hypocoum procumbens L .*
الفصيلة : الخشخاشية *papaveraceae*
موطن النبات : ليبيا ومصر .
الوصف النباتى : عشب حولى يحوى عصارة صفراء والأوراق مركبة ثنائية وأجزاء الورقة صغيرة وقصيرة ، والأزهار صغيرة صفراء مفردة والثمرة ضيقة تشبه الخردلة ومجزأة .



(جھيرة)

- الجزء الطبى : النبات المزهى .
الجوهر الفعال : قلويد protopine وقلويدات أخرى .
التأثير الطبى : للبرتوبين تأثير (antiarrhythmic) ضد الروماتيزم ، وعصير النبات له تأثير مخدر مثل تأثير الأفيون ، والأوراق مدرة للبول
وفى مصر ينمو برى عدد من أنواع *Hypecoum* أهمها *H . egyptiacum*
وفى السعودية والكويت ينمو النوعان *H . gcslenii* و *H . pendulum* ولا يعرف تركيبهما الكيمىائى .

رقف (خميرة الدار — قبقاب — عسلج)

الاسم الإنجليزي : Lion's leaf , leontice

الاسم اللاتيني : *Leontice leontopetalum* L .

الفصيلة : البربريدية *Berberidaceae* القبقابية (*Leonticaceae*)

موطن النبات : ينمو برياً على سواحل البحر المتوسط ، في مصر وليبيا كما ينمو في وادي العريش ورفح وصحراء سيناء .



(رقف)

الوصف النباتي : النبات عشب له ريزومة درنية ، وله أوراق مركبة (ثلاث وريقات) ، وله أزهار صفراء محمولة على نورات راسمية مركبة طرفية ، والثمار كروية منتفخة ، حمراء اللون عند النضج .

الجزء الطبى : الجذور والأوراق .
الجوهر الفعال : يحتوى النبات على قلويدات ، أهمها ليونتسين Leonticine البيبتالين petaline .

الأثر الطبى : تطحن الجذور الدرنية ويدهن بها صدر السيدات المرضعات لإدرار اللبن ، كما تستخدم فى علاج الصرع . أما منقوع الورق فهو مقو . ومسحوق الأزهار يوضع على الحروق ، كما يمزج باللبن لعلاج الأمراض الجلدية والجروح .

(٢٠)

ترمس (باقى)

الاسم الإنجليزى : Lupin

الاسم اللاتينى : Lupinus albus L ., Lupinus termis L .

الفصيلة : البقولية (القرنية) Leguminosae

موطن النبات : من المرجح أن يكون موطنه جنوب أوروبا والشام ، ويزرع اليوم فى كثير من البلاد العربية من أجل بذوره التى تؤكل نيئة أو مسلوقة .

الوصف النباتي : عشب حولى له أوراق مركبة راحية وله أزهار متجمعة فى نورات راسمية ، والأزهار إما بيضاء أو صفراء حسب النوع والصنف ، والثمرة قرنية صغيرة ومنضغطة ، والبذور بيضاوية مبططة صفراء .

الجزء الطبى : البذور .

الجوهر الفعال : قلويد لوبينين Lupenin ولوبيندين Lupindin

الأثر الطبى : تعد بذور النبات علاجاً لمرض السكر ، حيث تعمل على تخفيض نسبة السكر فى الدم ، وطارداً للديدان ، ومقويا للكبد ، وتستعمل البذور لعلاج التهابات الجلد ، وحب الشباب ، كما أنه يساعد على سرعة الشام العظام المكسورة . وقد استخلص عقار جديد يساعد على منع الحمل دونما



(ترمس)

إحداث آثار جانبية من هذا النبات . عرف المصريون القدماء الترمس وعثر على بذوره في مقابر دراع أبو النجا بطيبة من عصر الدولة الحديثة وكوم أوشيم من العصر اليوناني .
ويوجد في منطقة شمال أفريقيا نوع من الترمس *L. varius* يعد من النباتات السامة ، ومن أعراض التسمم به هبوط في الجهاز التنفسي وتضخم في القلب .

(٢١)

أزادراخت (زنزلخت — جرود — سباحي)

الاسم الإنجليزي : Chinaberry

الاسم اللاتيني : *Melia azadirachta L. (Azadirachta indica L.)*

الفصيلة : الزنزلختية (الميلياسية) *Meliaceae*

موطن النبات : ينمو برياً بالسعودية ويزرع في مصر وليبيا والعراق وسوريا من أجل الزينة .

الوصف النباتي : شجرة كبيرة الحجم يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار ، والأوراق مركبة



(أزاد رخت)

ريشية كبيرة الحجم ، متساقطة ، وتحمل نورات عنقودية مركبة ذات أزهار بيضاء لها رائحة عطرية ، والثمرة حسلية تحتوى على بذرة واحدة .
: القلف والأوراق والأزهار والثمار .

الجزء الطبى

الجوهر الفعال : حامض المارجوستين Margostic acid وقلويدات هى , azaridine
Margaspierine , Margosine .

التأثير الطبى : القلف مادة قابضة ويستعمل لتقدير سرعة تجلط الدم ، كما يستعمل فى حالات الحمى وأمراض الحلق والرشح وأمراض الجلد ، وكادة مطهرة فى معاجين الأسنان .

الصمغ : مادة فعالة منشطة ويستخدم فى علاج التهاب اللثة .
البذور : الزيت المستخرج من البذور يستخدم لعلاج التهابات الجلدية .

الثمار : تستعمل للتخلص من ديدان الأمعاء وكادة مسهلة .
الأزهار : تستخدم الأزهار الجافة كدواء مقو عقب الحمى .
السمية : الثمار سامة جدا وكذلك الأوراق لوجود المادة الراتنجية resin وحامض المارجوستين .

شب الليل ، نوار عشية

الاسم الإنجليزي : Four o'clock plant

الاسم اللاتيني : *Mirabelis jalapa* L.

الفصيلة : الجهنمية *Nyctaginaceae*

موطن النبات : يزرع في كثير من البلاد العربية كمصر وليبيا والسعودية من أجل الزينة ، وموطنه الأصلي أمريكا الاستوائية .



(شب الليل)

الوصف النباتي : نبات شجيري صغير له جذور درنية ، يسمو لارتفاع ٦٠ سم ، وأفرعه الحديثة غضة عشبية ، الأوراق متقابلة بسيطة ، بيضية الشكل ، قممها مستدقة ، وحافتها كاملة . والنبات دائم الخضرة ويحمل مجموعة من الأزهار الأنبوبية الحمراء ، أو الصفراء ، وقد سمي بشب الليل أو نبات

(النباتات الطبية والعطرية)

الساعة الرابعة لأن أزهاره تفتتح من الساعة الرابعة مساء حتى صباح اليوم التالي .

الجزء الطبي : الأوراق والجذور .

الجوهر الفعال : قلويد trigonelline والجلاب Jalap .

الأثر الطبي : تعد الجذور مصدراً للجلاب ، وهي مادة طبية مسهلة . وعصير الأوراق مدر للبول ويمنع الهرش ، ويعالج السيلان . مسحوق البذور يستعمل في أدوات التجميل .

يقال إن للنبات تأثيراً ضد السرطان . كما أن تناول كميات كبيرة من البذور أو الدرنات له آثار سامة جداً وقد يؤدي للوفاة .

(٢٣)

طباق (دخان — تبغ)



(طباق)

الاسم الإنجليزي : Tobacco

الاسم اللاتيني : *Nicotiana tabacum* L.

الفصيلة : الباذنجانية Solanaceae

موطن النبات : أمريكا الشمالية والوسطى ويزرع التبغ في كثير من البلاد العربية .

الوصف النباتي : عشب حولي يسمو لارتفاع ١٧٠ سم تقريبا ، ويحمل أوراقا بسيطة بيضاوية ، والأزهار كبيرة حمراء ، أو أرجوانية ، والثمرة علبة .

الجزء الطبي : الأوراق بعد معاملتها .

الجوهر الفعال : تحتوى الأوراق على قلويد نيكوتين ، وأناباسين nicotine & anabasine

وقلويدات أخرى مثل nicotelline كما تحتوى البذور على زيت دهني .

الأثر الطبي : كان يستعمل الدخان طبيا لتأثيره المخدر وتسكينه للآلام ، وهو معرق

ومقيء . واليوم يستخدم فقط للتدخين . كما تستخدم كبريتات

النيكوتين لإبادة الحشرات ولعلاج بعض الأمراض الجلدية .

تعزى النكهة والطعم المميز للدخان إلى الزيوت العطرية وغيرها من المواد

التي تنتج أثناء عملية التخمير والمعالجة .

(٢٤)

سوسن (بصيل — نوار الكلب)

الاسم الإنجليزي : Sea pancratium

الاسم اللاتيني : *Pancratium maritimum* L.

الفصيلة : النرجسية Amaryllidaceae

موطن النبات : ساحل البحر المتوسط في مصر وليبيا وتونس .

الوصف النباتي : نبات معمر له بصلة كبيرة وأوراق طويلة شريطية ، والأزهار بيضاء عطرة

في مجموعات طرفية والثمار سوداء خفيفة .

الجزء الطبي : الأنبصال .



(سوسن)

الجوهر الفعال : يحتوى النبات على مادة روتين Rutin وحوالى عشرة قلويدات ، أهمها :

كرينامين ولازيتين ولايكورين crinamine. lazettine, lycorine

الأثر الطبى : تغلى شرائح من البصلة فى محلول السكر أو العسل لبضعة دقائق ويؤخذ المشروب لمعالجة الأزمة Asthma .

وينمو برياً بمصر نبات آخر اسمه بطن الحية *Pancratium sinkenbergeri* وهو سام للحيوانات إذا أكلته بكثرة .

وفى السعودية تنمو أربعة أنواع من الجنس *Pancratium* هى :

P. temufoolium, *P. tortuesum*, *P. sickenbergeri*, *P. maximum* تحتاج

إلى الدراسة لمعرفة مكوناتها . وقد أثبتت البحوث التى أجريت على النوع

P. sinkenbergeri أن الأبخال تحوى بلورات نقية لشبه قلوئى .

خشخاش برى

(ثنائية النعمان — قرعون — بلعمان — رمان السعالى)

Field poppy : الاسم الإنجليزى

Papaver rhoeas L. : الاسم اللاتينى

Papaveraceae : الخشخاشية الفصيلة

موطن النبات : ينمو برياً فى بعض البلاد العربية كالسعودية وتلك المطلة على شواطئ البحر المتوسط (المغرب — الجزائر — تونس — مصر — ليبيا) .



(خشخاش برى)

الوصف النباتى : عشب حولى (٣٠ — ٤٠ سم) طولا ، مغطى بشعر ويحتوى على مادة لبنية ، والأوراق مجزأة ، والأزهار قرمزية داكنة . ويوجد على البتلات نقط سوداء عند قواعدها ، والثمرة علبة كروية تقريبا ،

ويوجد للنوع عدة أصناف تختلف باختلاف الأوراق وشكل الثمرة . ويعزى جمال شمال أفريقيا في الشتاء إلى جمال هذا النبات . وكذلك لنبات *Papaver dubium* L. اللذان ينموان بأزهارهما الجميلة الحمراء في حقول الشعير بحيث تظهر كالأبسطة الحمراء . وفي الأردن وسوريا تنمو الأنواع


P. humile, *P. glaucum* *P. syriacum*

الجزء الطبي	: الثمار والأوراق والبذور .
الجوهر الفعال	: يحتوى السائل اللبني على قلويدات <i>Papaverine</i> , <i>Derberine</i> كما .
	تحتوى الأوراق مادة غروية وأنثوسيانين وقليل من قلويد <i>rheadine</i> .
الأثر الطبي	: يستخدم الأهالي الثمار كمنوم وخاصة للأطفال ، وتستخدم الأزهار والبذور كمهدئة وملطفة للأنسجة الملتهبة . كما يستخدمون مغلي الأزهار كمهدئ ومزيل للكحة وضد البلغم . تستخدم الصبغة الحمراء الموجودة في الأوراق لعمل المشروبات ، كما تستخدم البتلات نفسها في عمل السلاطة ، وكإداة ملونة في العقاقير الطبية ، وشرابها مفيد في حالات السعال الديكي الحاد ، والنزلات الشعبية والتهاب الحلق .

(٢٦)

خشخاش (أبو النوم)

الاسم الإنجليزي : *Poppy*
الاسم اللاتيني : *Papaver somniferum* L.
الفصيلة : *Papaveraceae* الخشخاشية
موطن النبات : نشأ في آسيا ، إلا أنه يزرع بكثرة في شبه جزيرة البلقان والهند والصين ، كما يوجد في معظم البلاد العربية .
الوصف النباتي : عشب حولي له أوراق مفصصة وتحوى أنسجة النبات مادة لبنية ، والأزهار طرفية كبيرة بيضاء أو ملونة ، والثمرة علبة تفتتح بواسطة ثقب من أعلى .



(خشخاش)

الجزء الطبى : ثمار الخشخاش الغير الناضجة

الجوهر الفعال : قلويد المورفين Morphine (١٧٠ كـ ، ١٩٠ يد ، ١٠٠ هـ)

قلويد الكوداين Codaine

قلويد ناركوتين Narcotine

الأثر الطبى : كانت ثمار الخشخاش إلى عهد قريب جدا تباع عند العطار باسم

أبو النوم ، وتحتوى هذه الثمار على بذور مستديرة صغيرة جدا ، وكان الناس يأكلون البذور للمساعدة على النوم ، ومن هنا سمي النبات (بأبو النوم) أو تسحق الرؤوس التى تتركب منها الثمار ويوضع المسحوق على الجبهة لتسكين الصداع . أما الأفيون فهو العصارة أو اللبن النباتى الذى سرعان ما يجف عند تعرضه للهواء ، يسيل من الثمار الغير الناضجة ، ثم

يكشط ويشكل على هيئة كرات أو أقراص تلف عادة ببتلات الأزهار ،
ويستعمل الأفيون لتخفيف الآلام ، وكادة منومة وباسطة للانقباضات .
جاء في تذكرة داود عن الخشخاش ما يأتي :

« الخشخاش نبات يستخرج منه الأفيون بالشرط وهو بارد يابس ، إذا
دق قشره بجملته كان جالبا للنوم مخفضا للرطوبة محلا للأورام قاطعا
للسعال وأوجاع الصدر وحرقة البول والإسهال المزمن ، أما بذوره فنافعة
لخشونة الصدر والقصبه الهوائية وضعف الكبد والكلى مسمن للبدان
تسمينا جيدا » .

ويقول في الأفيون :

« هو عصارة الخشخاش وهو بارد يابس يقطع الإسهال وينفع في الصداع
والنزلات والسعال وضيق النفس والربو وسائر الأمراض بالتخدير
ويذهب الكحة » .

والمورفين أول مركب قلوى استخلص من النبات وقد حضره Serturmer
في حالة نقية عام ١٨٠٦ وقد أثبتت تركيبة Laurent عام ١٨٢٣
والمورفين أهم المركبات التي توجد في الأفيون . ويتبدئ تكوين المورفين
من بذور الخشخاش بعد إنباتها بأسبوع وتستمر نسبته في الزيادة إلى أن
يكتمل نمو الثمرة الغير الناضجة ، وكلما نضجت الثمرة قلت نسبة
المورفين فيها .

(٢٧)

حرم (حرملا — حرملة — سذب برى)

الاسم الإنجليزي : Harmal

الاسم اللاتيني : *Peganum harmala* L.

الفصيلة : الرطريبية *Zygophyllaceae*

موطن النبات : شمال أفريقيا ، كما ينمو في العراق والجزيرة العربية والكويت والأردن
وسوريا .

الوصف النباتي : نبات عشبي معمر ، قائم ، أوراقه جالسة ، كثيرة التفصص ، أزهاره

بيضاء ، نجمية الشكل ، وحيدة ، معنقة ، الثمار علبة شبه كروية ،
البذور منقررة ومستديرة من جانب واحد ، لونها بني غامق . ويتميز



(حرمل)

النبات برائحته الكريهة .

الجزء الطبى : الأوراق والبذور والجذور .

الجوهر الفعال : تحتوى البذور والجذور على القلويدات الآتية :

حرملين Harmaline حارمين Harmine

والحرمالول Harmalol والبيجانين Pyganine وقد فصل منه أيضا قلويد

بيجارين Pegarine .

الأثر الطبى : استخدمت بذور الحرمل من قديم الزمان أيام ديوسكوريدس ، وتستعمل

كمخدر وطارد للديدان . وفى الطب الشعبى الليبى تحرق الأوراق ،

وتستنشق الأبخرة لشفاء الصداع والآلام العصبية . ويؤكل قليل من

البذور لعلاج الأزمات الصدرية . ومن البذور يستخرج زيت لعلاج

العيون وكذلك الأمراض الجلدية ، كما يستعمل مسحوق البذور لإدرار

اللبن عند السيدات ، وفى تقوية الناحية الجنسية عند الرجال .


ترجع أهمية النبات الطبية إلى عهد قدماء اليونان الذين استعملوا مسحوق
البذور في علاج التخلص من الديدان الشريطية . وقد وجد أن قلويد
الحرمليين ينشط الجهاز العصبي المركزي في الإنسان .
ويطلق اسم الحرمل على نبات آخر اسمه *Aegle marmelos* L. ينتمي للعائلة
السبذية Rutaceae وتحتوي ثماره على مواد مخاطية وبكتين ، وتستخدم
كعلاج للإسهال والدستاريا في الهند .

(٢٨)

فلفل أسود (فلفل عجمي)

الاسم الإنجليزي : Black pepper

الاسم اللاتيني : *Piper nigrum* L.



(فلفل أسود)

الفصيلة : الفلفلية Piperaceae

موطن النبات : موطنه الهند والملايو وبعض البلاد الحارة ويزرع في بعض البلاد العربية .
الوصف النباتي : متسلق ، يحمل أوراقا بسيطة على عقد متنفخة ، والأزهار وحيدة
الجنس ، متجمعة في نورات سنبلية ، والثمرة حسلة ، توصف عادة بأنها
لبية ، والبذور صغيرة ، والفلفل هو الثمرة الغير الناضجة المجففة .
الجزء الطبي : الثمار الغير الناضجة .

الجوهر الفعال : قلويد البيرين أو الفلفلين (ك١٧ يد١٩ ه١٣) Piperine وراتنج حريف
وزيوت طيارة ، وكذلك البيريدين Piperidine
الأثر الطبي : الفلفل مادة منبهة للجهاز الهضمي ، ويساعد على إزالة الانتفاخ ، وهو
مضاد للحمى ، والإكثار منه يسبب الفواق (الزغطة) ويهيج المعدة
والغدد الإفرازية .

ملحوظة : الفلفل الأسود هو الطبقة الخارجية للثمرة ، وما تبقى هو
الفلفل الأبيض .

جاء في تذكرة داود ما يأتي :

« الفلفل شجر كالرمان ، وموطنه الهند ، وهو أبيض وأسود ، وهو حار يابس
يجلو الصوت ويقطع البلغم ويحلل السعال والربو وضيق النفس والرياح الغليظة
والمغص سعوطا خصوصا بالنطرون » .

الفلفل كتابل : ينشط الفلفل سيل اللعاب والسوائل المعوية وله أثر مرطب ، وللفلفل
استعمالات كثيرة في المطبخ .

(٢٩)


الرمان

الاسم الإنجليزي : Pomegranate

الاسم اللاتيني : Punica granatum L.

الفصيلة : الرمانية Punicaceae

موطن النبات : سواحل البحر المتوسط والعراق ولبنان وفلسطين ، كما يزرع في معظم
البلاد العربية .



(رمان)

الوصف النباتي : شجرة صغيرة تحمل أوراقا بسيطة متقابلة وأزهارا مفردة أو متجمعة في نوريات محدودة ولونها أحمر ، والثمار لينة ذات غلاف جلدي سميك مقسمة إلى ثمان حجر ، والبذور مضلعة عديمة الأندوسبرم ، والجزء الذي يؤكل هو الطبقة الخارجية من القصرة حيث تحتوى على عصير حلو المذاق ويعمل منها شراب . كان الرمان مزروعا في الحدائق المعلقة المشهورة في بابل .

الجزء الطبي : قلف الشجرة وقشرة الثمرة .

الجوهر الفعال : قلويدات أهمها البليترين Pelletierine (ك ٨ يد ١٥ ه ١) وحامض

العفصى تانيك Gallotannic .

الأثر الطبى : القلويد من أشد الأدوية قتلا للدودة الشريطية والحامض مادة قابضة تستخدم فى حالات الدستوريا والإسهال المزمن . كما تستخدم قشور الرمان بعد تجفيفها فى علاج القرحة المعدية وذلك بشرب كوب كل صباح من منقوع القشور المحلى بالعسل .
جاء فى تذكرة داود ما يأتى :

« إذا طبخ قشر الرمان وخصوصا مع العفص حتى ينعقد ، يقطع الإسهال المزمن والدم شربا ولحم القروح والجراح طلاء وشربا ، وإذا شرب مطبوخا أسهل الديدان » .

(٣٠)

مسواك (أراك)

الاسم الإنجليزى : Tooth brush tree

الاسم اللاتينى : *Salvadora persica* L.

الفصيلة : الأراكية *Salvadoraceae*

موطن النبات : السودان ، المملكة العربية السعودية ، اليمن وليبيا .

الوصف النباتى : شجيرة دائمة الخضرة تحمل أوراقا داكنة ، وأزهارا بيضاء صغيرة فى نوريات مركبة طرفية ، والثمار عطرية حمراء .

الجزء المستعمل : القلف والأوراق والسيقان والجذور .

الجوهر الفعال : تحتوى الأوراق والقلف على قلويد trimethylamine alkaloid ، أما البذور فتحوى على زيت دهنى وزيت طيار وراتنج وبعض السيليكا .

الأثر الطبى : تستخدم الجذور لعلاج الأنكلستوما ، ويستخدم مسحوق الجذور مثل المستردة mustard ، وأما منقوع الجذور فيستخدم لعلاج السيلان .

أما الأوراق فمعدة للبول ، والسيقان يستخدمها الأهالى كمسواك (فرشاة للأسنان) ، والراتنج فى عمل دهان .

تستخلص بعض المصانع مسحوق الجذور فى عمل المعاجين للأسنان .

والتركيب الداخلى لسيقان السلفادورا يناسب تماما استخدامها



(مسواك)

كمسواك وذلك لوجود مساحة كبيرة من اللحاء واتساع الألياف
وبعدها عن بعضها في منطقة البيريسكيل .

(٣١)

مرير (مرار — عشبة سليمة — سنانير)

الاسم الإنجليزي : Common groundsel

الاسم اللاتيني : *Senecio vulgaris* L.

الفصيلة : المركبة Compositae

موطن النبات : مصر ، ليبيا ، السعودية ، دول الخليج العربى .

الوصف النباتى : عشب حولى له أوراق عميقة التفصص متبادلة . والأزهار محمولة فى نورات هامية صفراء اللون .

الجزء المستعمل : الأفرع المزهرة .

الجوهر الفعال : يحتوى النبات على عدد من القلويدات أهمها :

ريتروسين retrosine ، سينيسين senecene ، بيروليزيدين pyrrolizidine



(مرير)

الأثر الطبي

: مدرة للطمث ، طاردة للديدان ، وملينة خفيفة ، ومزيله للعرق والالتهابات .

هناك نوع آخر اسمه *S. desfontainei* في الإمارات والكويت ويسمونه العرب قريصة ، ويستخرج منه صبغة خضراء اللون ذات رائحة نفاذة تدخل في صناعة الصابون المستخدم في غسيل الشعر واستعادته لحيويته ورونقه وجماله . كما يستعمل النبات في علاج قشر الشعر ، ويستخدم لإدرار البول ، وكمقيء ، ومضاد للتوتر . ولقد لوحظ أن له تأثيراً على حوامل الماشية كفعل الأرجوت وقد يسبب الإجهاض وتسمم الماشية .

وفي البلاد العربية أنواع كثيرة من الجنس *Senecio* في حاجة إلى الدراسة .

(٣٢)

تيكوما

الاسم الإنجليزي : Yellow elder

الاسم اللاتيني : *Tecoma stans* L.

الفصيلة : البجنونية *Bignoniaceae*

موطن النبات : الأماكن الاستوائية من أمريكا ، وغرب الهند . ولقد شاعت زراعته في

البلاد العربية كنبات زينة لجمال أزهاره وتحمله للجفاف وسرعة نموه .

الوصف النباتي : شجيرة مستديمة الخضرة وافرة الأزهار ، والأوراق مركبة ، ريشية

أحادية فردية ، وتوجد الأزهار في نورات طرفية غير محدودة ، وتزهو في

الربيع والخريف ، والأزهار أنبوية كبيرة (حوالى ١٢ سم) ، صفراء

مشوبة باللون البرتقالي . والثمرة علبة تتفتح مسكناً .

ويوجد بالبلاد العربية نوع آخر ، أزهاره حمراء اللون اسمه

Tecoma capensis L. وهو أقل انتشاراً من النوع الأول .

الجزء المستعمل : الأوراق .

الجوهر الفعال : قلويد *Tecomine*، *Treostamine* ومضاد حيوى اسمه *Laphacol* وهو



(تيكوما)

(Gram +) ، وقد تم استخلاص مادة التيكومين منه ، وثبت بالتجارب العلمية تأثيرها الفعال في خفض نسبة السكر في الدم .
: خفض نسبة السكر في الدم ، يشبه في ذلك الأنسولين . وفي المكسيك تستخدم كأنسولين شراب . وقد تم استخلاص التيكومين من النوع *T. capensis* L. والنبات في حاجة إلى مزيد من البحث .

الأثر الطبي

(٣٣)

دقن الشيخ (ضرس العجوز — شقشق)

الاسم الإنجليزي : Bur nut

الاسم اللاتيني : *Tribulus terrestris* L.

الفصيلة : الرطريطية *Zygophyllaceae*

موطن النبات : مصر ، ليبيا ، السودان ، قطر ، الإمارات ، الكويت ، سوريا ، العراق ، فلسطين ، السعودية .

الوصف النباتي : عشب حولي زاحف (٣٠ — ٧٠ سم) ، يحمل أوراقا مركبة ريشية ، وأزهارا إبطية صفراء اللون . وفي مصر وليبيا يوجد من هذا النوع ثلاثة أصناف ، هي :

T. t. var. bicornutus, *T. t. var. robustus*, *T. t. var. orientalis*

وتتماز بثمارها الشوكية .



الجزء الطبى : الثمار والجذور .
 الجوهر الفعال : قلويدات وزيت دهنية وطيارة ، وصابونيات ، وراتنجات .
 الأثر الطبى : الثمار مدرة للبول ومقوية للجنس ، وقابضة ، وتستخدم فى علاج الجهاز البولى ، وأمراض القلب ، والروماتيزم الحاد . والنبات سام ويسبب انتفاخ الرأس والأرق ، ولذلك يجب تناوله باحتراس . والنبات يسبب التسمم للحيوانات إذا تناولته بكميات كبيرة ، حيث يسبب مرض (الجلد كوب) الذى يفتك بالأغنام التى تتغذى عليه ، والذى من أهم أعراضه اليرقان — الحساسية الضوئية التى يتسبب عنها التهاب مناطق الجلد المكشوفة . وقد كشف التحليل الكيماوى وجود ثلاثة مركبات هى (دايوسجينين) و (تسكوميتين) و (الجيتوجنين) . كما يحتوى النبات على عدة نترات أهمها نترات البوتاس . وفى البلاد العربية مثل السعودية يوجد أنواع أخرى من نفس الجنس أهمها :
T. kaiseri, *T. bimucronatus*, *T. arabicus* *T. pentandrus*
 دراسة لمعرفة محتوياتها .

(٣٤)

الحلبة (بسيسة)

الاسم الإنجليزى : Fenugreek
 الاسم اللاتينى : *Trigonella foenum – graecum* L.
 الفصيلة : القرنية (البقولية) *Leguminosae*
 موطن النبات : جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وتزرع اليوم فى معظم البلاد العربية .
 الوصف النباتى : عشب حولى ذو أزهار بيضاء وقرون رفيعة ولها منقار واضح ، ويشبه نبات البرسيم ، والورقة ريشية مركبة ثلاثية الوريقات .
 الجزء الطبى : البذور الناضجة .
 الجوهر الفعال : تحتوى البذور على قلويدات أهمها :
 التريجونلين ك_٨ يده_٧ هـ ١ Trigonellene
 والكولين ك_{١٠} يده_{١٠} هـ ١ Choline
 وتحتوى على ٢٨٪ مادة صمغية ، ٢٢٪ بروتين ، ٦٪ زيوت ثابتة .



(حلبة)

الأثر الطبى

: تصف كتب الطب القديمة الحلبة بأنها مقوية للمعدة بسبب ما تحويه من مادة مرة ، وأنها منقية للدم إذا شربت في الصباح على الريق ، ويعطى مغلى الحلبة لإدرار اللبن عند الأمهات . وجاء في بردية « أبرز » أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون زيت الحلبة لإزالة تجاعيد الوجه وأن البذور مقوية للمعدة ومقوية للدم وتخفض نسبة السكر فيه .

واليوم تستعمل الحلبة من الخارج لعمل لبخات لعلاج الدمامل والخراجات المختلفة وعلاج بعض الأمراض الجلدية والآلام العضلية والروماتزمية .

ومن الداخل يستعمل مغلى الحلبة لزيادة وزن الجسم كما تساعد مرضى البول السكرى لشفاء الجروح ، ويستعمل الأطباء الفرنسيون الحلبة لعلاج التهابات الرئوية والتزلات المعوية والإمساك والبواسير ، كما يستعمل مغلى الحلبة كغرغرة في حالة التهاب اللوزتين ومرض الدفتريا .

جاء في تذكرة داود عن الحلبة ما يأتي :

« الحلبة نبت له زهر أصفر وبذور مستطيلة حارة تلين وتحلل سائر الأورام ، وإذا طبخت بالتمر والتين والزبيب وعقد ماؤها بالعسل أذهبت أوجاع الصدر والسعال والربو وضيق التنفس ، ومتى طبخت مفردة وشربت بالعسل حلت الأرياح والمغص ، وإذا نقعت في ماء الورد وقطرت في العين أذهبت الدمعة والحمرة والرمد ، وإذا جففت وسحقت مع بذور الخشخاش واللوز ودقيق القمح وعجن بالسكر سمنت المبرورين وخصبت وأصلحت الكلى لإصلاحها جيدا » .

الحلبة كتابل : تستعمل البذور الصغيرة في الهند في عمل انكارى وتستعمل الخلاصة مع المواد العطرية الأخرى في صنع مادة مطيبة هي الاسفندان الصناعى . يوجد من الجنس *Trigonella* نوع اسمه *T. monspeliaca* L. في إيطاليا تطبخ بذوره وتستعمل دواء لأنواع الإسهال المختلفة .

الفصل الثاني

نباتات طيبة تحتوى على جليكوسيدات وصابونيات

تعريف الجليكوسيد :

الجليكوسيد معناه مركب عضوى يتمياً أو يتحلل بفعل الأحماض أو الأنزيمات فيتولد منه سكر الجلو كوز .

الجليكوسيدات كثيرة الانتشار فى المملكة النباتية وهى قريبة الصلة بأنواع السكريات الأحادية Monosacharides وتتركب مثلها من الكربون والأيدروجين والأوكسجين ، إلا أن نسبة الأيدروجين إلى الأوكسجين فى الجليكوسيدات ليست كنسبة وجودها فى الماء . وقد تحتوى الجليكوسيدات على النتروجين والكبريت .

• ويمكن اعتبار الجليكوسيدات مشتقات من نوع الإيثر Ether ، لأنها تنتج من اتحاد جزئىء من السكر (جلو كوز غالبا) مع أحد الكحولات أو المركبات العضوية الأخرى .

ومن أمثلة الجليكوسيدات جليكوسيد الأميگدالين Amygdalin ويوجد فى اللوز المر (كـ ٢٠ يد ٢٧ ١١ هـ ، ٣ يد ٢ ا) ، وجليكوسيد السينالبين Sinalbin (كـ ٣ يد ٢٤ ١٥ هـ ٢ كـ ٢) ويوجد فى الخردل ، وجليكوسيد الصابونين Saponin (كـ ١٩ يد ٣٠ ٢١) ويوجد فى عرق الحلاوة والعشبة ، وكذلك الساليسين Salicin (كـ ١٣ يد ١٨ ٧) ويوجد فى أوراق الحور والصفصاف .

وتتحلل جميع الجليكوسيدات بفعل الأحماض المخففة أو الأنزيمات القادرة على تحليل نوع خاص من الجليكوسيدات عادة فى نفس النبات الذى يحتوى على هذه الجليكوسيدات ، ولذا يجب إتلاف الأنزيمات قبل محاولة استخلاص هذه المركبات من النباتات .

والجليكوسيدات مواد متبلورة عديمة اللون لها طعم مر تذوب معظمها فى الماء والكحول المخفف .

وبعض الجليكوسيدات تعتبر عقاقير هامة ، ولو أنها ليست كثيرة العدد . وهناك عدد كبير منها لا يستعمل كعقاقير إلا أنها ذات نفع كبير ، حيث أن العديد منها شديد السمية ، كما أن بعضا آخر يستعمل كمصدر لعقاقير أخرى .

تستعمل كثير من الجليكوسيدات كمنبهات للقلب مثل الديجيتوكسين الذى يستخرج من نبات *Digitalis* ، أو كملينات مثل السينوسيدز *Sennosides* ، أو منبه موضعي مثل سنجرين المستخرج من المستردة السوداء ، أو كمسكنات مثل السالين المستخرج من الصفصاف ، أو ضد انفجار الشعيرات الدموية مثل الهسبيردين كما في ثمار الموالح .
وفي بعض الحالات ليس للجليكوسيد أى أثر فسيولوجي على أنسجة الإنسان أو الحيوان ولكن بتحليلها تنتج جواهر فعالة كما في حالة السنجرين .

الصابونيات

وهي جليكوسيدات خاصة تتميز بأنها تكون رغوة مع الماء ، وقد استخدمت قديما في التنظيف مثل الصابون . ففي أوروبا استعملت جذور الصابوناريا *Saponaria sp.* ، وفي أمريكا استخدم قلف الكويلايا *Quillaia sp.* لهذا الغرض .

(٣٥)

عين الديك (ناب الجمل — عين البومة)

الاسم الإنجليزي : Summer adonis

الاسم اللاتيني : *Adonis aestivalis* L.

الفصيلة : الشفوية *Ranunculaceae*

موطن النبات : مصر ، العراق ، سوريا ، فلسطين ، لبنان .

الوصف النباتي : عشب معمر يتراوح ارتفاعه من (١٠ — ٤٠ سم) ، له ريزومة أرضية متفرعة وعليها جذور سوداء ، والأوراق مركبة ريشية ، والأزهار كبيرة صفراء اللون أو حمراء .

الجزء الطبي : النبات دون الجذور .

الجوهر الفعال : جليكوسيد أدوندين *Adonindine* ، أدونيتوكسين *Adonitoxine*

الأثر الطبي : يستخدم النبات كمنبه للقلب ومدر للبول ، والأوراق ملينة ، وتأثير

النبات على عضلة القلب أقل من تأثير الديجيتالين ، فهو يعمل على اتساع

الشرايين . والنبات عامة سام ، ولذلك يجب أن يؤخذ بمشورة الطبيب .

وفي السعودية ينمو النوع *Adonis dentata* والذي ينمو بريا بمصر



(عين الديك)

أيضا . كما ينتشر في منطقة شمال أفريقيا نوع آخر يعرف بالزغليل A. *macrocarpa* الذي يحتوى على نفس الجليكوسيدات السابقة والتي يمكن أن تعزى إليها سمية النبات .

(٣٦)

شجرة السماء (لسان الطير)

الاسم الإنجليزي : Tree of Heaven

الاسم اللاتيني : *Ailanthus glandulosa* Desf

الفصيلة : السيماروبية *Simarubiaceae*

موطن النبات : الهند والصين ، ويزرع في عدد من البلدان العربية من أجل الزينة .

الوصف النباتي : شجرة متساقطة الأوراق ، أوراقها مركبة ، أزهارها تتجمع في نوريات طرفية مركبة ، الأزهار صغيرة خضراء اللون ، رائحتها ننتة ، والثمار مجنحة ومنضغطة .

الجزء الطبى : القلف .
الجوهر الفعال : يحتوى القلف على مادة الإيلنثين المرة *ailanthin* وصابونيات ، كما يحتوى الخشب على مادة بلسمية وتانينات ، بالإضافة إلى الصابونيات .
الأثر الطبى : قلف الشجرة طارد للديدان ونافع في حالات الدسنتاريا ، وقاتل للحشرات . ويسبب النبات حساسية وضيقا في التنفس في بعض الأحيان .


(٣٧)

دقن الباشا (لبخ)

الاسم الإنجليزى : Lebbek tree
الاسم اللاتينى : *Albizia lebeck L.*
الفصيلة : القرنية *Leguminosae*
موطن النبات : الهند ويزرع اليوم في معظم البلاد العربية كنبات ظل وزينة .
الوصف النباتي : شجرة متساقطة الأوراق ، وهى كثيرة التفرع ، والأوراق مركبة ريشية ، وتوجد الأزهار في مجاميع كروية ، وهى صغيرة خضراء ، والثمار قرنية مبططة لونها أبيض مصفر تتحول إلى اللون البنى الناصع عند تمام نضجها .

الجزء الطبى : القلف والبذور وقلف الجذور .
الجوهر الفعال : يحتوى القلف على صابونيات *Saponins* .
الأثر الطبى : يستخدم القلف لعلاج الدوسنتاريا والبواسير ، كما يستخدم لعلاج التهاب الشعب وكذلك في علاج لدغة الثعبان .

أما قلف الجذور فيستخدم مسحوقه لتقوية اللثة حيث يحتوى على (٧ — ١١ ٪) تانين ، وقليل من الصابونيات . وتستخدم البذور في



(دقن الباشا)

بعض أمراض العيون . أما مسحوقها فيستخدم في حالات التهاب الغدد
اللمفاوية . كما يستخدم الزيت المستخرج من البذور كعلاج في حالات
البرص والجذام .

(٣٨)

الصبار (صبر)

الاسم الإنجليزي : Aloes

الاسم اللاتيني : *Aloe barbadensis* L.

A. perryi

A. vera



(الصبار)

الفصيلة : الزنبقية Liliaceae

موطن النبات : ينتشر هذا الجنس في أغلب مناطق الوطن العربي .

الوصف النباتي : نباتات معمرة ، أوراقها قاعدية متشعبة عصارية ، قممها مدببة أو شائكة ، أزهارها مجتمعة في نورات تحملها ساق كاذبة تخرج من وسط الأوراق ، لونها يتراوح بين الأصفر والبرتقالي .

الجزء الطبي : الأوراق المتشعبة .

الجوهر الفعال : جليكوسيد الصبرين (ك^{١٧} يد^{١٨} ٧) ، Aloin ،

جليكوسيد الباربالوين (ك^{١٧} يد^{٢٠} ١) ، Barbaloin ،

وحامض قرفي (ك^٩ يد^٨ ٢) ، Cinnamic acid ،

كما يحتوي النبات على مادة الإمودين . Emodin .

الأثر الطبي : يعتبر الصبر من العصارات النباتية المسهلة ، ولكن تأثيره المسهل غير

قوى . ومرارة الصبر تنبه المعدة وتزيد من قدرتها على الهضم ، كما أنه

يساعد على زيادة إفراز الصفراء . ويستعمل عصير الأوراق في الشام

الجروح ، والالتهابات الجلدية الناتجة من التعرض للأشعة السينية .

ذكر دواد في سياق كلامه عن الصبر ما يأتي :

« والصبر من الأدوية الشريفة — قيل لما جلبه الإسكندر من اليمن إلى مصر كتب إليه المعلم ألا تقيم على هذه الشجرة خادما غير اليونانيين لأن الناس لا يقدرُون قدرها ، وهو حار يابس الأخلاط الثلاثة وينقى الدماغ وأوجاع الصدر وأمراض المعدة كلها ، يذهب الحكة والجرب والقروح والحمرة طلاءً بالعلس . ويطيل الشعر ويسوده ، ويقتل القمل ، وينبت الشعر بعد القراع . والاحتحال به يحد البصر ، وإن طبخ بماء الكرات أبرأ أمراض المعدة وأسقط البواسير » .

للحصول على الصبر تشرط أوراق الصبار السميكة في خطوط مستعرضة ، فتسيل العصارة وتجف ، ويتخلف الصبر على هيئة مادة راتنجية صلبة قائمة اللون ، وهذه المادة لها رائحة غير مقبولة ، وطعم مر يسبب الغثيان . ولا يذوب الصبر في الماء ولكن يذوب في الكحول بدرجة تركيز ٦٠٪ .

والمصريون القدماء أول من عرف الصبر والمر واستخدموهما في علاج الإسهال وتطهير الأمعاء .

(٣٩)

كف مريم (قبيرة)

الاسم الإنجليزي : Jericho - roses

الاسم اللاتيني : *Anastatica heerochuntica* L.

الفصيلة : الصليبية *Cruciferae*

موطن النبات : ينتشر في معظم البلاد العربية .

الوصف النباتي : عشب حولي مغطى بزغب نجمي ؛ ويحمل أزهارا صغيرة بيضاء جالسة ، وثمارا خردلية بيضاوية . ومن خصائص هذا النبات أنه في الجو الجاف تنحني الأفرع إلى الداخل ويتكور النبات ليصبح كالكرة ، ثم تحمله الرياح إلى مسافات بعيدة . وإذا ما وصل النبات المتكور إلى منطقة رطبة ، يمتص الماء وتنتثر منه البذور ، ولذلك يسمونه بكف مريم .

الجزء الطبي : النبات كله .

الجوهر الفعال : هرمون جنسي ، وجليكوسيدات .

الأثر الطبي : يستخدم النبات لإدرار الطمث ، ولأغراض طبية أخرى ، كالصرع والصداع ونزلات البرد .

يطلق كف مريم أيضا (أصبع العذراء) على نبات آخر من الفصيلة الفربيينية (*Verbenaceae*) هو *Vitx agnus castus* وهو شجرة دائمة الخضرة سوقها مربعة تقريبا ، ولها أوراق راحية مركبة وعدد الوريقات من (٥ - ٧) ، والأزهار صغيرة بيضاء اللون أو زرقاء فاتحة والثمرة لبية سوداء .

يستخلص من هذا النبات مادة فعالة تفيد في علاج أمراض العيون وأيضا في علاج الأمراض المعدية .

والعقار قديم وكان يسمى « *Agnus Castus* » مشتق من اسم النبات . وهو عقار هرموني اعترف به دستور الصيدلة الأسباني في الماضي ، وهو يبطئ من حركة السائل المنوي والحيوانات المنوية .

والطب الشعبي في البلاد العربية يعرف أن لثمار هذا النبات مفعولها الكابح لجماح الشهوة الجنسية .

البابونج (فليه ، ريان ، زفيرة ، دقيقة)

الاسم الإنجليزي : Camomill

الاسم اللاتيني : *Matricaria chamomilla* L.

الفصيلة : المركبة Compositae

موطن النبات : ينتشر النبات في منطقة شمال أفريقيا من المغرب إلى جمهورية مصر العربية .

الوصف النباتي : نبات عشبي يصل ارتفاعه حوالى ١٥ سم ، ساقه متفرعة ، أوراقه

طويلة ، خيطية التفصص ، أزهاره صفراء مخضرة ، تتجمع في نورات

شبه كروية ، داخلها أجوف ، وللعشب رائحة عطرية . وفي بعض

الأنواع الأخرى التى أدخلت زراعتها إلى العالم العربى توجد بالهامات

أزهار شعاعية ، بيضاء اللون ، مثل *C. recutita*

الجزء الطبى : الهامات المزهرة .



(البابونج)

الجوهر الفعال : تحتوى الأزهار على زيت طيار يحتوى على المواد الآتية :

Azulen	(١) الزيت الأزرق أزولين
Anthamidine	(٢) مادة أنثاميدين
Anthemic Acid	(٣) حامض الأنثاميك
Matricarin	(٤) مادة ماتريكارين

الأثر الطبى : تطحن الأزهار الجافة ويستعمل مسحوقها . زيت النبات مفيد للمعدة ويعمل على طرد الغازات من الجهاز الهضمى ، كما أن شرابه مهدئ للأعصاب ومنبه ومزيل للمغص ، خاصة عند الأطفال ، ويستعمل كذلك لإيقاف الإسهالات الصيفية . كما يستعمل من الخارج فى شكل لبخ لمعالجة الجروح والالتهابات . ولوحظ أن معظم استعمالات البابونج فى الجهاز الهضمى . وذلك لاحتوائه على مادة الأزولين .

(٤١)

الشيخ (بعثران)

الاسم الإنجليزى : Santonica

الاسم اللاتينى : *Artemisia herba - alba L.*

الفصيلة : المركبة *Compositae*

موطن النبات : ينمو النبات فى أغلب مناطق شمال أفريقيا ويكون فى شكل تجمعات نباتية كبيرة ، كما ينتشر فى الشام وشبه الجزيرة العربية والخليج العربى .

الوصف النباتى : شبه شجيرة صغيرة عطرية ، لها أوراق مركبة والوريقات صغيرة دقيقة ، والنورات صغيرة شبه كروية جالسة صفراء اللون .

الجزء الطبى : الرؤوس المجففة للنورات .

الجوهر الفعال : جليكوسيد سانتونين *Santonin* ، ومادة *Artemisin*


وجليكوسيد *Thugone* ، ومادة *Absinthin*

الأثر الطبى : طرد ديدان الإسكارس ، ويفضل أن يعقب تعاطيه ببضع ساعات أخذ مسهل . والسانتونين مركب عديم اللون وله طعم خفيف يميل إلى المرارة .

جاء فى تذكرة داود ما يأتى :

« الشيخ حار يابس يقطع البلغم ويفتح السدد ويخرج الديدان والأخلاط الفاسدة ويذهب المغص وأوجاع الظهر ويحل عسر النفس ويذهب الحميات » .

وفي الطب الشعبي المصرى يستعمل الشيح لتنظيم ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية وللشيخ أنواع عديدة بعضها يحمل الاسم العلمى وبعضها يحمل أسماء تجارية مختلفة ، مثل الشيح الخرساني ، والشيخ البلدى ، وتنتشر زراعتهما في بعض البلاد العربية ، ويسمى النبات أفسنتين . وتوجد أنواع عديدة من نباتات الشيح لا تحتوى على المادة الفعالة التى تستعمل طبيا ، والموجودة في النوع *A. cinae* ، وتستعمل لما تحتويه من زيوت طيارة . وقد اكتشفت مادة السانتونين عام ١٩٣٠ ، وهى مادة متبلورة شحيحة الذوبان في الماء ، تتلون باللون الأصفر إذا تعرضت للضوء .



والنوع *Artemisia absinthium* ويسمى الشيح العراقى ، أو الشيح الخرساني ، أو الشيح الرومى ، أو الشيبة ، الذى ينمو برياً بسوريا ولبنان وبعض البلاد العربية الأخرى ، ويقال إنه ينمو بالسودان ويعرف باسم « دقن الشيح » نظرا للون أوراقه البيضاء الناصعة ، حيث إنها مغطاة بشعيرات دقيقة فضية ، وأزهاره كروية صفراء .

ويحتوى هذا النبات على زيت طيار ، وأهم مكوناته مادة الثوجون Thujone وقد فصل من النبات جليكوسيد أفسنتين ومادة متبلورة أخرى ، ومواد مرة مدرة للصفراء ومنبهة للغدد المعدية .


وفي الشام ، تستخدم الأوراق والفروع المزهرة ككمادات لعلاج آلام المعدة والإسهال المصحوب بمغص بوضعها فوق البطن . كما يستعمل في حالات اضطرابات الكبد ، وكذلك لعلاج الرمد بغسل العين بالمستحلب ، أو بتحويلها بمورد به مرهم الأفسنتين .

وفي المملكة العربية السعودية ، تنمو عدة أنواع من الشيح *Artemisia* منها : *A. sieberi*, *A. scoparia*, *A. monosperma*, *A. abyssinica*, *A. judaica* ويستعمل معظمها في الطب الشعبي السعودي .

(٤٢)

القطف (اسفناخ)

(القطف)



(النباتات الطبية والعطرية)

الاسم الإنجليزى : Mountain spinach

الاسم اللاتينى : *Atriplex hortensis* L.

الفصيلة : الزربحية *Chenopodiaceae*

موطن النبات : مناطق شمال أفريقيا والعراق .

الوصف النباتى : عشب حولى يحمل أوراقا رحيمة قلبية صفراء أو حمراء داكنة ، والأزهار أرجوانية محمولة فى نورات طرفية ويشبه النبات السبانخ فى طعمها .

الجزء المستعمل : النبات كله .

الجوهر الفعال : كالسبانخ غنية بالصابونيات Saponins والقلويد *Chenopodine* وفيتامين (A)، والبذور غنية بفيتامين (A) .

الأثر الطبى : بجانب استخدامها فى عمل السلاطة وكخضار ، تستخدم لتخفيف الالتهابات ، أما البذور فتستخدم كمقيئ .

توجد بالبلاد العربية أنواع كثيرة من الجنس *Atriplex* ومعظم هذه الأنواع تقاوم الجفاف والملوحة ، ولذا يطلق عليها النبات الملحي Salt bush . وتحتاج هذه الأنواع إلى دراسة تحليلية لمعرفة محتوياتها .

(٤٣)

بلح الصحراء (تمر العيد — الهجليج)

الاسم الإنجليزى : Desert date

الاسم اللاتينى : *Balanites aegyptiaca* Del.

الفصيلة : الرطراطية (الهجليجية) *Zygophyllaceae (Balanitaceae)*

موطن النبات : المناطق الصحراوية من السودان ومصر وليبيا ، ويصل انتشاره إلى اليمن والسعودية والخليج العربى .

الوصف النباتى : نبات شجيرى إلى شجرى معمر ، دائم الخضرة ، له أشواك حادة ، وأوراقه مركبة ، تتركب من وريقتين ، الأزهار صغيرة خضراء ، تتجمع فى نورات مشطية ، والثمار خضراء تتحول تدريجيا إلى اللون الأصفر عند نضجها ، مستطيلة كمثرية الشكل .

الجزء الطبى : الثمار بالدرجة الأولى ، والقلب والأوراق .



(بلح الصحراء)

الجوهر الفعال : تحتوى الثمار على زيت وبروتين ، وسكر ، وفيتامينات وأملاح معدنية ، وتحتوى أيضا على صابونين ، والدايوسجيين ، كما تعد مصدرا لكثير من العقاقير الستيرويدية مثل الكورتيكوستيرويدات ، ومصدرا لبعض موانع الحمل والمهرمونات الجنسية . ويحتوى القلف على الصابونينات . وعند تخمر الثمار ، فإن محتواها الستيرويدي الصابونيني يزداد ، ويعطى عند تحلله مادة دايوسجيين Diosgenin .

الأثر الطبى : يستعمل القلف والأوراق لتنظيف الجروح ، وتستعمل خلاصة الجذور ضد الملاريا . وفي الهند يستعمل النبات فى الطب الشعبى فى علاج بعض الأمراض الجلدية كالبهاق Leucoderma .

(٤٤)

خف الجمل (بوهينيا)

الاسم الإنجليزي : Butterfly tree

الاسم اللاتيني : *Bauhenia variegata* L.

الفصيلة : البقولية (القرنية) Leguminosae

موطن النبات : موطن الشجرة الأصلي الهند والصين وبورما ، ولكنها أدخلت وزرعت في كثير من البلاد العربية ، وخاصة منطقة البحر المتوسط لتزين الطرق والحدائق ، وكذلك في السعودية لنفس الغرض .



(خف الجمل)

الوصف النباتي : شجرة دائمة الخضرة ، تسمو لارتفاع ٤,٥ — ٦ أمتار ، أوراقها بسيطة ، قممتها غائرة emarginate ، ولذلك تشبه خف الجمل ومن هنا اشتقت التسمية العربية لهذا الجنس ، والنورة غير محدودة عنقودية ، والأزهار رائحتها عطرية ولونها بنفسجي .
يوجد نوع آخر أقل انتشارا في البلاد العربية هو النوع الأبيض

. *Bauhinia alba* L.

الجزء المستعمل : القلف والجذور والأوراق والبذور والأزهار .
الجوهر الفعال : جليكوسيدات astragalin ، isoquericitrin وتانين وصمغ .
الأثر الطبي : القلف مقو وقابض ، والجذور طاردة للغازات ، والأوراق ملينة .

(٤٥)

بتولا (تامول)



(بتولا)

الاسم الإنجليزي : Birch

الاسم اللاتيني : *Betula alba* L.

الفصيلة : البتولية *Betulaceae*

موطن النبات : البلاد العربية المطلة على البحر المتوسط .

الوصف النباتي : شجرة صغيرة تمتاز بلحاءها الأبيض الذى ينزع فى ألواح ، والشجرة متساقطة الأوراق ، والأوراق بسيطة متبادلة تتحول إلى اللون الأصفر فى الخريف . وتحمل الأشجار أزهارا وحيدة الجنس ، والثمار أكينية .

الجزء الطبى : الأوراق والقلب وعصارة الشجرة .

الجوهر الفعال : تحتوى الأوراق على *flavonoid pigments* ، كما يحوى القلب على جليكوسيد *Betulin* وتانين وسابونين ومن الغلاف الخارجى للثمار *Betulin* , *Citrillin* ومواد أخرى .

الأثر الطبى : يستعمل مغلى القلب لعلاج الجروح ، ومنقوعه كمشروب مقو ، كما يستعمل القلب كمادة للدباغة . وفى بعض البلاد تعالج أوراق البتولا الروماتزم المفصلى والعضلى بربط الأوراق بعد تسخينها على المفصل . وتوصف عصارة البتولا بأنها إكسير الحياة للشيوخ ، إذ تعيد إليهم النشاط والنضارة ، كما تزيل الحصى من الكلى .

(٤٦)

الخردل

الاسم الإنجليزي : Mustard

الاسم اللاتيني : *Brassica nigra* L. خردل أسود *Brassica alba* L. خردل أبيض

الفصيلة : الصليبية *Cruciferae*

موطن النبات : منطقة البحر المتوسط ، والسودان والعراق .

الوصف النباتي : عشب طويل يحمل أوراقا بسيطة متبادلة طويلة متموجة الحافة ، والأزهار صفراء اللون ، أما الثمار فهى من نوع الخردلة طويلة ذات منقار .

الجزء الطبى : البذور ، وهى إما بيضاء أو سمراء ، حسب النوع .



(الخردل)

الجوهر الفعال : جليكوسيد سنالين sinalein ، وسنجرين sinigrin ، وزيت طيار له طعم حريف .

الأثر الطبى : لطعم البذور الحريف ، تستعمل في الطعام ، حيث تنبه الغدد الهضمية المعدية والمعوية ، فينشأ عن ذلك فتح الشهية ، وتستعمل في صنع المستردة ، وذكرت في كتابات الإغريق والرومان .

يستعمل الخردل من الظاهر لتخفيف بعض آلام اللعابجو والروماتزم العضلى ، لأنه يهيج الجلد ويحدث به ألما محرقا ومؤقتا ، وهذا الألم يعقبه فقد الإحساس فيزول الشعور بالألم الأصلي ، ويفيد وضع لبخة من الخردل على الجلد أيضا في حالات المغص المعدى والقئى وبعض الآلام التى تحدث

جاء في تذكرة داود ما يأتي :

« الخردل نوعان : برى ومنزرع ، وهما إما أبيض أو أسود أو أحمر ، وكلها حريف حاد ، يابس نافع لكل مرض كالفاالج والنقرس والحميات شربا وضمادا ويحلل الورم » .

وقد يمزج النوعان معا في المستردة المسحوقة ، وهناك عجينة المستردة وهي مطلوبة أكثر .

وللخردل الأسود صفة طبية ، وخاصة في علاج الروماتزم والنزلات الشعبية والسعال .

(٤٧)

لعة مرة (خيطة — علق)

الاسم الإنجليزي : Bryonia

الاسم اللاتيني : *Bryonia cretica* L.




(لعة مرة)

- الفصيلة : القرعية *Curcubitaceae*
- موطن النبات : سواحل البحر الأبيض المتوسط ، وكذلك العراق .
- الوصف النباتي : عشب متسلق بواسطة المحاليق ، وللنبات جذور درنية . أوراقه راحية التفصيص من ٥ — ٧ أجزاء ، والأزهار صغيرة صفراء أو مخضرة ، وحيدة الجنس ، والثمار لبية حمراء .
- الجزء الطبي : الجذور الدرنية .
- الجوهر الفعال : جليكوسيدات ، وهي بريونين *Bryonin* وبريونودين *Bryonidin*
- الأثر الطبي : الجذور مسهلة ونافعة للصدر والجنب ، وتستعمل اللعبة المرة أحيانا لعلاجا لمرض السكر .
- وهناك نوع آخر يسمى *Bryonia dioica* L. ، منتشر في العراق ، ويحتوى أيضا على جليكوسيد بريونين وهو نافع أيضا في علاج أمراض الصدر .
- وكذلك النوع *Bryonia alba* ويسمونه في البلاد العربية الفاشر أو عنب أبيض ، وله نفس الخصائص .
- السمية : بالإضافة إلى وجود الجليكوسيدات ، توجد في جذور النبات ، وثماره المادة الصمغية بريوريسين *Bryoresin* السامة ، وربما تكون المادة السامة هي كيو كوربيتاسين *Cucurbitacins* .
- ويقال إن ١٥ ثمرة كافية لقتل طفل . ومن أعراض التسمم الاضطرابات المعوية والتقيؤ وآلام البطن والإسهال الشديد .
- (٤٨)

كبار (لصف — شفلح)

- الاسم الإنجليزي : *Caper*
- الاسم اللاتيني : *Capparis spinosa* L.
- الفصيلة : الكبارية (اللصفية) *Capparidaceae*
- موطن النبات : النبات منتشر في معظم البلاد العربية .
- الوصف النباتي : عشب يحمل أوراقا جلدية بسيطة سوية الحافة ، وأذينات شوكية ، وتحمل الأزهار على أعناق طويلة ولها أسدية عديدة ، والثمرة كمثرية . الشكل حسلية .



(كبار)

الجزء المستعمل : الجذور .

الجوهر الفعال : يحتوي النبات على مواد مرة وجليكوسيد الروتين Rutin و حامض بكتيك وصابونيات .

الأثر الطبي : تستعمل الجذور كمدرّة للبول وهي قابضة ، وكذلك القلف وقلف الجذور فاتح للشهية ، كما يستعمل كلبخة لعلاج التهابات . ومنقوع الساق والجذر لها خاصية ضد الإسهال ، وبراعم الأزهار تستعمل لعلاج الاضطرابات في الجهاز البولي وهي في نفس الوقت مدرّة للبول . وفي قطر يستخدمون القلف لعلاج روماتيزم المفاصل .

السمية : أوراق وجذور وثمار وقلف بعض الأنواع سامة للحيوانات وملهية للجلد مثل *C. fascicularis*, *C. tomentosa* .

(٤٩)

كيس الراعى

الاسم الإنجليزي : Shepherd's purse

الاسم اللاتيني : *Capsella bursa - pastoris*

الفصيلة : الصليبية *Cruciferae*

موطن النبات : ينتشر النبات في منطقة البحر المتوسط وكذلك الأردن والسعودية .



(كيس الراعى)

- الوصف النباتي : عشب حولي يحمل أوراقا مفصصة ، والأوراق العليا تحيط بالساق إحاطة تامة ، ويتميز بثماره القلبية الخردلية المبطنطة .
- الجزء الطبي : النبات كله .
- الجوهر الفعال : يحتوي النبات على مشتقات الكولين الذى فصل باسم بورسين Bursine . كما يحتوى على أحماض أمينية وصابونيات وقليل من القلويات وزيت طيارة تحتوى على كبريت . كما تحتوى البذور على Rhamnoglycoside وزيت دهنى .
- الأثر الطبي : للنبات تأثير على وقف النزيف وعلى ضيق الأوعية الدموية . ويستعمل النبات لإدرار الطمث وكمقو ، ولعلاج الاسقربوط ، وكمعرق .

(٥٠)

خيار شمبر

- الاسم الإنجليزى : Cassia pulp
- الاسم اللاتينى : Cassia fistula L .
- الفصيلة : القرنية leguminosae
- موطن النبات : تزرع هذه الشجرة لتزين الطرقات والمنتزهات فى مصر والسعودية وبعض البلاد العربية .
- الوصف النباتي : شجيرة لها أوراق مركبة ، ريشية ، وأزهار صفراء ، والثمار قرون طويلة سوداء ، أسطوانية .
- الجزء الطبي : لب الثمار .
- الجوهر الفعال : جليكوسيد (صبرين) والكاثرتيك .
- الأثر الطبي : مادة مسهلة مثل السنامكى .



(خيار شبر)

(٥١)

سنامكى ، سنامكة (سنا)

الاسم الإنجليزى : Senna

سنامكى إسكندرانى C. senna

الاسم اللاتينى : Cassia acutifolia L .

سنامكى هندى Cassia angustifolia

الفصيلة : البقولية (القرنية) leguminosae

موطن النبات : السودان ومصر وليبيا واليمن والجزيرة العربية .



(سنامكى)

الوصف النباتي : شجيرة أو عشب يحمل أوراقا مركبة ريشية وأزهارا صفراء في نورات غير محدودة ، والثمار قرون مبטطة تحوى عددا من البذور ، وللنبات رائحة قوية مميزة .

الجزء الطبي : الأوراق .

الجوهر الفعال : تحتوى السنامكة على الأنثر وكينونات Anthroquinones ، ومنها بمثل اثنان من الجليكوسيدات أهم العناصر الفعالة وهما السيوسيد و ب Sennosid A & B ، كما فصل منها جليكوسيد غروى يعرف بحامض الكاثرتيك Cathartic acid ، وتحتوى الأوراق أيضا على الصبرين — (ك١٧ يد ١٨ م٧) ، وهو جليكوسيد يوجد فى الصبر ، وعلى الكامفين (ك١٠ يد ١٦) Camphene . وهو تريين صلب يوجد فى الزنجبيل ، وقد أمكن الحصول من السنامكى على جوهرين شديدى الماراة ، هما السناكرول Sennacrol والسنابكربين Senna - picrin . كما أمكن استخلاص صبغة صفراء اللون .

الأثر الطبى : يعد السنامكى من المسهلات المهمة ، لأنه يهيج جدار الأمعاء . أما الحركة الدودية للأمعاء الدقيقة فلا تتأثر به ، ولا يتأثر به إفراز الصفراء . ويفضل دائما نقع الأوراق فى الماء البارد لعدة ساعات ، وعدم غليها فى الماء قبل استعمالها .

ومن مزايا السنامكى ، أنه لا يسبب إمساكا بعد الانقطاع عن تناوله . ويمكن تجنب المغص الذى يسببه بإضافة قليل من صبغة البلادونا أو الداتورة إلى النقيع ، أما الغثيان ، فيمكن تفاديه بإضافة بعض السكر والعرقسوس ، أو نقيع التين أو القراصيا إلى هذا الدواء ، ويجب عدم إعطائه للأمهات فى وقت الرضاعة لأن تأثيره المسهل ينتقل إلى اللبن . ووجد أن النوع *Cassia occidentalis* تخفض نسبة السكر فى الدم .

السمية : معظم أنواع *senna* سامة ، لاحتوائها إلى جانب ما ذكر على حامض الهيدروسيانيك *Hydrocyanic acid* والأنثراكوينونين *antyaquinones* . جاء فى تذكرة داود عن السنامكى ما يأتى :

« السنا نبت ربيعى كأنه الحناء ، إلا أن عوده أدق منها ، ومنه نوع عريض الأوراق ، وتبقى قوته سبع سنوات ، وهو حار يابس يسهل الأخلاط ويستخرج اللزوجات من أقصى البدن ، وينقى الدماغ ويذهب البواسير وأوجاع الظهر ، وإن طبخ بالخل أزال الحكمة والجرب والتمس وأدمل الجروح ومنع سقوط الشعر » .

وفى كتاب الأدوية المفردة للسلطان الأشرف جاء ما يأتى :
« السنا هو الذى يتداوى به ويسمى السنامكى والمستعمل فيه الأوراق ، وهو حار يابس يسهل الصفراء ويغوص إلى أعماق الأعضاء ولذلك ينفع من النقرس وعرق النسا ووجع المفاصل ، وهو ينفع من تشنج العضل والصداع ومن الجرب والبثور والحكمة ، وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا »

أما نبات السنامكى الهندى *Cassia senna* فهو يزرع الآن كمحصول فى مصر على نطاق محدود .

(٥٢)

الحنظل (علقم)

الاسم الإنجليزى : Colocynth

الاسم اللاتينى : *Citrullus colocynthis* Schrad

الفصيلة : القرعية *Cucurbitaceae*

موطن النبات : ينتشر النبات فى أغلب مناطق شمال أفريقيا ، والصحراء الكبرى ، وشبه

- الجزيرة العربية ، والخليج العربى والسودان .
الوصف النباتى : نبات زاحف معمر وله أوراق كبيرة ، مجزأة راحية ، له أزهار إبطية صفراء
عندما تجف ، والبذور بيضية مبטطة قائمة .
الجزء الطبى : لب الثمار والبذور .
الجوهر الفعال : جليكوسيدات شديدة المرارة ، هى الخنظلين Colocynthin
والكوكريناسين Cucurbatacin ، ومن هنا جاء المثل العربى (مر
كالخنظل) ، ومواد راتنجية ، وبكتين ، وصابونيات .
الأثر الطبى : الخنظل مسهل قوى ، ومدر شديد للبول ، ويستعمل السائل المنقصر من



(الخنظل)

بذور الخنظل فى معالجة القراد وجرب الجمال حيث أن به مواد طاردة
للحشرات . ويضيف الأهالى الثوم إلى مغلى الجذور لعلاج لدغة الثعبان ،
كما يستعمل فى علاج الجروح لأن به خواص مطهرة . والنبات سام إذا
أخذ بكميات كبيرة .

يقول داود في الحنظل ما يأتي :

« هو نبت يمتد على الأرض كالبطيخ ، وهو حار يابس ، تبقى قوته إلى أربع سنين ، ويسهل البلغم شربا ، وينفع في الفالج والصداع وعرق النسا والمفاصل والنقرس وأوجاع الظهر ، وطبيخه مع الزيت ينفع في الجذام وأوجاع الأذن والبرقان . »

(٥٣)

زعرور

الاسم الإنجليزي : Hawthorn

الاسم اللاتيني : *Crataegus oxyacantha* L .

الفصيلة : الوردية Rosaceae

موطن النبات : منطقة البحر المتوسط شرقا وغربا .

الوصف النباتي : الاسم *Crataegus* مشتق من الكلمة اللاتينية *Kratos* ومعناها قوة بالنسبة لصلابة خشب أنواعه . وللجنس أنواع كثيرة حوالى ١٠٠٠ نوع . وهى أشجار صغيرة أو شجيرات شوكية وتزرع من أجل الزينة لجمال شجيراتها وجمال أوراقها وأزهارها وثمارها ، وبعض الأنواع ثمار تؤكل .

الجزء المستعمل : الأزهار والثمار والأوراق .

الجوهر الفعال : تحتوى الأوراق والثمار فلافونويد Flavonoids ويحتوى النبات على جليكوسيدات Isoquercitrin و Luleolin ، وصابونيات وقليل من قلويد

. Nicotine

الأثر الطبى : الثمار غنية بفيتامين (c) وحامض الستريك والتارتريك والنبات مدر للبول ، موقف للتنزيف ، مضاد للمغص ومسكن . ويؤخذ لأمراض القلب لتقويته دون حدوث آثار جانبية .

(٥٤)

زعفران

الاسم الإنجليزي : Saffron

الاسم اللاتيني : *Crocus sativa* L .

الفصيلة : Iridaceae السوسنية

موطن النبات : اليونان وتركيا ، ترجع زراعته إلى عهد الأغريق ويوجد برّيا في سوريا



(زعفران)

ولبنان وفلسطين .

الوصف النباتي : عشب معمر ، له كورمة صغيرة ، وأوراق شريطية ضيقة ، أزهاره مفردة ، طرفية ، أرجوانية اللون ، والمياسم برتقالية ، والثمرة علبة تفتتح تفتحا مسكينا .

الجزء الطبي : المياسم وأطراف الأقلام .

الجوهر الفعال : جليكوسيد متبلور في زيت الزعفران يعرف بالبيكروكروسين .
Picrocrocin .

الأثر الطبي : تستعمل الأجزاء المجففة من المياسم وأطراف الأقلام كتابل وكادة صابغة ومعطرة . وفي الطب الشعبي يستعمل كمقو للمعدة ، ومزيل للمغص ، ومسحوق الزعفران مر المذاق ، وله رائحة خاصة ، وله بعض الخواص المنبهة بسبب احتوائه على زيت الزعفران ، لذلك يشرب مغلى الزعفران ، في البلاد الباردة كمنبه عطري مضاد للبرد .

جاء في رسالة داود ما يأتي :

« الزعفران نبات ينبت بالمغرب وأرمينية وزهره حار يابس ، إذا فرك فاحت رائحته ، يفرح القلب ويقوى الحواس ، ويذهب الخفقان وفي الإكحال يحد البصر ويذهب الغشاوة ، وبالعسل يقوى المعدة والكبد ويفتت الحصى ويخرج الفضلات وفاتح للشهية »

وبجانب النوع *Crocus sativa* توجد أنواع أخرى برية ومنزوعة مثل *C. ochroleucus* و *C. Kotschyanus* ، *C. hermoneus* ، *C. hyemalis* ، وهي من نباتات شرق البحر المتوسط المتوطنة .

(٥٥)

ديجيتالس (أصبع العذراء)

الإسم الإنجليزي : Foxglove

الاسم اللاتيني : *Digitalis Lamate Ehrh.* , *Digitalis Purpurea L.*

الفصيلة : حنك السبع *Scrophulariaceae* .

موطن النبات : جنوب وأواسط أوربا ، ويزرع اليوم في كثير من البلاد العربية من أجل



(ديجيتالس)

الزينة .

الوصف النباتي : الديجيتاليس نبات معمر أو ثنائي الحول ، يحمل أزهارا في نورات راسيمية ، أرجوانية اللون ، كبيرة الحجم ، جرسية الشكل ، والثمرة علبة تفتتح مصراعيا . ويسميه العرب بأصبع العذراء .

الجزء الطبي : الأوراق .

الجوهر الفعال : الجليكوسيدات ديجيتالين Digitalin والديجوتوكسين .

الأثر الطبي : الديجيتالين عقار منبه للقلب ، فهو ينظم ضرباته جاعلا الانقباضات أكثر قوة واكتمالا ، وعلى ذلك فهو يجعل مزيدا من الدم يخرج من القلب ،

وبذلك يساعد على قوة الدورة الدموية ، وبتحسين تغذية الجسم ، يسهل التخلص من الفضلات . وقد اكتشف العالم الإنجليزي وليم وزرينج **Withering** خصائص نبات الديجيتالس الطبية بعد إجراء التجارب عليه ، ووضع القواعد العلمية لاستعماله في عام ١٧٨٥ م . وقد استخلصت عدة مركبات من الجليكوسيدات من الأنواع المختلفة للجنس ديغيتالس أهمها **D . purpurea** وقد استخلص منه **Digitoxigenin, Digitoxigenin**، والنوع **D . lanata** وقد استخلص منه الجوكوسيد الثاني وكذلك جلو كوسيد آخر هو **Gitoxigenin** . وقد ثبت أن الجليكوسيد المستخلص من **D . lanata** أقوى بكثير في مفعوله من المستخلص من **D . purpurea** ومن النوع الأول استخلصت جليكوسيدات أخرى أهمها **Digitanid** أو **Lanatoside** .

(٥٦)

دودونيا

الاسم الإنجليزي : Native hops



(دودونيا)

الاسم اللاتيني : *Dodonaea viscosa* L
الفصيلة : السابندية *Sapindaceae*
موطن النبات : موطن الشجرة الساحل الغربى لأفريقيا ، ولكنها أدخلت فى كثير من الدول العربية وخاصة منطقة البحر المتوسط كنبات زينة ، ولعمل الأسيجة ولزراعتها على جوانب الطرق . وتنمو بريا بالمملكة العربية السعودية .

الوصف النباتى : شجيرة دائمة الخضرة تسمو إلى ارتفاع ٢ — ٤ مترا . وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى العالم البلجيكي Robert Dodoens وتحمل أوراقا بسيطة جالسة ظاهرة التعرق رحيمة طويلة . وتحمل أزهارا وحيدة الجنس صفراء أو خضراء ، وتوجد فى نورات قمية غير محدودة . والثمرة علبة جافة مجنحة ، قلبية الشكل ، لها ٢ — ٤ زوائد غشائية جناحية ، وقد تتلون الثمرة باللون الوردى عند نضجها .

الجزء الطبى : الأوراق والقلب .
المادة الفعالة : يحتوى النبات على السابونين وسيتروول وتانين وقلويدات وجليكوسيدات وفلافونات .
الأثر الطبى : تستخدم الأوراق كمعرق وقابض ومخفض لدرجة حرارة الجسم ، كما تستخدم فى حالة الروماتزم . ومن الخارج تستخدم لعلاج الحروق والأورام . والقلب قابض ، أما الأفرع الصغيرة فتستخدم للسواك .

(٥٧)

لبلاب

الاسم الإنجليزي : Lablab beans

الاسم اللاتيني : Dolichos lablab L .

الفصيلة : البقولية (القرنية) Leguminosae

موطن النبات : غير معروف ، ولكنه يزرع في معظم البلاد العربية .

الوصف النباتي : نبات متسلق ، حولي أو معمر ز يحمل أوراقا مركبة ، بها ثلاث وريقات عريضة ، والأزهار بيضاء أو أرجوانية ، والثمار قرنية مفلطحة ورقية ،



والبدور بيضاوية سوداء أو سمراء ، تحمل سرة بيضاء ، ويزرع كنبات للزينة .

الجزء الطبى : البذور والأوراق .

الجوهر الفعال : جليكوسيد دوليكوسين dolichosen وجلوبيولين globulen ، وفيتامين (C) وحديد . ويقال إن البذور تحوى جلو كوسيد Cyanogenetic glycoside

الأثر الطبى : تؤكل البذور بعد غليها ، لإتلاف الجليكوسيد ، وهى منشطة للناحية الجنسية ، وتستخدم أيضا لعلاج الأمراض الصدرية . كما أن الأوراق تستخدم كلبخة لعلاج لدغة الثعبان .

(٥٨)

الديورانتا

الاسم الإنجليزى : Sky flower

الاسم اللاتينى : (D . plumieri Jack) *Duranta repens* L .

الفصيلة : الفيربينية Verbenaceae

موطن النبات : أمريكا وجزر الهند الغربية . وقد انتشرت زراعتها كنبات زينة فى البلاد العربية ، وخاصة مصر وليبيا والسعودية وسوريا ولبنان .

الوصف النباتى : شجيرة دائمة الخضرة ، وساقها مربعة المقطع ، والأوراق متقابلة بسيطة بيضية مطاولة مسننة الحافة ، والأزهار محمولة فى نورات عنقودية ، قائمة أو مدلاة ، والأزهار إما بيضاء أو زرقاء أو أرجوانية ذات متك صفراء ، والثمرة حسلية برتقالية اللون ، وتحتوى الثمرة على ثمانى بذور . يعرف هذا النبات فى بعض البلاد العربية باسم « البنفسج الإفرنجى » .

الجزء الطبى : الأوراق والثمار .

الجوهر الفعال : تحتوى الأوراق على صابونيات Sponins ، وتحتوى الثمار على قلويدات

مماثلة للنااركوتين Narcotine ويستغل عصير الثمار (١) عصير : ١٠٠

جرام ماء) كمحللول قاتل للبعوض .

السمية : كثير من أجزاء النبات سام ، غير أن خطورته تكمن فى انجذاب الأطفال لتناول ثماره ، كما أن مغلى أجزاء النبات يسبب التهاب الفم والحلق عند



(الديورانتا)

تناوله . ومن الأعراض الأخرى للتسمم ، التهاب الحاد في المعدة ،
والقيء ، والإسهال المصحوب بالدم ، الإعياء العام ، التهاب الكلى ،
والصرع الذى يمكن أن يتبع بالوفاة في الحالات الحادة .

(٥٩)

بشملة (لانجدونيا — ناسبولى)

الاسم الإنجليزى : Loqust

الاسم اللاتينى : *Eriobotrya japonica* L .

الفصيلة : الوردية *Rosaceae*


موطن النبات : الصين ، ويزرع اليوم فى كثير من البلاد العربية مثل مصر ، وليبيا وسوريا والعراق .



(بشملة)

- الوصف النباتي : شجرة تحمل أوراقا بسيطة طويلة ، وأزهارا صفراء مبيضة ، والثمار برتقالية اللون ، وتحتوي بذورا بنية قليلة العدد .
- الجزء الطبي : الأوراق والثمار .
- الجوهر الفعال : تحتوي الثمار على حامض المالك . وتحتوي الأوراق على صابونيات وتانينات وفيتامين (B) و (C) .
- الأثر الطبي : مغلي الأوراق نافع جدا في علاج حصى الكلى ، كما تستخدم لعلاج مرض السكر والروماتيزم والكحة .
- تعتبر الثمار مسكنة ، وتمنع القيء والغثيان ، كما أن الأزهار طاردة للبلغم .
- (٦٠)

دهمية أبو بكر (دهمية — الغزال — خلال الغولة)



(دهمية أبو بكر)

- الاسم الإنجليزي : Hemlock geranium
الاسم اللاتيني : *Erodium cicutarium* L.
الفصيلة : الجارونية *Geranaceae*
موطن النبات : سواحل البحر المتوسط من مصر حتى المغرب ، كما يوجد في الكويت والسعودية .
الوصف النباتي : عشب حولي له أوراق مركبة ريشية ، يحمل أزهارا وردية ، والثمار منقارية .
الجزء الطبي : الأفرع المزهرة من النبات .
الجوهر الفعال : صابونيات Tyramine , Coffeine
الأثر الطبي : في الطب الشعبي تستخدم الأفرع المزهرة لوقف نزيف الدم والتسام الجروح وقابض وضد الإمساك ، ويساعد في عملية الولادة . وفي ليبيا نوع آخر . *Geranium robertianum* L. وينتمي لنفس العائلة ، ويستخدم النبات في الطب الشعبي كقابض ومقو ومدر للبول وعلاج لمرض السكر . ومن الخارج يستخدم النبات لعلاج أمراض الحلق واللوزتين .

(٦١)

شقائق (فتجيع — حية المعز)

- الاسم الإنجليزي : Sanke Root
الاسم اللاتيني : *Eryngium* sp. L.
الفصيلة : الخيمية *Umbelliferae*
موطن النبات : حوض البحر المتوسط ، وتنتشر أنواعه في أغلب أقطار الوطن العربي .
الوصف النباتي : يحوى هذا الجنس أكثر من ٢٣٠ نوعا ، ومن أهم ما يميز نباتاته أنها نباتات شوكية حولية أو معمرة ، سوقها وأوراقها تميل إلى اللون البنفسجي في بعض الأنواع .
ومن أهم الأنواع التي تنتشر في العالم العربي :
E. maritimum , *E. Campestre* , *E. glomeratum*
الجزء الطبي : الجذور والأوراق .



(شقاقيل)

الجوهر الفعال : تحتوى جذور النباتات و أوراقها على صابونيات .
الأثر الطبى : تستخدم نباتات هذا الجنس فى أوربا لعلاج أمراض الجهاز البولى . وهو
مدر للبول ومقو للجنس . وفى العراق ومصر تستعمل هذه النباتات لعلاج
الأنيميا والاستسقاء والمغص .

(٦٢)

خشيات — طليحة — شوكة — فاجونيا

الاسم الإنجليزى : Fagonia
الاسم اللاتينى : Fagonia bruguieri DC.
الفصيلة : الرطراطية Zugophyllaceae
موطن النبات : سواحل البحر المتوسط من مصر حتى المغرب ، وكذلك لبنان وسوريا
والسعودية والكويت وقطر واليمن .
الوصف النباتى : عشب ثنائى الخول أو معمر ، مغطى بغدد وحيدة الخلية ، والأفرع مدلاة



(خشيات)

تحمل أشواكا واضحة منحنية قليلا ، أطول من الأوراق المركبة (من ثلاث وريقات) والأزهار صغيرة أرجوانية اللون ، والثمرة علبة والسبلات دائمة .

الجزء الطبي : الأوراق والأزهار والسيقان .

الجوهر الفعال : سكر وصابونيات وجليكوسيدات وقلويدات .

الأثر الطبي : مقو ، مدر للبول ، قابض ، مطهر .

وبالبلاد العربية أنواع كثيرة من الجنس **Fagonia** تحتاج إلى دراسة شاملة ، لمعرفة مكوناتها وتأثيرها الفسيولوجي .

العرق سوس

الاسم الإنجليزى : Liquarice

الاسم اللاتينى : *Glycyrrhiza glabra* L .

الفصيلة : البقولية (القرنية) *Lyguminosae* .

موطن النبات : حوض البحر المتوسط من تركيا شرقا إلى أسبانيا غربا ، وينمو برياً في الشام والعراق وسوريا ، ويزرع في مصر .



(عرق سوس)

الوصف النباتى : نبات معمر له ريزومة أرضية طويلة صفراء من الداخل والجذور درنية غليظة . يحمل أوراقاً مركبة ريشية ، وأزهاراً حمراء متجمعة في نورات راسمية ، والثمرة بقلأ .

الجزء المستعمل : الجذور الغليظة الدرنية والسيقان الأرضية .

الجوهر الفعال : تحتوى الجذور على ٢٪ اسباراجين ، ٣٪ زيوت طيارة ، ومركب حلو الطعم ، جليكوسيد يعرف بالجليسرهزين *Glycyrrhizin* ، وعلى بعض

الجلوكوز والسكروروز . والجليسر هزين أحلى من السكر بنحو ٥٠ مرة ، فهو أحلى مادة طبيعية معروفة ، وقد تم تحضيرها على هيئة بلورات .
الأثر الطبى : عقار منفث أو ملين وخصوصا للأطفال ، والنساء فى أشهر الحمل ، وهو ملطف وواق للأغشية المخاطية ، ولذلك يدخل فى تركيب الأدوية التى تؤخذ لتخفيف حدة السعال . ومشروب منقوعه يستخدم كملطف وملين للتخلص من الأمراض الصدرية ، وأخيرا استخلصت منه مادة تشبه الكورتيزون . وتفيد آخر التقارير الطبية على أنه مفيد فى علاج قرحة المعدة والاثنى عشر .

جاء فى تذكرة داود عن العرق سوس ما يأتى :

« المنتفع به أصله (جذوره) ينفع سائر أمراض الصدر والسعال ، ويخرج البلغم ويحلل الربو ، وأوجاع الكبد والطحال ، والحرقة ، ويدبر الطمث ، ويصلح البواسير ، وينقى الفضلات كلها ، وهو أنفع دواء لمرض اللوثة والخشونة فى الصدر ، وتراخى الحلق وخصوصا مع السكر والتمر هندى ، وأهل مصر يستعملونه كثيرا وهو يسهل ويدبر » .

(٦٤)

حبل المساكين (هيدرا)

الاسم الإنجليزى : Common ivy

الاسم اللاتينى : *Hedera helix* L .

الفصيلة : الأرابية Araliaceae

موطن النبات : أوروبا . ويزرع فى كثير من البلاد العربية من أجل الزينة .

الوصف النباتى : نبات متسلق بواسطة جذوره العرضية ، وله أوراق جميلة مبرقشة ، وله أزهار صغيرة خضراء تحمل فى نورات خيمية ، وثماره سوداء .

الجزء الطبى : الأوراق والثمار .

الجوهر الفعال : صابونيات Saponins ، وجليكوسيد الهيدرلين Glycoside hederin .

الأثر الطبى : تستخدم الأوراق لإدرار الطمث ، وضد التشنجات ، ولشفاء الجروح ، وبعض الأمراض الجلدية . أما الثمار فتستعمل كمسهل ومعرق وضد



(حبل الساكنين)

الحمى .

: الأوراق والثمار سامة لاحتوائها على تريترين صابوجنين Triterpene
sapogenin ويعرف بالهدراجنين hederagenin الذى يسبب القيىء
والإسهال وعدم الإحساس ، وخاصة عند الأطفال . الأوراق تسبب
النفوق للأغنام .

السمية

(النباتات الطبية والعطرية)

حب المسك (هيسكس)

الاسم الإنجليزي : Show flower

الاسم اللاتيني : *Hibiscus rosa-sinensis* L .

الفصيلة : *Malvaceae* الخبازية

موطن النبات : آسيا والصين ويزرع اليوم في معظم البلاد العربية كنبات زينة .

الوصف النباتي : شجيرة دائمة الخضرة لها أوراق متبادلة بسيطة مسننة الحافة ، والأزهار


مفردة ذات لون زاهى وردي أو حمراء ، والأنبوبة السدائية طويلة حمراء

والمياسم حمراء .

الجزء الطبي : الأوراق والأزهار .

الجوهر الفعال : فيتامين B₁، B₂، C، وحديد وجليكوسيد Hibicin hydrochloride

وأكسالات الكلسيوم .



(حب المسك)

الأثر الطبى : تستخدم الأزهار والأوراق لما تحتويه من فيتامينات و مواد مقوية فى عمل
المستحلبات الطبية . كما تستخدم البتلات كشراب منعش عند الإصابة
بالحمى ، وتستخدم أيضا فى عمل المراهم المهدئة . ويقال إن الأوراق لها
مفعول مسهل .

(٦٦)

كر كديه

الاسم الإنجليزى : Roselle



(كر كديه)

الاسم اللاتيني : *Hibiscus sabdariffa* L .

الفصيلة : الخبازية *Malvaceae*

موطن النبات : السودان ومصر ، ويزرع اليوم في كثير من البلاد العربية .
الوصف النباتي : شجيرة صغيرة تعلو إلى ارتفاع مترين ، لها ساق أحمر وأزهار فردية إبطية ، وللزهرة تحت كأس ، والزهرة حمراء اللون ، والثمار حمراء داكنة .

الجزء الطبي : الكأس وتحت الكأس والأوراق والبذور .
الجوهر الفعال : أحماض عضوية مثل المالك والترتاريك ، وجليكوسيد Hibicin hydrochloride وتانين وأكسالات الكالسيوم ومواد ملونة . والبذور تحوى زيوت دهنية .

الأثر الطبي : يستخدم الكأس وتحت الكأس كمصدر لفيتامين (C) وهو مدر للبول ، وملين خفيف ومطهر للأمعاء ، ومخفض لضغط الدم .
أما التويج فيستخدم منقوعه كشراب منعش والبذور منبهة للجنس . وفي الصناعات الغذائية يستخدم الكأس وتحت الكأس في عمل المرببات .

(٦٧)

بليحة (ليبيا)

الاسم الإنجليزي : Fog fruit

الاسم اللاتيني : *Lippia nodiflora* Rich. :

الفصيلة : الفربيونية *Verbenaceae*



(بليحة)

- موطن النبات : مصر وليبيا ، وقد يوجد في بعض الأقطار العربية الأخرى .
 الوصف النباتي : عشب زاحف يحمل أوراقا متقابلة مسننة الحافة ، وأزهارا في نورات هامية
 إبطية لونها وردي أو أرجواني أو أزرق ، وينمو النبات على سطح الأرض
 مكونا مساحات خضراء .
 الجزء المستعمل : الأوراق والأفرع الغضة .
 الجوهر الفعال : يحتوي النبات على جليكوسيدين *nodiflorin A & B* ، ومواد مرة وزيت
 طيار ونترات البوتاسيوم وصنع .
 الأثر الطبي : يستخدم النبات كمدر للبول وملين ومخفض للحرارة ، ويسكن آلام
 المفاصل ويعمل منه لبخة تستخدم لمعالجة الحروق والقروح .

(٦٨)

التوت

- الاسم الإنجليزي : *Mulberry*
 الاسم اللاتيني : *Morus alba L.* توت أبيض
Morus nigra L. توت أسود
 الفصيلة : *Moraceae*
 موطن النبات : آسيا الصغرى وإيران ، ويزرع التوت في معظم البلاد العربية من أجل الثمار
 الحلوة .
 الوصف النباتي : التوت شجرة متوسطة الحجم متساقطة الأوراق ، وأوراقها قلبية لها حافة
 مقروضة ، والأزهار وحيدة الجنس والنبات وحيد أو ثنائي المسكن ،
 والنورة المذكرة هريّة أما المؤنثة فسنبله مستديرة مزدحمة بالأزهار ،
 والثمرة متجمعة لونها أبيض أو أسود حسب النوع . وشجرة التوت
 تزرع منذ أمد بعيد ، وقد ورد ذكرها كثيرا في الإنجيل وكانت معروفة
 جيدا للإغريق والرومان .
 الجزء الطبي : الثمار والأوراق .
 الجوهر الفعال : يحوى اللبن النباتي على جليكوسيد الكويرستين *Quercetrin* .
 الأثر الطبي : تستعمل الأوراق لإدرار البول وطررد الديدان ، ويستخرج من الثمار
 شراب التوت ، ويستعمل أيضا في عمل المربات .



(التوت)

(٦٩)

رشاد (قرة العين — كوبانا)

الاسم الإنجليزي : Water cress

الاسم اللاتيني : *Nasturtium officinale* R. B.

الفصيلة : الصليبية Cruciferae

موطن النبات : شمال أفريقيا ، الشام ، السعودية ، والعراق .

الوصف النباتي : عشب مائي معمر ، يحمل أوراقا مركبة ريشية بها من ٧ — ١١ وريقة ، وأزهارا صغيرة بيضاء في نورات راسمية ، والثمار خردلة قصيرة .

الجزء الطبي : البادرات الحديثة الإنبات وقبل التزهير .

الجوهر الفعال : يحتوي النبات على جليكوسيد *Gluconasturin* وفيتامين (C) و (E) ومواد معدنية مثل اليود والحديد .

الأثر الطبى : يعتبر النبات مصدرا هاما للفيتامينات والمعادن . كما يستخدم مستخلص النبات كمدر للبول ، وفي معالجة التهاب الشعب . ومن الخارج يستخدم لشفاء بعض الأمراض الجلدية ، كالحروق ، وحب الشباب ، كما يساعد على نمو الشعر .
وقد قيل إن النبات نافع في علاج مرض الأسقربوط ومنشط للناحية الجنسية ، ويساعد على نزول الطمث ومانع للحمل .

(٧٠)

دفلة

الاسم الإنجليزى : Oleander
الاسم اللاتينى : Nerium oleander L.
الفصيلة : الدفلية Apocynaceae
موطن النبات : شجيرة دائمة الخضرة موطنها المناطق الدافئة المعتدلة في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط ، وقد اشتق الاسم Nerium من كلمة Neros



(دفلة)

اليونانية وتعنى رطب ، إشارة إلى طبيعة الموضع الأصلي الذى توجد فيه هذه الشجيرات ، وهى الأودية المنخفضة الرطبة . وتوجد برياً فى دول شمال أفريقيا .

الوصف النباتى : للنبات أوراق جلدية سميكة رنجية الشكل ، والأزهار تحمل فى نورات وألوانها متعددة فقد تكون حمراء أو وردية أو برتقالية أو بيضاء مصفرة ، والبعض يعطى أزهاراً مزدوجة والثمرة جرابية مزدوجة .

الجزء الطبى : الأوراق وقلق وجذور النبات .
الجوهر الفعال : لبن نباتى يحتوى على جليكوسيدات النيرين والأوليندرين والفولينيرين

Neriin, Oleandrin, Folinerin

الأثر الطبى : ١ — مغلى الأوراق يستخدم طبياً ، فهو يفيد فى تقليل الانتفاخات .
٢ — الجلو كوسيدات تستخدم كدواء منشط للقلب .
٣ — رغم أن قلف النبات سام جداً ، إلا أنه يستخرج من قلف الجذور زيت يفيد فى علاج أمراض الجلد ، وفى مرض القشرة الصدفية ، وفى الجوائر يستعمل مغلى الأوراق كغرغرة لتقوية الأسنان واللثة ويستعمل أيضاً كنقط للأنف .

السمية : تحوى جميع أجزاء النبات على المادة السامة Oleandrin (Cardioactive glycosides) . يسبب أى جزء من النبات القيء وخفقاناً فى القلب وشللاً فى الجهاز التنفسى والوفاة .

(٧١)

مصاص (مساس — عكوزموس — الزفوف)

الاسم الإنجليزى : Nicotiana

الاسم اللاتينى : Nicotiana glauca R. Grah.

الفصيلة : الباذنجية Solanaceae

موطن النبات : معظم البلدان العربية ، وموطنه الأصلي أمريكا الوسطى .
الوصف النباتى : النبات شجرى معمر دائم الخضرة ، ساقه خشبية قائمة ، والأوراق خضراء مزرق سميكة ، والأزهار أنبوية صفراء .



(مصاص)

- الجزء الطبى : النبات كله .
- الجوهر الفعال : دلت التجارب على أن المصاص يحتوى على جليكوسيد الروتين Rutin الموجود فى نبات السذب *Ruta sp.* إلى جانب بعض القلويدات مثل الأناباسين الموجود فى نبات *Anabasis aphylla* ، وقليل من قلويد النيكوتين Nicotine .
- الاستعمالات : ووجود المادتين الروتين والأناباسين فى نبات المصاص جعله مصدرا دائما واقتصاديا ممتازا للحصول على المادتين المذكورتين بأسعار رخيصة ، دون التقيد بموسم محدد ، أو معاملات زراعية خاصة .
- الأثر الطبى : يستعمل نبات المصاص كمبيد حشرى قوى ، وخصوصا للقضاء على حشرة المن التى تصيب الكثير من المحاصيل الزراعية .
- السمية : تستعمل مادة الروتين فى تقوية جدران الشعيرات الدموية الضعيفة فتمنع النزيف الذى يحدث عند انفجارها .
- معظم أنواع الجنس *Nicotiana* سام لوجود النيكوتين بها .

(٧٢)

حبة البركة (حبة سوداء — كمون أسود)

الاسم الإنجليزى : Nigella

الاسم اللاتينى : Nigella sativa L.

الفصيلة : الشقيقية Ranunculaceae

موطن النبات : حوض البحر المتوسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا .

الوصف النباتى : عشب ينسب اسمه إلى جارية سوداء كانت فى خدمة الرسول عليه الصلاة

والسلام واسمها بركة ، ويعرف أيضا باسم الحبة السوداء ، وللنبات أوراق

مركبة مجزأة تجزيئا دقيقا ، تحمل ثمارا جرابية وبذورا سوداء ، أما الأزهار

فبيضاء اللون تشوبها خضرة ، وسماء ابن البيطار كمون أسود .



(حبة البركة)

- الجزء الطبى : البذور .
الجوهر الفعال : مادة النيجلين Nigelline (جليكوسيد) والنيجلون Nigellone .
الأثر الطبى : يستعمل زيت حبة البركة ضد الكحة والسعال وأمراض الصدر ، وذلك بإضافة ٣ - ٥ نقط من هذا الزيت على الشاي أو القهوة . والزيت مسكن معوى وطارد للغازات ومدر للطمث واللعاب ويعمل على إدرار الصفراء .
وفي الطب الشعبى تستعمل حبة البركة كعلاج للمرارة والكبد .
حبة البركة كئابل : تستعمل فى تعطير المشروبات ، وهى تنافس الفلفل فى استعماله كمحسن لطعم المأكولات .

(٧٣)

قرضاب (غردات ، عصا الراعى ، ذيل القط)

- الاسم الإنجليزى : Knot-grass
الاسم اللاتينى : Polygonum sp.
الفصيلة : الحماضية Polygonaceae
موطن النبات : البلاد العربية المطلة على البحر المتوسط وكذلك السعودية والإمارات والكويت .
الوصف النباتى : أنواع الجنس Polygonum كلها أعشاب حولية ، أو معمرة ، تحمل أوراقا بسيطة رفيعة وطويلة ، وأزهارا محمولة على نورات سنبلية صغيرة خضراء أو حمراء .
الجزء الطبى : الجنور والبذور وربما النبات كله .
الجوهر الفعال : يحتوى النوعان P. persicaria, Polygonum aviculare على أحماض عضوية مثل Polygonic & gallic acids وكذلك Avicularin glycoside . كما تحتوى الجذور على Anthroquinone derivatives ويسمونه فى الشام بطباط .
كما يحتوى النوع P. equisetiforme Sibth. على Phenolic glycosides
وصابونيات وفلافونيات .
الأثر الطبى : معظم النباتات قابضة وتوقف النزيف ، كما تستخدم لالتئام الجروح .



(قرضاب)

ومغلى النبات يوصف لعلاج التهاب الأمعاء المزمن والإسهال والدوسنتاريا والالتهاب الشعبى ، والأوراق والسيقان مُدرة للبول وطاردة للديدان . ومن الظاهر تستعمل لعلاج التهابات الجلدية .
: تحتوى بعض أنواع ال **Polygonum** على أكرالات الكلسيوم فى الأوراق (٧٪) ، وكذلك فهى سامة للإنسان والحيوان .

السمية

أما الأنواع الأخرى التى توجد فى السعودية وهى : **P. setulosum** ، **P. patulum** ، **P. aviculare** فتحتاج إلى دراسة لمعرفة مكوناتها .

(٧٤)

حور

الاسم الإنجليزى : Poplar

الاسم اللاتينى : Populus sp.

الفصيلة : Salicaceae

موطن النبات : شمال وغرب البحر المتوسط ، ويزرع فى أغلب دول شمال أفريقيا .



(حور)

الوصف النباتي : أنواع الحور أشجار عالية ، تحمل أوراقا بسيطة عريضة ، وأزهارها في نورات غير محدودة ، مدلاة تحمل أزهارا وحيدة الجنس ، والنبات ثنائى المسكن ، والأزهار عارية ، والثمار عليية تحوى عددا كبيرا من البذور المغلفة بوبر يساعد على الانتشار بواسطة الريح .

الجزء الطبى : القلف والبراعم .

الجوهر الفعال : جليكوسيد البوبولين Populin والهيوبيوبولين فى الحور الأسود *P. niger* ،

ومادة راتنجية فى النوع *Populus balsamifera* تسمى Balsam poplar

أو بلسم الحور ، كما تحوى براعم أزهار بعض الأنواع زيتا طيارا .

الأثر الطبى : يستعمل القلف كمقو ، وطارد للديدان ، وضد الحمى ، ويسكن الآلام .

ومن خشب الأفرع الصغيرة يصنع الفحم الطبى الذى يستعمل لطرد

الغازات وإزالة الانتفاخ .

(٧٥)

راوند (ريوم)

+



(راوند)

- الاسم الإنجليزى : Rubarb
الاسم اللاتينى : **Rheum officinalis L.**
الفصيلة : الحمضية **Polygonaceae**
موطن النبات : الصين وهضبة التبت وبعض أنحاء أوروبا ، ويزرع فى بعض البلاد العربية لاستخدامه كعقار طبي .
الوصف النباتى : عشب معمر ذو ريزومات كبيرة ، وينتج فى بداية كل موسم عددا من الأوراق الكبيرة جدا ، ونورات زهرية طويلة ، والأزهار صغيرة بيضاء .
وأهم الأنواع **R. tinctorum L.** ويسمونها فوة الصباغين ، وكانت من أهم الصبغات الطبيعية ، وشاعت زراعتها فى جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط ، وما زالت تزرع فى المغرب وإيطاليا ، وتستخلص الصبغات من جذور النبات ، والمنقوع المحضر من الجذور قرمزى زاهى اللون ، ويعرف بأحمر « الديك الرومى » .
الجوهر الفعال : جليكوسيد الأليزارين .
الأثر الطبى : يستخدم مغلى النبات لعلاج معظم أمراض الدم ، خاصة فقر الدم ، وضد الإسهال وخاصة عند الأطفال ، وخلاصة النبات المائية تستخدم كمقو عام ، ومدررة للطمث والبول . ومسحوق النبات يستعمل كلبوسات لمنع الحمل ، ومغلى الجذور فى الزيت يستخدم لعلاج آلام عرق النسا وأمراض أخرى كضغط الدم العالى . ومن الخارج يستعمل لشفاء الجروح والالتهابات ، لاحتوائه على مواد مطهرة أو قاتلة للجراثيم .

(٧٦)

فوة (فوة الصباغين)

- الاسم الإنجليزى : Madder
الاسم اللاتينى : **Rubia tinctorum L.**
الفصيلة : البنية **Rubiaceae**
موطن النبات : منطقة البحر المتوسط .
الوصف النباتى : يطلق اسم فوة على عدد من أنواع الجنس **Rubia** ، وهى شجيرات لها ساق مضلعة وتحمل أوراقا محيطية ، أذيناتها ورقية طويلة مسننة الخافة ، والثمار لبية .

الجزء الطبى : الريزومات وقواعد الأوراق والجذور .
 الجوهر الفعال : جليكوسيدات أهمها الراوندين والأمودين والصبرين .
 الأثر الطبى : الجليكوسيدات قابلة للذوبان فى الماء فتمتص فى الدورة الدموية ثم تفرز فى البول وتكسبه لونا أصفر . والراوند مادة ملية فى حالات عسر الهضم ،
 ومادة مقوية ومدررة للصفراء ومطهرة ، وتزيد من إفراز العصارة المعدية .
 جاء فى تذكرة داود عن الراوند :

« ينفع برد الكبد والمعدة وأنواع الاستسقاء واليرقان والطحال والكلى ، ويقطع الحميات والسعال المزمن والربو ، وإذا مزج بالصبر نقى الدماغ من الصداع والدوار والطنين شربا وسعوطا ، وإذا أخذ مع المواد القابضة كالانسون قطع النزف والمغص ، ومع السكنجبين يفتح السدد ويفتت الحصى ويعالج أمراض المثانة » .

(٧٧)

سفندر (شرابة الراعى)

الاسم الإنجليزى : Butcher's broom
 الاسم اللاتينى : *Ruscus aculeatus* L.
 الفصيلة : الزنبقية *Liliaceae*
 موطن النبات : يزرع السفندر فى الحدائق من أجل الزينة فى معظم البلاد العربية .
 الوصف النباتى : شجيرة صغيرة أو نبات عشبى ، يحمل أفرعا متحورة إلى أشباه الأوراق (سيقان ورقية *Cladodes*) ، التى تخرج من آباط أوراق حرشفية ، وتحمل أوراقا حرشفية أخرى تخرج منها أزهار خضراء ، والثمار لبية حمراء .
 الجزء الطبى : الريزومات والسيقان الورقية (الكلاودات) .
 الجوهر الفعال : الرسكوجينين *Ruscogenin* وهو جليكوسيد ستيريدي *Steroidal glycoside* وزيت طيار وجليكوسيدات صابونية وأملاح البوتاسيوم .
 الأثر الطبى : قابض ومدر للبول ، ويمنع النزيف . ويستخدم النبات فى علاج حالات التهاب الكلى ، والتهابات الجهاز البولى والبواسير .



سفندر (

(٧٨)

سذب ، فيجن ، فيجل

الاسم الإنجليزي : Rue

الاسم اللاتيني : *Ruta graveolens* L.

الفصيلة : السذبية *Rutaceae*

موطن النبات : حوض البحر المتوسط .

الوصف النباتي : عشب معمر يحمل أوراقا متبادلة مركبة ، وأزهارا صفراء محمولة على

نورات سيمية (محدودة) ذات شعبتين ، ويمتاز النبات بوجود أكياس
زيتية طيارة في أنسجته ، والثمرة علية تتركب من عدد من الكرابل
المنفصلة من أعلى .



(سذب)

الجزء الطبى : الأوراق .
الجوهر الفعال : زيت طيار يحتوى على عدد من الكيتونات ، والجليكوسيدات أهمها
الروتين Rutin الذى يشبه الباروزمين Barosmin فى نبات البوشو .
الأثر الطبى : يستعمل فى الطب لطرد الديدان ، وتقوية جدران الأوعية الدموية ،
وزيت السذب مدر للطمث ومفيد للجلد .

(٧٩)

صفصاف

الاسم الإنجليزى : Willow
الاسم اللاتينى : Salix sp. L.
الفصيلة : الصفصافية Salicaceae

موطن النبات : منطقة البحر المتوسط .
الوصف النباتي : أشجار عالية لها أوراق شريطية ، تحمل أزهارا وحيدة الجنس في نورات
زهريّة ، والنباتات ثنائية المسكن ، يوجد كثير من أنواع الصفصاف منها
الصفصاف الأبيض *Salix subserrata* (S. safsaf), *Salix alba*,
S. babylonica, *S. tetrasperma*

الجزء الطبي : القلف ، الأوراق ، الأفرع الصغيرة .
الجوهر الفعال : جليكوسيد الساليسين Salicin ومواد راتنجية . والساليسين يتحلل إلى
Saligenin وإلى Salicglic
الأثر الطبي : القلف مقو ، ويستعمل لعلاج الروماتزم ، كما تستعمل الأوراق كمعركة ،
ومخفضة للحرارة . ومن خشب الأفرع الصغيرة يستخرج الفحم الطبي
الذي يستعمل لطرد الغازات وإزالة الانتفاخ .



منذ ٢٤٠٠ سنة ، استخدم الإغريق خلاصة الصفصاف ، وكذلك
للحاء لعلاج الآلام والصداع والنقرس (داء المفاصل) . كذلك استخدم
سكان أمريكا الشمالية الصفصاف لنفس الأغراض وكانوا يشربون
منقوع الأوراق ، كما كانوا يصنعون من القلف عجينة توضع على الجهة
لإزالة الصداع .

بلسان

الاسم الإنجليزي : Elder

الاسم اللاتيني : *Sambucus nigra* L.

الفصيلة : الكابريفولية *Caprifoliaceae*

موطن النبات : أمريكا الشمالية وشرق آسيا وأوروبا ، ويزرع اليوم في بعض البلاد العربية .



(بلسان)

الوصف النباتي : شجيرة تحمل أوراقا مركبة ، وأزهارا صغيرة ، متجمعة في نوريات كبيرة راسمية ، والثمرة لبية .

الجزء الطبي : الثمار والأزهار والقشور .

الجوهر الفعال : من القشور يحصل على جليكوسيد يسمى سامبونجرين *Sambunigrin*

الأثر الطبي : القشور تساعد على القيء وإفراز العرق ، أما الأوراق فتستخدم كمسكن

للسعال وكمسهل ، ومن الأزهار المجففة يعمل محلول مفيد في معالجة

القروح الجلدية والبشرة الملتهبة ، كما يستعمل مسحوق الأزهار المجففة

كسقوط (نشوق) يساعد على تخفيف الزكام المزمن ، كما يمكن وضع هذا

المسحوق على الجروح لتطهيرها وتخفيفها . وفي تونس والمغرب يوجد نوع آخر من الجنس *Sambucus* يسمى *S. ebulus* واسمه بالإنجليزية Dwarf elder أو Ground elder ويستعملون قلف الشجيرة كمسهل ، أما الثمار فتستعمل لعلاج الروماتيزم ومدرّة للبول ومعركة .
ويسمى السنبوكس بأسماء عربية مختلفة بجانب بلسان منها سمبوقة (ابن البيطار) وبندقة وخابور وخمان .

ويقول داود في البلسان ما يأتي :

« البلسان شجر وفي كتب النصارى أن السيدة العذراء عليها السلام لما هربت بالمسيح وجاءت إلى مصر آوت المطرية ونامت عند بئر ، ومن مائه غسلت ثيابه وأراقت الماء فنبتت هذه الشجرة ، وهو ينفع في علاج الصداع والكحة وأوجاع الحلق والأسنان وضيق النفس والربو والسعال وضعف المعدة وعسر البول والحصى والفالج والمفاصل والقرس وعرق النسا » .

(٨١)

فول العرب (تيج)

الاسم الإنجليزي : Cow-herb

الاسم اللاتيني : *Vaccaria pyramidata* Medicus

الفصيلة : القرنفلية *Caryophyllaceae*

موطن النبات : شمال أفريقيا والعراق وفلسطين والسعودية والكويت .

الوصف النباتي : عشب حولي ، يحمل أوراقا بسيطة ، متقابلة ، جالسة ، وأزهارا وردية جميلة في نورات ثنائية الشعبة ، والثمار تشبه القرون وهي خضراء اللون وتحتوي على بذور صغيرة .

الجزء الطبي : الجذور .

الجوهر الفعال : صابونيات Saponins

الأثر الطبي : تستعمل الجذور لعلاج الجروح ، والخراريج ، وهي مدرّة للطمث واللبن عند السيدات ، وقد تسبب الأوراق شللا للمعضلات إذا أخذت بكمية كبيرة .



(فول العرب)

(٨٢)

سيدا (غبارى — الواك)

الاسم الإنجليزى : Sida


الاسم اللاتينى : Sida jamaicensis L.

Sida paniculata L.

Sida acuta L.

الفصيلة : الخبازية Malvaceae

موطن النبات : مصر .



(سيدا)

الوصف النباتي : عشب أو شجيرة صغيرة ، تمتاز بعض أنواعه بإنتاج ألياف متينة لها ضعف متانة ألياف الجوت .

الجزء الطبي : الجذور والأوراق .

الجوهر الفعال : مادة السابونين من *S. jamaicensis* ، جليكوسيد من النوع

S. paniculata

الأثر الطبي : طارد للديدان ، ومنقوع الأوراق والجذور تستعمل كمسهل . تستعمل

بعض أنواع السيدا طبيا ، في الفلبين والهند ، علاجا للبواسير والحميات

والضعف الجنسي ، وكمقو عام . ويستعمل نقيع الجذور والأوراق أيضا

كملين ومدر للبول وخاصة النوع *Sida acuta*
بالإضافة إلى ما ذكر ، فإن كثيرا من أنواع هذا الجنس تعد مصدرا
للألياف .

(٨٣)

السبانخ

الاسم الإنجليزي : Spinach

الاسم اللاتيني : *Spinacea oleracea* L.



(السبانخ)

- الفصيلة : الرمرامية *Chenopodiaceae*
- موطن النبات : تعد منطقة البحر المتوسط موطنًا للسبانخ ، غير أنه يزرع في جميع أنحاء الوطن العربي .
- الوصف النباتي : عشب حولي ، له أوراق بسيطة ومعنقة ، رمحية الشكل ومفصصة ، أزهاره صغيرة خضراء اللون ، والنبات أحادي المسكن ، أي أن أزهاره المذكورة في نورات طرفية ، والمؤنثة تخرج من آباط الأوراق .
- الجزء الطبي : الأوراق .
- الجوهر الفعال : يحتوي نبات السبانخ على نسبة عالية من المعادن مثل الحديد واليود والكالسيوم ، كما أنه يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين A, K, C وحامض الفوليك . وتتركز الصابونيات في جذور النبات .
- الأثر الطبي : يعد النبات علاجًا للأنيميا وذلك لاحتوائه على الحديد وحامض الفوليك . ويقال إن للسبانخ تأثيرًا واضحًا في خفض نسبة السكر في الدم .

(٨٤)

تمر هندي



(تمر هندي)

الاسم الإنجليزى : Tamarin

الاسم اللاتينى : *Tamarindus indica* L.

الفصيلة : القرنية Leguminosae

موطن النبات : السودان والمملكة العربية السعودية .

الوصف النباتى : شجرة معمرة تصل إلى ٢٥ مترا ، لها تاج كثيف من الأوراق المركبة ، والقرون بنية .

الجزء الطبى : لب الثمار والأوراق .

الجوهر الفعال : يحتوى اللب الأحمر اللون ، المائل إلى السواد ، على الحامض الليمونى

Citric acid والحامض الطرطيرى Tartaric acid والحامض التفاحى

Mallic acid .

الأثر الطبى : التمر هندى ملين خفيف ، ولذلك يضاف إلى كثير من الأدوية التى تعطى

للأطفال . أما نقيع التمر هندى فهو منعش ومبرد ، كما أنه يفيد فى حالات

ارتفاع ضغط الدم والقيء والغثيان والصداع .

وفى بعض البلدان العربية ، تستعمل الأوراق كلبخة ، توضع على

الأعضاء المصابة بالروماتيزم والجروح والحروق ، كما يشرب مغلى

الأوراق فى حالة الحميات .

ويقول داود فى تذكرته عن التمر هندى ما يأتى :

« التمر هندى شجر كالرمان ولب الثمار بارد يابس يسكن الالهيى وهيجان الدم

والقيء والغثيان والصداع ، وهو عظيم النفع فى الأمراض الحارة ، وحبه إذا طبخ

سكن الأورام طلاء » .

(٨٥)

بصل فرعون ، فرعون ، عنصل

الاسم الإنجليزي : Squill

الاسم اللاتيني : *Urginea maritima* L.

الفصيلة : الزنبقية Liliaceae

موطن النبات : سواحل البحر المتوسط ، فهو منتشر في أسبانيا وإيطاليا واليونان والجزائر والمغرب وليبيا وتونس ، وفي مصر على الساحل الشمالى وشبه جزيرة سيناء من رفح حتى السلوم . ويوجد أيضا في بعض مناطق الشام .

الوصف النباتى : بصل العنصل عشب معمر له أبصال كبيرة قد تصل الواحدة منها إلى ٥ كيلوجرامات ، والأوراق رمحية الشكل تظهر فوق سطح الأرض في الربيع ، وتحمل الأزهار على حامل زهرى طويل في فصل الصيف ، والزهرة صغيرة نجمية ، والثمرة عليية الشكل ، تحوى بذورا سوداء لامعة ؛ ولبصل العنصل صنفان ؛ العنصل الأبيض White squill ويتميز



(بصل فرعون)

بلون قشرته الخارجية الصفراء ويعرف بالصنف الإيطالي ، وبصل
العنصل الأحمر أو بصل الفار Red squill ويعرف بالأسباني ، ويرجع
اللون الأحمر إلى وجود مادة الأنثوسيانين في الأوراق .

وبصل العنصل معروف منذ القدم لأطباء الإغريق والمصريين
القدماء ، فقد وصفه الأطباء العرب ، كما وصفه Dioscorides لعلاج
القلب . وكان المصريون يقدسون النبات ويعتبرونه طاردا للشيطان أو
الأرواح الشريرة ، وعثر على تذكرة طبية لهذا النبات في إحدى البرديات
المصرية .

الجزء الطبي : البصلة .

الجوهر الفعال : جليكوسيد سيلارين (أ) Scillarin A ، وسيلارين (ب) Scillarin B
ويحتوى العنصل الأحمر على هذين الجليكوسيدين وعلى جليكوسيدين
آخرين هما : سيلاروزيد Sallaroside وسيلاروبروزيد Scillarubroside

الأثر الطبي : تعتبر مادتا السيلارين (أ) و (ب) المادتين اللتين يرجع إليهما مفعول
النبات في علاج أمراض القلب ، فهما مقويتان له ، وتساعدان على تحسين
ضرباته . كما تساعد مادة سيلارين (ب) على رفع ضغط الدم وتنظيم
ضربات القلب . ويستعمل النبات كمدر للبول في حالة الاستسقاء ،
ويستعمل بصل العنصل كذلك كمنفث قوى ويدخل في تركيب أدوية
الكحة وأدوية الالتهاب الرئوى . ويستعمل بصل العنصل الأحمر كمبيد
للفئران .

السمية : لاحتواء النبات على الجلوكوسيدات المذكورة ، فتأثيرها على الإنسان
والحيوان يشبه تأثير الديجاتالس . وهناك أنواع من الجنس *Urginea* مثل
U. altissema, *U. brachystachys* سامة للإنسان والحيوان ، وتستخدم
في عمل السهام السامة في تنزانيا . ويقال إن الإنسان إذا أصابه سهم
مسمم يموت بعد ثلاث ساعات ، ويمكن إسعاف المصاب بإخراج السهم
وغسل الجرح بالصودا والماء الساخن .

(٨٦)

خرمة (عورور — مصلح النظر)

- الاسم الإنجليزي : Black-leaved mullein
الاسم اللاتيني : *Verbascum sinuatum* L.
الفصيلة : حنك السبع *Scrophulariaceae*
موطن النبات : أواسط أوروبا ، وينمو برياً في شمال أفريقيا والسعودية كما يزرع بكثرة في بعض البلاد الأوروبية والعربية .
الوصف النباتي : عشب مغطى بزغب سميك ، يحمل أوراقاً جذرية بسيطة مجزأة ، وأزهاراً محمولة في نورات راسمية مكتظة ، ولونها أصفر .
الجزء الطبي : الجذور والأوراق والبذور
الجوهر الفعال : سكر فركتوز ، وزيت طيار ومواد هلامية ومواد ملونة وصابونيات .
الأثر الطبي : تستخدم الجذور والأوراق لغسيل العيون لتحسين الرؤية وعلاج التهاب ، ولذلك يسمونه مصلح النظر ، وعلاج المياه البيضاء بتقطير بعض النقط في العين . وفي البلاد العربية الساحلية تنتشر بعض الأنواع الأخرى مثل *Verbascum nigrum* وله نفس الاستعمالات .
وفي ليبيا والشام ينمو نوع آخر اسمه *Common mullein* ، ويسمونه بأذان الدب ، أو لبيدة ، ويستعملونه دواءً ضد آلام المفاصل ، ودواءً مسكناً للسعال ، ونافعاً للترلات الشعبية والإمساك . أما البذور فهي مقوية للجنس ومنبهة . وفي شمال أمريكا يذخنون الأوراق لعلاج الأزمات والتهاب الشعب . وفي اليونان يشربون مغلي الجذور لعلاج الكحة وأمراض الصدر .
وفي مصر ينمو برياً من الجنس *Verbascum* ستة أنواع أهمها *V. sinuatum* . كما ينمو بالسعودية عشرة أنواع منها *V. sinaiticum* ، *V. yemense* ، وتحتاج كل هذه الأنواع إلى دراسة لمعرفة محتوياتها .

(٨٧)

رجل الحمام (رعى الحمام)

الاسم الإنجليزي : Pigeon's grass

الاسم اللاتيني : *Verbena officinalis* L.

الفصيلة : *Verbenaceae* الفريينية

موطن النبات : ساحل البحر المتوسط ، كما تنمو برياً في السعودية وبعض الأقطار العربية .

الوصف النباتي : عشب معمر (٣٠ - ٩٠ سم) والساق مقطعه مربع يحمل أوراقاً بسيطة

مجزأة تجزئاً شديداً والأجزاء عريضة ، ويحمل أزهاراً طرفية في نورات راسمية ، لونها أرجواني .



- الجزء الطبي : النبات كله .
الجوهر الفعال : جليكوسيدات فيرينالين Verbenalin ، وبرينين Berbenin ، وتانين ،
ومواد مخاطية ومواد مرة وأنزيم Emulsin, Invertin ، والجذور
تحتوي Stachyose .
الأثر الطبي : النبات مدر للبول ومدر للبن وللطمث ومعرق وضد الإسهال ، ومخفض
للحراة ومقو ويعالج الروماتيزم .
ويستخدم في حالة الحمى والأنيميا والاستسقاء والأكزيما والجروح .

(٨٨)

بنفسج

- الاسم الإنجليزي : Violet
الاسم اللاتيني : *Viola odorata* L.
الفصيلة : البنفسجية Violaceae
موطن النبات : أوروبا ، ويزرع في معظم البلاد العربية من أجل الزينة ، وكمصدر للزيت .
الوصف النباتي : عشب دائم (١٠ - ٢٠ سم) ، يحمل أوراقا قلبية الشكل ذات أذينات
متحورة إلى ما يشبه الأوراق ، والأزهار مفردة إبطية وحيدة التناظر ،



(بنفسج)

بيضاء أو بنفسجية أو قرمزية ، عطرة الرائحة ، والثمرة عليية تفتح تفتح مسكنا . ويزرع البنفسج من أجل الزينة ومن أجل رائحته العطرية ، في جميع أنحاء الوطن العربي .

الجزء الطبي : النبات كله .

الجوهر الفعال : تحتوى الجذور على جليكوسيد الإيريدين Iridin وصابونيات وحامض Nitropropionic وجليكوسيد Gaultherin ، والذي عند تحليله يعطى حامض السالسليك المثلثي . كما تحتوى البذور على حامض السالسليك وجلوكوسيد ، وتحتوى الأزهار على زيت طيار . كما تحتوى الجذور على قليل من القلويد Odoratine ، وصابونيات .

الأثر الطبي : الأوراق مقيئة ومسهلة وطاردة للبلغم ، وملينة ومعرفة . كما تستخدم من الخارج لعلاج الحروق . وتستخدم الجذور كطاردة للبلغم ، ويستخدم النبات لعلاج حصى الجهاز البولي . كما تستخدم الأزهار في عمل العطور . وثبت أن الـ Odoratine يخفض من ضغط الدم .

كما ويزرع أيضا في الحدائق من أجل الزينة النوع *Viola tricolor* L. وهو البنسيه ، ويشبه البنفسج إلا في شكل الأوراق فهي مسننة الحافة مستطيلة والنبات متفرع والأوراق جذرية . ويحتوى نبات البنسيه على صابونيات وسلسلات وجليكوسيد وبروتين . كما تحتوى الأوراق على Violanin ، و Coumarin ، و Rutin ، والقلويد Violine . وللنبات صفات طبية كالبنفسج فهو مقىء ومدر للبول وطاردة للبلغم ومعرف ، وملين خفيف . كما يستخدم لأمراض القلب والجهاز البولي .

الفصل الثالث

نباتات تحتوى على مواد مخاطية وصموغ ولبن نباتى

المواد المخاطية :

مواد عديدة السكريات ، تكوّن مع الماء محاليل غروانية غير لزجة ، وهى توجد فى أعضاء النبات المختلفة مثل الجذور والريزومات كما فى الخطمية ، أو الأوراق كما فى البوشو ، أو أندوسبرم البذور مثل الحلبة ، أو قصرة البذور مثل الخردل والكتان . ويمكن اعتبار المواد المخاطية مواد تخزينية فى النباتات ، كما أنها تقلل من سرعة التنح فى النباتات الزيروفيتية . ومن الناحية الطبية تستخدم الأعضاء التى تحوى هذه المواد المخاطية أساسا كملينات .

اللبن النباتى :

سائل أبيض أو أصفر أحيانا يعتبر مستحلبا مائيا لخليط من مواد بروتينية ومخاطية وسكرية ، ومن أصماغ وقلويدات ، ومن أملاح وتانين ودهون ، تحوى المادة المنتشرة فى هذا المستحلب مقادير مختلفة من المواد السالفة ، ومن مادة الكاوتشوك التى يصنع منها المطاط ، وفى بعض النباتات كنبات الحشخاش يحتوى اللبن على أحد القلويدات المخدرة الهامة وهو المورفين وفى نبات الباباز يوجد أنزيم الباباين (Papain) الذى يساعد على هضم المواد البروتينية ، وتفرز اللبن النباتى خلايا أو قنوات إفرازية خاصة منتشرة فى أنسجة الساق .

الصموغ :

هى مواد تمتاز بامتصاصها الماء وتحولها إلى مستحلب أو مادة لزجة . هذه المواد تفرزها النباتات على سطح القلف إما بطريقة مستمرة أو عند إصابة النباتات بجروح ، ويعتقد أنها تنشأ من السليلوز أو النشا إثر عمليات أيضية ، والصموغ لا تتخمر بالخميرة ولا تذوب فى الكحول ، وتستخرج من شجر الصمغ العربى *Acacia senegal* وكذلك الكثيراء .

(٨٩)

سنط

الاسم الإنجليزي : Gum Arabic

الاسم اللاتيني : (Acacia nilotica var. tomentosa), *Acacia nilotica* var. *tomentosa* (Acacia arabica var. nilotica)

الفصيلة : البقولية (القرنية) Leguminosae

موطن النبات : مصر والسودان وليبيا وموريتانيا .

الوصف النباتي : شجرة شوكية مستديمة الخضرة ، تسمو لارتفاع ٨ - ١٥ مترا ، موطنها

الأصل السودان ، جذعها مغطى بقلف أسمر داكن يفرز صمغا ،

وفروعها الحديثة تحمل أشواكا طويلة حادة قوية هي أذينات متحورة ،

والأوراق مركبة ريشية ثنائية ، والأزهار صفراء لامعة في نورات هامية



توجد في مجاميع (٢ - ٥) ، والثمرة قرظة ، وهى عبارة عن قرنة توجد بين بذورها انقباضات عميقة تقسم الثمرة إلى عدة فصوص .

الجزء الطبى : الصمغ والقلف والثمار وتسمى القرص .
الجوهر الفعال : يتركب الصمغ من مادة الأرابين Arabin وهى عبارة عن ملح جبرى للحامض العربى Arabic acid ، كما تحتوى الثمار على نسبة من التانين تتراوح بين ١٢ - ٢٠ ٪ .

الأثر الطبى : يستخدم الصمغ كعقار ، كما يستخدم فى صناعة الأقراص الطبية وصناعة الأغذية ، وإذا مزج بالبيض يكون نافعا لمعالجة الحروق ، والقلف والثمار غنية بالتانينات التى تستخدم فى الكثير من الأغراض ، مثل دباغة الجلود . وتستعمل الثمار فى معالجة الجروح المتقيحة والالتهابات الجلدية ، ويستعمل مغليها لمعالجة الإسهال والدوسنتاريا .
وجاء فى كتاب كنوز الصحة أن عجينة الصمغ مع السكر يصنع منها أقراصا تستعمل فى معالجة أمراض الصدر .

(٩٠)

إنجيل (نجم)

الاسم الإنجليزى : Dog grass
الاسم اللاتينى : Agropyron repens L.
الفصيلة : النجيلية Gramineae
موطن النبات : ليبيا والعراق ولبنان وسوريا .
الوصف النباتى : عشب معمر له ريزومة مدادة . يحمل جذورا عرضية تحت الأرض صفراء اللون . سيقانه مجوفة إلا عند العقد . وتصل الورقة سيفى ضيق مستدير القمة والنورة سنبله قائمة .
الجزء الطبى : الريزومات بعد تجفيفها .
الجوهر الفعال : مواد مخاطية تحتوى على Fructosan tritacin بنسبة ٥ ٪ وهو يشبه الأنولين . كما تحتوى الريزومات على زيت طيار وصابونيات وفيتامينات وسكريات ومواد معدنية .



(إنجيل)

الأثر الطبى : تستخدم الریزومات فى الطب الشعبى كملین ومدرۃ للبول ، كما تستخدم
لعلاج التهابات المثانة ، وتستخدم لعلاج الصفراء وحصى المثانة .
ويستعمل مغلى النبات كشراب منشط صيفا ومعرق فى حالات الحمى .
ومغلى البذور يفيد فى حالات طفح الجلد المزمن .

(٩١)

خطمية

الاسم الإنجليزى : Althaea

- الاسم اللاتيني : *Althaea officinalis* L.
الفصيلة : الخبازية *Malvaceae*
موطن النبات : ينمو برياً في سوريا وفلسطين ولبنان ، وتزرع للزينة في أماكن كثيرة من الوطن العربي .
الوصف النباتي : شجيرة أو عشب كبير يحمل أوراقاً كبيرة مفصصة إلى عدد من الفصوص ذات حواف مسننة ، والنبات مغطى بأوبار نجمية ، والأزهار وردية اللون تظهر في مجموعات في آباط الأوراق ، وتمتاز بأنابيبها السدائية الطويلة ، والثمار المنشقة .
الجزء الطبي : الجذور .
الجوهر الفعال : مواد مخاطية .
الأثر الطبي : تستعمل جذور نبات الخطمية كملطف ضد الكحة لوجود المادة المخاطية ، وكملطف للأغشية المخاطية والفم والأمعاء والتهابات اللثة . كما أن الجذور المغلية مع السكر تستعمل كشراب لعلاج الكحة واضطرابات الأمعاء .
ويختلف التركيب الكيميائي للمواد الهلامية لنبات الخطمية عن تركيب مثيلاتها الموجودة بالصمغ العربي مما يجعلها تفوقه في قيمتها واستعمالاتها .

(٩٢ و ٩٣)

كثيراء (شوك القتاد)

- الاسم الإنجليزي : *Tragacanth*
الاسم اللاتيني : *Astragalus* sp.
الفصيلة : البقولية (القرنية) *Leguminosae*
موطن النبات : تنتشر أنواع هذا الجنس في أغلب مناطق الوطن العربي .
الوصف النباتي : أنواع هذا الجنس إما أعشاب أو شجيرات ، بعضها يحمل أشواكاً ، ولها أوراق مركبة ريشية ، وأزهارها إما وحيدة أو في نورات ، وألوانها مختلفة ، والكأس الزهري في بعض الأنواع متنفخ ، والثمار قرنية بعضها كروية الشكل والبعض الآخر ملتوى .
الجزء الطبي : القلف (في بعض الأنواع) وما يفرزه من مادة صمغية التي تسمى



(كثيرا)

Gum tragacanth ، وأشهر الأنواع في إنتاج هذا الصمغ هو :

. A. Gummifer Labill

الجوهر الفعال : الصمغ وما يحويه من نشويات .

الأثر الطبي : يستعمل الصمغ كمعلق لبعض الأدوية ، والأغذية ، ويستعمله العامة

كعقار لعلاج الأغشية الملتهبة ، وطارد للغازات وملين ومبدر للبن .

عشار

الاسم الإنجليزي : Giant milkweed

الاسم اللاتيني : *Calotropis procera* Ait.

الفصيلة : العشارية *Asclepiadaceae*

موطن النبات : مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسعودية والعراق والسودان .

الوصف النباتي : نبات صحراوي يتراوح ارتفاعه من (٢ - ٣) مترا ، يحمل أزهارا



بنفسجية مخضرة اللون ، وثمارا كروية منتفخة الشكل ، وتحوى أنسجة النبات اللبن النباتي ، وينتشر النبات في غرب ووسط الهند وفي إيران وأفريقيا الاستوائية .

الجوهر الفعال : السائل اللبني السام ويحتوى السائل على مادة التربسين Trypsin ومواد سامة أهمها كالوتروبين Calotropin وأسكارين Uscharin وكالوتركسين Calotroxin . كما يحتوى النبات على مادة مطاطة Caoutchouc . وتبلغ سمية المواد السامة ١٥ - ٢٠ مرة ضعف مادة الأستركنين المعروفة ، والموجودة في بذور نبات الجوز المقيء :

الأثر الطبى : تعتبر المادة اللبنية ملهبة للجلد إذا ما لامسته ، وفي الهند تستعمل هذه المادة مخلوطة بنباتات أخرى كمسهل قوى ، كما تستعمل علاجا موضعيا في حالات الروماتيزم ، كما يستعمل قلف النبات في علاج الدوستاريا كبديل للأبيكاك ، ويستعمل منقوع الأزهار بكميات صغيرة جدا في علاج البرد والكحة والربو وعسر الهضم ، أما قلف الشجرة فهو مفيد في حالة الدوستاريا والورم الفيلى .

السمية : يحتوى اللبن النباتي على Cardiac glycoside وهو سام جدا ، ويستخدم لتسميم السهام في أفريقيا ، والقليل منه يسبب الوفاة .

(٩٥)

خرشيف (شوك الجمل)

- الاسم الإنجليزي : Blessed thistle
 الاسم اللاتيني : Carduus benedictus auct L.
 الفصيلة : Compositae
 المركبة :
 موطن النبات : منطقة شمال أفريقيا .
 الوصف النباتي : عشب شوكى يحمل أزهارا صفراء في نورات هامية محاطة بأوراق عريضة مبرقشة بداخلها غلافة شوكية طويلة .
 الجزء الطبى : النبات كله ما عدا الجذور .
 الجوهر الفعال : يحتوى النبات على مواد مخاطية وتانينات ولاكتونات وزيت طيار قاتل



(خرفيف)

للبكتريا .

: نبات مقو ومصلح للمعدة ومضاد للمغص ومدر للبول ، ويعطى
للسيدات الحوامل لمنع القيء ، ومنشط للغدة الصفراوية ولذلك يعطى في
حالات أمراض الكبد .

من الخارج يستعمل لعلاج التقرح والجروح والنزيف .

الأثر الطبى

باباظ (باباى)

الاسم الإنجليزى : Papaya

الاسم اللاتينى : *Carica papaya* L.

الفصيلة : الباباوية Caricaceae

موطن النبات : الباباظ موطنه جزر الهند الغربية والمكسيك ، ويزرع اليوم فى الهند والملايو



(باباظ)

وكاليفورنيا وفلوريدا وجزر هاواي ، كما يزرع في كثير من البلاد العربية كمصر والسودان والصومال وينمو برى باليمن .

الوصف النباتي : شجرة الباباظ نبات عشبي كبير يشبه الشجرة ، حيث يبلغ ارتفاعها ٨ أمتار ، وهو وحيد المسكن ، والساق قائمة عصارية ، ويوجد في نهايتها تاج يتكون من الأوراق الراحية الكبيرة المجزأة إلى سبعة فصوص ، والأزهار صفراء والثمار لبية لحمية تحوى بذورا كثيرة سوداء اللون .

الجزء الطبى : كل أجزاء النبات بما في ذلك الثمار الغير الناضجة .

الجوهر الفعال : لبن نباتي يحوى خميرة هاضمة تسمى بابين Papain ، تؤثر على البروتينات بنفس مفعول البيسين ، كما ثبت أنه يشفى الجروح الملوثة حيث إنه يقضى على البكتيريا .

الأثر الطبى : يساعد على الهضم ، وثبت أن النبات يخفض من نسبة السكر في الدم ، ويعالج المصابين بالديدان المستديرة ، وتستعمل المادة البنية في صناعة العلك ، كما تستعمل الثمار في عمل السلاطة والفظائر والشربات والحلويات .

ومن الملاحظ أن البابين لا يحتاج إلى الوسط الحامض لكي يعمل ، بل يعمل في الوسط المتعادل والقلوى والحامضى على السواء . ويحتوى البابين على عدة أنزيمات : الأول يهضم البروتينات هضما جزئيا فيحوها إلى ببتونات ، والأنزيم الثانى يشبه أنزيم الرنين Renin وهو يجين اللبن ، والأنزيم الثالث يهضم النشويات ، كما يوجد أنزيم رابع يهضم المواد الدهنية هضما جزئيا .

وتحتوى ثمرة الباباظ بالإضافة إلى الأنزيمات على حوالى ٥,٠ ٪ مواد كربوهيدراتية وأملاح ، أهمها أملاح الكالسيوم والمغنسيوم والحديد . كما تحتوى الثمرة الخضراء على السكروز (سكر القصب) Sucrose ومواد راتنجية ، بالإضافة إلى أملاح حامض الترترك Tartaric acid والستريك Citric acid .

(٩٧)

شيكوريا (سريس)

الاسم الإنجليزى : Chicory

الاسم اللاتينى : *Cichorium intybus* L.

الفصيلة : المركبة *Compositae*

موطن النبات : أوروبا ، ويزرع اليوم فى مناطق عديدة من الوطن العربى كنبات للسلطة وكخضار .


الوصف النباتى : نبات معمر له جذر وتدى طويل وساق خشنة متفرعة ، وأوراق قاعدية ، وأزهار زرقاء .

الجزء الطبى والتأبيل : البذور والجذور والأزهار .



(شيكوريا)

- الجوهر الفعال : تحتوى بذور الشيكوريا على سليولوز ومادة نتروجينية ودهون . أما
الجذور فتحتوى على أملاح معدنية ومواد مخاطية وأنيولين ، كما تحتوى
الأزهار على جليكوسيدات .
- الأثر الطبى : تستخدم الشيكوريا كمصلحة للمعدة ومدرّة للبول وملينة . أما عصير
الأوراق فيعطى مع زيت اللوز كملين للأطفال وطارد للغازات ،
وتضاف البذور إلى القهوة والشاي لتكسيها لونا وطعما مميزا ، وكذلك
مسحوق الجذور .



(كليودندرون)

(٩٨)

كليرودندرون (ياسمين زفر)

- الاسم اللاتيني : *Clerodendron* sp. L. :
الفصيلة : *Verbenaceae* الفربيونية
موطن النبات : يزرع في البلاد العربية من أجل الزينة ، وموطنه الأصلي الملايو .
الوصف النباتي : شجيرة دائمة الخضرة بعضها متسلق ، وللجنس أنواع كثيرة منها
C. fragrans ، *C. siphonanthus* ، *C. inerme* ، *C. speciosissimum*
ولالأزهار رائحة زكية وتحمل أزهارا حمراء في النوع الأول وبيضاء في
النوع الثاني والثالث ، وتمتاز الأزهار بأسديتها الطويلة الحمراء . والاسم
Clerodendron مشتق من الكلمتين اليونانيتين *Cleros* وتعنى الحظ ،
Dendron وتعنى شجرة ، أى أن الاسم : شجرة الحظ .
الجزء الطبي : الأوراق والجذور والصمغ .
الأثر الطبي : ثبت أن أصماغ بعض أنواع الكليرودندرون تستخدم في علاج
الروماتيزم ، كما تستخدم الأوراق والجذور لبعض الأنواع لعلاج الأورام
وبعض الأمراض الجلدية ، كما يستخدم الزيت المستخرج من الجذور في
علاج الأغشية المخاطية للأنف وكذلك في علاج حمى الملاريا
والروماتيزم .

(٩٩)

عليق

- الاسم اللاتيني : *Convolvulus* sp. L. :
الفصيلة : *Convolvulaceae* العليقية
موطن النبات : معظم أقطار الوطن العربى .
الوصف النباتي : أنواع هذا الجنس تمتاز بوجود المادة اللبنة وتحمل أوراقا بسيطة سهمية ،
والأزهار مفردة لها تويج قمعى الشكل ، والثمرة علبة تتفتح مسكنيا



(علق)

والبذور كمثرية الشكل تتميز بخشونة سطحها .

ويشمل الجنس *Convolvulus* على عدة أنواع منها *C. scamonia* والذي يسمى محمودة ، وينمو في أغلب البلاد المطلة على ساحل البحر المتوسط .

توجد الكثير من أنواع هذا الجنس وأشهرها النوع *C. althaeoides* ، *C. arvensis* وهما شائعان أيضا في الحقول والحدائق ويتسلقان النباتات .

الجزء الطبى : الأوراق والفروع المزهرة .

الآثر الطبى : تستخدم الأوراق وكذلك الفروع المزهرة في علاج الكحة والأزمة الربوية ، وأيضا في علاج الجروح .

(١٠٠)

مخيط (باتيار)

الاسم الإنجليزي : Assyrian plum

الاسم اللاتيني : *Cordia myxa* L.

الفصيلة : البوراجينية *Boraginaceae*

موطن النبات : يوجد برى بالسودان وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج ، ويزرع في كثير من البلاد العربية .

BLACK



(مخيط)

الوصف النباتي : شجرة متساقطة الأوراق تسمو إلى ارتفاع سبعة أمتار تقريبا ، والأوراق بسيطة بيضاوية ، والأزهار بيضاء ، والثمار حسلية بنفسجية اللون ، حلوة وتؤكل .

وتزرع الشجرة في بعض البلاد العربية كمصر وليبيا والعراق كشجرة زينة ، وتسمى الثمار عادة بالسايستان .

الجزء الطبي : الثمار والقلب والأوراق .

الجوهر الفعال : مواد نشوية ومواد مخاطية وصمغ .

الأثر الطبي : تؤكل الثمار في حالات الأمراض الصدرية ، وأمراض الجهاز البولي فهي مدرة للبول ، ومليئة ، وطاردة للبلغم ، كما تستخدم البذور للتخلص من ديدان الأمعاء . أما منقوع القلب فيستعمل في حالات عسر الهضم والتخمة . وتستخدم الأوراق في حالات القروح .

(١٠١)

تين

الاسم الإنجليزي : Fig

الاسم اللاتيني : *Ficus carica* L.

الفصيلة : التوتية *Moraceae*


موطن النبات : شمال أفريقيا وفلسطين وسوريا والعراق والسعودية .

الوصف النباتي : التين شجرة صغيرة ذات أوراق مفصصة ، والثمرة تينية ذات حامل لَحْمِي أجوف ، وهناك طرز عديدة مختلفة من التين منها التين العادي وتين كبرى وتين سمرا وتين سان بدرو .

وفي التين العادي تنمو الثمرة بدون تلقيح وليس بها بذور ، والثمار لا يمكن تجفيفها ، أما تين كبرى فهو نوع برى عديم القيمة ، إلا أنه يزرع في البلدان المنتجة للتين لضرورته في عملية تلقيح تين سمرا الذي يجفف .

الجزء الطبي : الثمار .

الأثر الطبي : تستعمل ثمار التين طازجة أو مجففة أو معلبة بكميات كبيرة في صناعة الفطائر ، فضلا عن قيمته الغذائية فإن له صفات طبية هامة ، والمواد



(تين)

الفعالة في التين مواد مطهرة وأخرى هلامية ، ويستعمل التين من الظاهر
في علاج الجروح والقروح بتضميدها بثمار التين المجففة والمغلية بالحليب .
ويعالج التين الإمساك بمنقوع الثمار الجافة ويشرب ماؤها على الريق مع
الشراب .

(١٠٢)

الجميز

الاسم الإنجليزى : Sycomore

الاسم اللاتينى : *Ficus sycomorus* L.

الفصيلة : التوتية Moraceae

موطن النبات : مصر والسودان وسوريا وفلسطين والأردن والسعودية .

الوصف النباتى : شجرة دائمة الخضرة ، تحمل أوراقا بسيطة قلبية الشكل عريضة متقابلة

وسميكة ، وتحوى أنسجة النبات مادة لبنية ، والنورة تينية Syconium ،

والأزهار وحيدة الجنس ، والثمرة مركبة كاذبة من عدد من الأكينات .



(جميز)

الجزء الطبى : اللبن النباتى .
الأثر الطبى : كان المصريون ، ولا يزالون ، يستخدمون لبن الشجرة فى علاج بعض الأمراض الجلدية . وكان المصريون القدماء يقدسونها ، ومن مظاهر ذلك أسماء بعض المدن المصرية والسودانية .
أما الثمار فتؤكل كفاكهة لذيذة .

(١٠٣)

خبيزة

الاسم الإنجليزى : Mallow
الاسم اللاتينى : *Malva sylvestris* L., *M. parviflora* L.
الفصيلة : الخبازية *Malvaceae*
موطن النبات : حوض البحر المتوسط ، كما توجد فى السعودية والكويت والبحرين .
الوصف النباتى : عشب حولى زاحف أو قائم ، ينمو على شكل دائرى ، أوراقه معنقة



(خبيزة)

راحية ، وأزهاره كبيرة وردية أو بنفسجية اللون تخرج من آباط
الأوراق . والثمار منشقة قرصية الشكل ، وتحتوى كل كربة بذرة
واحدة ، ويحتوى النبات على مواد مخاطية .

الجزء الطبى : النبات كله .

الجوهر الفعال : مواد مخاطية .

الأثر الطبى : يستعمل مغلى الأوراق مع زهر البابونج كمضمضة لعلاج آلام الأسنان .

(١٠٤)

ودنة (انم — مصيص)



(ودنة)

الاسم الإنجليزي : Psilium

الاسم اللاتيني : *Plantago ovata*, *P. psyllium*, *P. indica* L.

الفصيلة : *Plantaginaceae* الحملية

موطن النبات : شمال أفريقيا ، السودان ، السعودية ، البحرين والكويت .
الوصف النباتي : عشب يحمل أوراقا جذرية بسيطة ، والتعرق فيها متواز ، وهي عديمة الأذينات ، ويحمل أزهارا في نورات سنبلية ، والثمار عليية تفتتح بشق مستعرض .

الجزء الطبي : البذور . وأحيانا الأوراق .

الجوهر الفعال : مادة مخاطية تسمى البسيليم وزيت دهنية .

الأثر الطبي : المادة المخاطية ذات مفعول ملين ، وتشبه الأجار في علاج الإمساك المزمن ، وإذا استخلصت المادة المخاطية ، يمكن استعمالها في مستحضرات التجميل .

وفي البلاد العربية المطلة على البحر المتوسط تنمو أنواع كثيرة من *Plantago* منها *P. afra* ويسمون بذوره بذر قطونة ، وكذلك *P. coronopus* ويسمونه ودينة . وكذلك الأنواع *P. lagopus* *P. lanceolata* التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث .

وتستخدم جذور النوعين الأخيرين في علاج الدوالي وعلاج حمى الملاريا ، كما توضع الأوراق على الخراج والالتهابات لعلاجها ، كما تستخدم الأوراق لإيقاف النزيف وتسكين الآلام .

(١٠٥)

لسان الحمل

الاسم الإنجليزي : Great plantain


الاسم اللاتيني : *Plantago major* L.

الفصيلة : الحملية Plantaginaceae

موطن النبات : ينمو النبات في الأماكن الجافة والصحراوية ، وكذلك المائية ، في حوض البحر المتوسط .

الوصف النباتي : عشب معمر يحمل أوراقا كبيرة بسيطة لسينية ، عروقه متوازية قرينة من سطح الأرض ، وتخرج النورات من آباطها . والنورة سنبلية بسيطة ، والأزهار صغيرة خضراء . والثمرة عليية حقية تتفتح تفتحاً مستعرضاً . والبذور أندوسيرمية وبها الجنين مستقيم وسط الاندوسيرم الشحمي ، وقصرة البذرة ، غروية تتنفخ بالماء .

الجزء الطبي : الأوراق والبذور .



(لسان الحمل)

الجوهر الفعال : تحتوى الأوراق على حامض الستريك وأملاح البوتاسيوم . كما تحتوى
البذور على أحماض عضوية وزيت دهنى .
الأثر الطبى : للنبات آثار مطهرة ومضادة للحيويات ، ويستخدم لعلاج آلام الأذن .
ومن الخارج يستخدم النبات كقابض ولبخة لعلاج قرص الحشرات . كما
تستخدم البذور كمسهل ومدرّة للبول وطاردة للديدان ، وفى علاج
الدوستاريا . ونقيع الأوراق يستخدم كغسيل للعيون لإزالة التهاب
القرنية والجفون . أما الأوراق فيستخدم مغليها لعلاج الربو .

(١٠٦)

ثقيتيا (دفلى أصفر)

الاسم الإنجليزى : Thevetia

الاسم اللاتينى : Thevetia nerifolia L.

الفصيلة : الدفلية Apocynaceae



(ثقيتيا)

- موطن النبات : موطن النبات الأصلي جزر الهند الغربية ، والمكسيك ، كما ينمو في المناطق الاستوائية والمعتدلة . أدخلت زراعته في معظم البلاد العربية .
- الوصف النباتي : نبات شجيري ، عصارته لبنية ، وأوراقه شبه شريطية ، وأزهاره صفراء ، ثماره خضراء قبل نضجها ، تشبه ثمار اللوز ، يتغير لونها إلى الأسود عند النضج .
- الجزء الطبي : اللبن النباتي والقلف .
- الجوهر الفعال : اللبن النباتي سام جدا وقلفها مر . ويحتوى على الـ Cardiac glycosides أهمها Thevetin ، Thevetoxin .
- الأثر الطبي : يستخدم القلف في الطب كمسهل قوى ومهدئ للحمى ، وخصوصا الحمى الراجعة Intermittent fever وهو منبه للقلب . لاحتوائه على الجليكوسيدات على أن يؤخذ بحذر .



(حرجل)

(١٠٧)

حرجل

- الاسم اللاتيني : *Solenostemma argel* L.
الفصيلة : *Asclepiadaceae* العشارية
موطن النبات : حوض البحر المتوسط والسودان واليمن .
الوصف النباتي : عشب معمر يحمل أوراقا بسيطة ، وأزهارا صغيرة بيضاء مجمعة في نوريات خيمية ، والثمار بيضاوية ملساء متحجرة ، ولونها حمراء داكنة .
الجزء الطبي : المادة اللبنية .
الأثر الطبي : يستخدم النبات كمسهل ، وتستخدم الأوراق بديلا عن السنا .
وفي السعودية ينمو النوع *S. oleifolium* وهو شجيرة لها أوراق جلدية وأزهار بيضاء مخضرة . وللنبات رائحة تابلية حلوة ، والنبات يحتاج إلى مزيد من البحث لمعرفة مكوناته واستخداماته .

(١٠٨)

جمضيض (جلوتين — عضيد — تيفاف)

- الاسم الإنجليزي : Snow thistle
الاسم اللاتيني : *Sonchus oleraceus* L.
الفصيلة : *Compositae* المركبة
موطن النبات : منطقتا البحر المتوسط والخليج العربي .
الوصف النباتي : نبات حولي قائم ، مغطى بوبر ، وأوراقه بسيطة مفصصة ، وحافتها مسننة ، والقاعدة تحيط بالساق إحاطة تامة ، والنورات طرفية صفراء .
والنبات يحوى لبنا في أنسجته .
الجزء الطبي : النبات كله .
الجوهر الفعال : يحتوى النبات على فيتامين (C) ، وسترولات ومطاط .
الأثر الطبي : النبات مسهل قوى ، ومقو ومدر للبول ، ومضاد للاسقربوط .



(جمعيض)

وعصارة النبات تستعمل لعلاج آلام المعدة ومن الخارج لعلاج الجروح ،
وعصارة الأوراق تستخدم لعلاج أمراض الكبد كالصفراء وكنقطة
للعيون . أما الجذور فطاردة للديدان .
وفي البلاد التي تطل على ساحل البحر المتوسط يوجد الكثير من أنواع
الجمعيض كلها تحتاج إلى دراسة محتوياتها الكيميائية .

الفصل الرابع

نباتات طيبة تحتوى على

راتنجات وبلاسم وتانينات

الراتنجات : Resins :

وهى مواد ذات تركيب كيمائى معقد جدا ، وتنتج عن أكسدة أنواع مختلفة من الزيوت العطرية ، وتفرز فى قنوات أو فجوات داخل النباتات ، وتسيل عادة على سطح القلف حيث تتجمد عند تعرضها للهواء ، وتتواجد المواد الراتنجية وحدها أو متحدة مع الزيوت العطرية أو الصمغ ، وهى غير قابلة للذوبان فى الماء ولكنها تذوب فى الإثير والكحول .

وهناك عدد من الفصائل النباتية تشمل نباتات تعتبر مصدرا لهذه الراتنجات ، وأهمها الفصائل الديتروكاربية ، والبورسيرية ، والأناكاردية ، والقرنية ، والهاماميلية ، والجوتفرية ، والخيمية ، والاستيركية ، والصنوبرية والزنبقية .

وتتكون الراتنجات من ثلاثة عناصر هى الكربون والأيدروجين والأكسجين .

وكثيرا ما يستعمل الاسم الواحد للدلالة على مواد متباينة للغاية ، وكثيرا ما تسمى

الراتنجات صموغا . ويمكن تقسيم الراتنجات إلى ثلاث مجموعات هى :

(١) الراتنجات الجامدة : وهى عادة صلبة شفافة هشة مثل المصطكى والكينو .

(٢) الراتنجات الزيتية : مواد سائلة نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت العطرية

مثل البلاسم والميعة والجاوى .

(٣) الراتنجات الصمغية : وهى خليط من الصمغ الحقيقية والراتنجات ، وتجمع بين

صفات المجموعتين السابقتين ، ومن أمثلتها المر ولبان الذكر .

التانينات (مواد دباغية) :

وهى مواد تفرزها النباتات ، ولها القدرة على الاتحاد مع البروتينات وتمنع تحللها . وقديدا

التعريف غير صحيح ، لأن هناك مواد أخرى تفرزها النباتات وتشبه فى تركيبها التانينات ،

ولكنها لا تعمل على منع تحلل البروتينات ، ولذلك فمن الصعب تعريف التانينات تعريفا

محدودا وصحيحا . وأهم مصادر التانينات أجزاء النباتات الغنية بالقلويدات ، كالقلف فى

الأكاسيا والسكونا ، والأوراق فى الشاي ، والبذور فى الكاكاو والكمون .

تنوب

الاسم الإنجليزي : Silver fir (Common spruce)

الاسم اللاتيني : *Abies alba* L.

الفصيلة : الصنوبرية *Pinaceae*

موطن النبات : غرب البحر المتوسط في المغرب والجزائر .

الوصف النباتي : شجرة دائمة الخضرة ، تسمو لارتفاع ٤٠ مترا ، والأوراق إبرية قصيرة مفلطحة ، تتميز بوجود خطين لونهما أبيض عند القاعدة ، وتحمل الشجرة نوعين من المخاريط : مخاريط مذكرة تخرج من آباط الأوراق ، ومخاريط مؤنثة تخرج من الأفرع متجهة إلى أعلى ، وتستمر في ذلك بعد نضجها .

الجزء الطبي : الأوراق والبذور .

الجوهر الفعال : الزيت والبلسم الذي يستخرج منهما .

الأثر الطبي : تستخدم الأوراق كمطهر ، وضد الروماتزم ، أما مغلى الأوراق

فيستخدم لعلاج الأمراض الجلدية والتهاب المفاصل ، كما يستخدم البلسم

لعلاج اللباجو والروماتزم . أما البذور فتستخدم لتنشيط الدورة

الدموية ، والنبات معروف منذ القدم كمطهر للجهاز البولي .

ويوجد بلبنان وسوريا وفلسطين النوع *Abies cilicica* وكذلك

النوع *A. manus* .

كزبرة البئر


(كزبرة الماء — كزبرة البئر)

الاسم الإنجليزي : Maidenhair

الاسم اللاتيني : *Adiantum capillus-veneris* L.

الفصيلة : الأديانتية *Adiantaceae*

موطن النبات : سواحل البحر المتوسط ، شرقه وغربه .



(كزبرة البئر)

الوصف النباتي : عشب سرخسي ، وسمي بهذا الاسم بسبب مشابهة أوراقه لأوراق نبات الكزبرة ولكثرة وجوده في الآبار ، حيث يتوفر الظل والماء .
وينتشر في الأماكن الظليلة الوفيرة الرطوبة ، مثل الآبار والسواقي على سواحل البحر المتوسط . وللنبات ريزومة تنمو تحت سطح التربة ، تنشق من سطحها السفلي جذور عرضية ومن سطحها العلوي الأوراق السرخسية الكبيرة الريشية الثنائية ، وتحمل الرويشات الحوافظ الجرثومية

عند حوافها .

الجزء الطبي : الأوراق السرخسية .

الجوهر الفعال : تانين ، ومواد مخاطية و صموغ ومواد مرة .

الأثر الطبي : تستخدم الأوراق السرخسية كطارد للبلغم وملين . أما مغلى الأوراق

المركز يستعمل لإدرار الطمث ، أما منقوعها فيستعمل لعلاج البرد

والتهاب الشعب واحتباس الصفراء والبول .

وخلاصة النبات تستخدم في تقوية الشعر .

(١١١)

حورة

الاسم الإنجليزي : Alder

الاسم اللاتيني : *Alnus glutinosa* L.

الفصيلة : البتولية Betulaceae



(حورة)

- موطن النبات : حوض البحر المتوسط والسودان .
الوصف النباتي : شجيرة صغيرة تحمل أوراقا بسيطة ، لرجة ، ومن هنا اشتق الاسم
glutinosa ، وتحمل أزهارا وحيدة الجنس .
الجزء الطبي : القلف والأوراق الخضراء .
الجوهر الفعال : تانين ومواد صمغية .
الأثر الطبي : القلف قابض ويستخدم كغرغرة في حالة التهاب الحلق . منقوع القلف يعالج
الحروق أما مسحوقه فيستخدم لتنظيف الأسنان والتهاب اللثة .

(١١٢)

كندر (لبان ذكر)

- الاسم الإنجليزي : Olibanum
الاسم اللاتيني : *Boswellia carterii* L.
الفصيلة : البورسيرية Burseraceae
موطن النبات : المملكة العربية السعودية والصومال وكذلك دول شرق البحر المتوسط
والسودان .
الوصف النباتي : أشجار صغيرة ، تحمل أوراقا مركبة ريشية متبادلة ، وأزهارا صغيرة
متجمعة في نورات راسمية ، ويحوى النبات قنوات راتنجية .
الجزء الطبي : القلف وما يسيل من الراتنج .
الجوهر الفعال : صمغ راتنجي له رائحة عطرية ، وطعم فيه شيء من المرارة ، ويتركب من
٦٠ — ٧٠٪ راتنج ، ونحو ٣٠٪ صمغ ، ٣ — ٨٪ زيوت طيارة . وأهم
المركبات التي يحتوى عليها الكندر هو آيدروكربون ويعرف بالاوليين
(ك١٠ يد١٦) Olibene .
الأثر الطبي : من خواص هذا الراتنج أنه منبه ومدر للطمث ونافع في التهابات الحنجرة
والشعب ، ويدخل في تركيب كثير من الضمادات (اللزقات)
ومساحيق التبخير ضد العدوى ، كما يستخدم في البلاد الشرقية في
البخر ، وعمل بعض المحاليل العطرية .

يقول داود :

« الكندر هو اللبان الذكر صمغ شجرة تنمو بجبال اليمن ، الذكر منه المستدير

الصلب الضارب إلى الحمرة ، والأنثى الأبيض الهش . يجس الدم ويصفى الصوت وينقى البلغم خصوصا مع المصطكى .
وجاء في قانون ابن سينا :

« الكندر صمغ شجرة قد تكون بمدينة الكندر وبلاد الهند ، وهو حابس للدم ويصلح القروح وينفع الدهن ويقويه ، ويدمل قروح العين » .

(١١٣)

حشيش (قنب هندي — تكروري — بنقو)

الاسم الإنجليزي : Indian Hemp (Hashish)

الاسم اللاتيني : *Cannabis sativa* L.

الفصيلة : الحشيشية *Cannabinaceae*

موطن النبات : وسط آسيا وغربها ، ولكنه يزرع اليوم على نطاق واسع في بعض البلاد العربية كمصدر للألياف .

الوصف النباتي : نبات شجيري متفرع ذو ساق جوفاء ، وأوراق راحية مركبة ، والأزهار وحيدة الجنس ، والنبات ثنائي المسكن ، ويتحصل على أفضل رتب الألياف من النباتات الذكرية ، وبجانب أن النبات مصدر للألياف والزيوت الجافة ، فهو مصدر لعقار مخدر .

الجزء الطبي : القمم الزهرية للنباتات المؤنثة والتي تكون مضغوطة ومتماسكة .

الجوهر الفعال : مادة راتنجية Rating تحتوى على ثلاثة أو أربعة قلويدات قوية هي Cannabidiol, cannabigerol, cannabichromene, Cannabisativine ،

وكذلك زيت طيار يحتوى على ترين .

ومن المادة الراتنجية التي تؤخذ من الأجزاء العليا المزهرة للنباتات المؤنثة يحضر خلاصة وصبغة . والمادة الفعالة هي مادة راتنجية تسمى Cannabinol على هيئة سائل زيتي أحمر اللون وتتحول بالتأكسد إلى مادة عديمة التأثير سوداء قطرانية القوام وهذا التحول هو سبب فساد هذا المخدر ومستحضراته إذا حفظت لمدة طويلة .

الطبي : مسكن للآلام وفي علاج الهستيريا والاضطرابات العصبية

ويعرف الحشيش أحيانا « بالمارجوانا » ويستعمل في التدخين . غير

(النباتات الطبية والعطرية)

أن استعماله هذا له أضرار فادحة أهمها الإدمان لأن الجسم لا يستطيع التخلص من المواد الفعالة فيه إلا بعد مرور أسبوعين على الأقل ، الأمر الذى يؤدى إلى تراكم المادة المخدرة كلما تعاطاها الإنسان .

(١١٤)


كازوارينا

الاسم الإنجليزى : Beach oak

الاسم اللاتينى : *Casuarina equisetefolia* L.

الفصيلة : الكازوارينية *Casuarinaceae*

موطن النبات : يزرع في معظم البلاد العربية وموطنه الأصلي أستراليا .



(كازورينا)

الوصف النباتي : شجرة دائمة الخضرة ، كثيرة التفرع ، والسيقان ظاهرة العقد مضلعة ، الأوراق حرشفية مرتبة في محيطات ملتحمة من أسفل مكونة غلافا حول الساق ، وتظهر الأوراق كأسنان دقيقة أعلى الغلاف ، والزهرة وحيدة الجنس ، والزهرة المذكرة محمولة على نورات سنبلية في نهاية الأفرع الخضراء . أما الزهرة المؤنثة فمحمولة على نورات هامية صلبة ، والثمرة جناحية تحوى بذرة واحدة .

الجزء الطبى : الأوراق والقلف .

الجوهر الفعال : تحتوى الأوراق على مادة ملونة تسمى كزوارين Casuarin وتانين Catechol Tennin . أما القلف فيحتوى على تانين بنسبة ٦ — ١٨ ٪ .

الأثر الطبى : تستعمل الأوراق في حالة الإسهال والمغص والدستاريا والصداع ، ولمعالجة الطفح الجلدى على البشرة .

والقلف قابض ويستعمل في الحالات التى تستخدم بها الأوراق ، وذكر أن منقوعه نافع في حالة البريرى ، يستخدم القلف في الدباغة . وأشجار الكازوارينا تزرع عادة كمصدات للرياح ولحفظ الجسور من الانهيار وهى مقاومة للجفاف والملوحة .

(١١٥)

مر (جفل)

الاسم الإنجليزى : Myrrh

الاسم اللاتينى : Commiphora erythraeae L. مر حلو

Commiphora myrrha L. مر هرابل

الفصيلة : البورسيرية Burseraceae

موطن النبات : اليمن ، السعودية ، الصومال ، السودان .

الوصف النباتى : شجيرة صغيرة تحمل أوراقا مركبة لها أعناق طويلة ، والأزهار صغيرة وثمارها حسلية ، تحاط بالغلاف الثمرى ، وللأغصان رائحة بلسمية قوية إذا دعت .

ويسيل الراتنج الصمغى من السوق تلقائيا أو نتيجة الجروح ويتجمد تدريجيا ويصبح لونه بيا أو أسود أحيانا . ويوجد نوعان من المر :

- (١) مر هرا بل وهو الذى تنطبق عليه هذه الأوصاف .
(٢) مر بسايل أو المر الحلو ، وهو نبات المر الحشيشى وهو المر المعروف منذ القدم ، وقد استعمل قرونا طويلة فى البخور والعطور والتحنيط .

الجزء الطبى : الساق وما يسيل منه من راتنج صمغى .

الجوهر الفعال : يتركب المر من ٢٥ — ٤٠ ٪ مواد راتنجية صمغية ، ٥٧ — ٦١ ٪ صمغ ، ٢٥ — ٨٠ ٪ زيت طيار ومركبات أخرى أهمها Myrrh المر .

الأثر الطبى : أهم مزايا المر تقوية المعدة ، والعمل على طرد الغازات ، كما أنه يفتح الشهية ، ويساعد على إفراز العصارة المعدية ، ويضاف إلى المسهلات لينعم المغص ، ويؤخذ المر أيضا لمعالجة فقر الدم ، وله بعض الخواص المطهرة ولذلك فهو يفيد فى تخفيف النزلات الشعبية ، ومداواة التهاب المثانة ، ومداواة القروح من الظاهر ، وبعض التهابات الجلدية ، ولتقوية اللثة والحلق .

جاء فى تذكرة داود عن المر ما يأتى :

« المر عنصر جيد وركن عظيم فى المراهم والأكحال على اختلاف أنواعها . ينفع سائر النزلات والصداع ويشد اللثة ويزيل قروحها ، وأوجاع الأسنان بالخمير والزيت مضمضة ، والسعال ، والأوجاع فى الظهر ، وخشونة القصبة استحلابا فى الفم ، والرياح وأوجاع الكبد ، والطحال ، والكلى ، والمثانة ، والديدان شربا ، خصوصا مع الترمس ، ويحل عرق النسا والمفاصل والنقرس ، والسوم شربا وطلاء ، ويطرد الهوام بخورا مع الكندس ، ويحفظ الموتي طلاء » .

وجاء فى قانون ابن سينا عن المر ما يأتى :

« صمغ طيب الرائحة ، محلل للرياح ويمنع التبعث . وإذا خلط بدهن الآس فإنه يجلو آثار القروح ويرى الجراحات المتعفة . قال جالينوس رائحة المر تصدع الأصحاء فضلا عن المصروعين ، وهو يطيب نكهة الفم ، ويتمضمض به بشراب فيشد الأسنان جيدا ويقويها ، ويمنع تأكلها ويشد اللثة . وينفع المر الخالص استرخاء المعدة ، ويخرج الديدان لمرارته ويشرب لقروح الأمعاء والإسهال » .

(١١٦)


سرو

الاسم الإنجليزي : Cypress

الاسم اللاتيني : *Cupressus sempervirens* L.

الفصيلة : السروية Cupressaceae

موطن النبات : حوض البحر المتوسط .



(سرو)

الوصف النباتي : شجرة عالية تصل إلى ٦٠ مترا ، دائمة الخضرة ، والساق مستقيمة ذات قشرة رمادية اللون ، كثيرة التفرعات ، والأوراق حشفية رهيقة جدا وملتصقة بالفروع ، والمخاريط الأنثوية كروية ، والثمار صغيرة ، وعند النضج تصبح متخشبة كأنها الدروع الصغيرة ، والبذور مجنحة صغيرة .
الجزء الطبي : الأوراق والخشب .

الجوهر الفعال : تانينات و Cupressus - flavons, camphor ، وزيت طيار .
الأثر الطبي : ذكر القزويني : « أن دخان خشب السرو يطرد البق وإذا شرب منقوع ورقة مع ورق السذب Ruta ينفع في علاج عسر البول وإذا دق ورقه وهو رطب ووضع على جرح عجل الشامه ، أما رماده إذا وضع على أماكن حرق النار فإن ذلك يعجل بالشفاء » .

(١١٧)

حلتيت (أبو كبير — الوشق)

الاسم الإنجليزى : Asafotida

الاسم اللاتينى : Ferula assa - foetida L.

الفصيلة : الخيمية Umbelliferae

موطن النبات : العراق .

الوصف النباتي : عشب معمر قوى ، ويصل ارتفاعه إلى متر تقريبا ، ساقه أجوف ، أوراقه كثيرة التفصص ، نورات الخيمية بها أزهار كثيرة وصغيرة الحجم . وتفرز الجذور العصيرية الغليظة سائلا لبنيا . خلال موسم الأمطار ، وتحفظ بعيدا عن الشمس ، فيتجمع الراتنج الصمغى على السطح على هيئة دموع ، والمادة سميكة صمغية بيضاء أو حمراء ، ويطلق عليها غذاء الآلهة .

الجزء الطبي : الإفرازات اللبنة وما يعلق بها من بذور .

الجوهر الفعال : راتنج يحتوى على زيت طيار له رائحة شديدة تكاد تكون مزيجا من رائحتى الثوم والكراث (استرات Esters لحامض الفيرووليك (١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥، ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧، ٦٠٨، ٦٠٩، ٦١٠، ٦١١، ٦١٢، ٦١٣، ٦١٤، ٦١٥، ٦١٦، ٦١٧، ٦١٨، ٦١٩، ٦٢٠، ٦٢١، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٢٤، ٦٢٥، ٦٢٦، ٦٢٧، ٦٢٨، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٣٦، ٦٣٧، ٦٣٨، ٦٣٩، ٦٤٠، ٦٤١، ٦٤٢، ٦٤٣، ٦٤٤، ٦٤٥، ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٤، ٦٥٥، ٦٥٦، ٦٥٧، ٦٥٨، ٦٥٩، ٦٦٠، ٦٦١، ٦٦٢، ٦٦٣، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٧، ٦٦٨، ٦٦٩، ٦٧٠، ٦٧١، ٦٧٢، ٦٧٣، ٦٧٤، ٦٧٥، ٦٧٦، ٦٧٧، ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨١، ٦٨٢، ٦٨٣، ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٨٨، ٦٨٩، ٦٩٠، ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٣، ٦٩٤، ٦٩٥، ٦٩٦، ٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٠٤، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧٠٨، ٧٠٩، ٧١٠، ٧١١، ٧١٢، ٧١٣، ٧١٤، ٧١٥، ٧١٦، ٧١٧، ٧١٨، ٧١٩، ٧٢٠، ٧٢١، ٧٢٢، ٧٢٣، ٧٢٤، ٧٢٥، ٧٢٦، ٧٢٧، ٧٢٨، ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣١، ٧٣٢، ٧٣٣، ٧٣٤، ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩، ٧٤٠، ٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥، ٧٤٦، ٧٤٧، ٧٤٨، ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥١، ٧٥٢، ٧٥٣، ٧٥٤، ٧٥٥، ٧٥٦، ٧٥٧، ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦٠، ٧٦١، ٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٤، ٧٦٥، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٦٨، ٧٦٩، ٧٧٠، ٧٧١، ٧٧٢، ٧٧٣، ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، ٧٧٧، ٧٧٨، ٧٧٩، ٧٨٠، ٧٨١، ٧٨٢، ٧٨٣، ٧٨٤، ٧٨٥، ٧٨٦، ٧٨٧، ٧٨٨، ٧٨٩، ٧٩٠، ٧٩١، ٧٩٢، ٧٩٣، ٧٩٤، ٧٩٥، ٧٩٦، ٧٩٧، ٧٩٨، ٧٩٩، ٨٠٠، ٨٠١، ٨٠٢، ٨٠٣، ٨٠٤، ٨٠٥، ٨٠٦، ٨٠٧، ٨٠٨، ٨٠٩، ٨١٠، ٨١١، ٨١٢، ٨١٣، ٨١٤، ٨١٥، ٨١٦، ٨١٧، ٨١٨، ٨١٩، ٨٢٠، ٨٢١، ٨٢٢، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٥، ٨٢٦، ٨٢٧، ٨٢٨، ٨٢٩، ٨٣٠، ٨٣١، ٨٣٢، ٨٣٣، ٨٣٤، ٨٣٥، ٨٣٦، ٨٣٧، ٨٣٨، ٨٣٩، ٨٤٠، ٨٤١، ٨٤٢، ٨٤٣، ٨٤٤، ٨٤٥، ٨٤٦، ٨٤٧، ٨٤٨، ٨٤٩، ٨٥٠، ٨٥١، ٨٥٢، ٨٥٣، ٨٥٤، ٨٥٥، ٨٥٦، ٨٥٧، ٨٥٨، ٨٥٩، ٨٦٠، ٨٦١، ٨٦٢، ٨٦٣، ٨٦٤، ٨٦٥، ٨٦٦، ٨٦٧، ٨٦٨، ٨٦٩، ٨٧٠، ٨٧١، ٨٧٢، ٨٧٣، ٨٧٤، ٨٧٥، ٨٧٦، ٨٧٧، ٨٧٨، ٨٧٩، ٨٨٠، ٨٨١، ٨٨٢، ٨٨٣، ٨٨٤، ٨٨٥، ٨٨٦، ٨٨٧، ٨٨٨، ٨٨٩، ٨٩٠، ٨٩١، ٨٩٢، ٨٩٣، ٨٩٤، ٨٩٥، ٨٩٦، ٨٩٧، ٨٩٨، ٨٩٩، ٩٠٠، ٩٠١، ٩٠٢، ٩٠٣، ٩٠٤، ٩٠٥، ٩٠٦، ٩٠٧، ٩٠٨، ٩٠٩، ٩١٠، ٩١١، ٩١٢، ٩١٣، ٩١٤، ٩١٥، ٩١٦، ٩١٧، ٩١٨، ٩١٩، ٩٢٠، ٩٢١، ٩٢٢، ٩٢٣، ٩٢٤، ٩٢٥، ٩٢٦، ٩٢٧، ٩٢٨، ٩٢٩، ٩٣٠، ٩٣١، ٩٣٢، ٩٣٣، ٩٣٤، ٩٣٥، ٩٣٦، ٩٣٧، ٩٣٨، ٩٣٩، ٩٤٠، ٩٤١، ٩٤٢، ٩٤٣، ٩٤٤، ٩٤٥، ٩٤٦، ٩٤٧، ٩٤٨، ٩٤٩، ٩٥٠، ٩٥١، ٩٥٢، ٩٥٣، ٩٥٤، ٩٥٥، ٩٥٦، ٩٥٧، ٩٥٨، ٩٥٩، ٩٦٠، ٩٦١، ٩٦٢، ٩٦٣، ٩٦٤، ٩٦٥، ٩٦٦، ٩٦٧، ٩٦٨، ٩٦٩، ٩٧٠، ٩٧١، ٩٧٢، ٩٧٣، ٩٧٤، ٩٧٥، ٩٧٦، ٩٧٧، ٩٧٨، ٩٧٩، ٩٨٠، ٩٨١، ٩٨٢، ٩٨٣، ٩٨٤، ٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٧، ٩٨٨، ٩٨٩، ٩٩٠، ٩٩١، ٩٩٢، ٩٩٣، ٩٩٤، ٩٩٥، ٩٩٦، ٩٩٧، ٩٩٨، ٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٠٠٤، ١٠٠٥، ١٠٠٦، ١٠٠٧، ١٠٠٨، ١٠٠٩، ١٠١٠، ١٠١١، ١٠١٢، ١٠١٣، ١٠١٤، ١٠١٥، ١٠١٦، ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠١٩، ١٠٢٠، ١٠٢١، ١٠٢٢، ١٠٢٣، ١٠٢٤، ١٠٢٥، ١٠٢٦، ١٠٢٧، ١٠٢٨، ١٠٢٩، ١٠٣٠، ١٠٣١، ١٠٣٢، ١٠٣٣، ١٠٣٤، ١٠٣٥، ١٠٣٦، ١٠٣٧، ١٠٣٨، ١٠٣٩، ١٠٤٠، ١٠٤١، ١٠٤٢، ١٠٤٣، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٦، ١٠٤٧، ١٠٤٨، ١٠٤٩، ١٠٥٠، ١٠٥١، ١٠٥٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٠٥٥، ١٠٥٦، ١٠٥٧، ١٠٥٨، ١٠٥٩، ١٠٦٠، ١٠٦١، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ١٠٦٤، ١٠٦٥، ١٠٦٦، ١٠٦٧، ١٠٦٨، ١٠٦٩، ١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٢، ١٠٧٣، ١٠٧٤، ١٠٧٥، ١٠٧٦، ١٠٧٧، ١٠٧٨، ١٠٧٩، ١٠٨٠، ١٠٨١، ١٠٨٢، ١٠٨٣، ١٠٨٤، ١٠٨٥، ١٠٨٦، ١٠٨٧، ١٠٨٨، ١٠٨٩، ١٠٩٠، ١٠٩١، ١٠٩٢، ١٠٩٣، ١٠٩٤، ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٧، ١٠٩٨، ١٠٩٩، ١١٠٠، ١١٠١، ١١٠٢، ١١٠٣، ١١٠٤، ١١٠٥، ١١٠٦، ١١٠٧، ١١٠٨، ١١٠٩، ١١١٠، ١١١١، ١١١٢، ١١١٣، ١١١٤، ١١١٥، ١١١٦، ١١١٧، ١١١٨، ١١١٩، ١١٢٠، ١١٢١، ١١٢٢، ١١٢٣، ١١٢٤، ١١٢٥، ١١٢٦، ١١٢٧، ١١٢٨، ١١٢٩، ١١٣٠، ١١٣١، ١١٣٢، ١١٣٣، ١١٣٤، ١١٣٥، ١١٣٦، ١١٣٧، ١١٣٨، ١١٣٩، ١١٤٠، ١١٤١، ١١٤٢، ١١٤٣، ١١٤٤، ١١٤٥، ١١٤٦، ١١٤٧، ١١٤٨، ١١٤٩، ١١٥٠، ١١٥١، ١١٥٢، ١١٥٣، ١١٥٤، ١١٥٥، ١١٥٦، ١١٥٧، ١١٥٨، ١١٥٩، ١١٦٠، ١١٦١، ١١٦٢، ١١٦٣، ١١٦٤، ١١٦٥، ١١٦٦، ١١٦٧، ١١٦٨، ١١٦٩، ١١٧٠، ١١٧١، ١١٧٢، ١١٧٣، ١١٧٤، ١١٧٥، ١١٧٦، ١١٧٧، ١١٧٨، ١١٧٩، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٢، ١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٥، ١١٨٦، ١١٨٧، ١١٨٨، ١١٨٩، ١١٩٠، ١١٩١، ١١٩٢، ١١٩٣، ١١٩٤، ١١٩٥، ١١٩٦، ١١٩٧، ١١٩٨، ١١٩٩، ١٢٠٠، ١٢٠١، ١٢٠٢، ١٢٠٣، ١٢٠٤، ١٢٠٥، ١٢٠٦، ١٢٠٧، ١٢٠٨، ١٢٠٩، ١٢١٠، ١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٣، ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦، ١٢١٧، ١٢١٨، ١٢١٩، ١٢٢٠، ١٢٢١، ١٢٢٢، ١٢٢٣، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٢٦، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ١٢٣٠، ١٢٣١، ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٤، ١٢٣٥، ١٢٣٦، ١٢٣٧، ١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠، ١٢٤١، ١٢٤٢، ١٢٤٣، ١٢٤٤، ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧، ١٢٤٨، ١٢٤٩، ١٢٥٠، ١٢٥١، ١٢٥٢، ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣، ١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٢٦٩، ١٢٧٠، ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٢٧٤، ١٢٧٥، ١٢٧٦، ١٢٧٧، ١٢٧٨، ١٢٧٩، ١٢٨٠، ١٢٨١، ١٢٨٢، ١٢٨٣، ١٢٨٤، ١٢٨٥، ١٢٨٦، ١٢٨٧، ١٢٨٨، ١٢٨٩، ١٢٩٠، ١٢٩١، ١٢٩٢، ١٢٩٣، ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٦، ١٢٩٧، ١٢٩٨، ١٢٩٩، ١٣٠٠، ١٣٠١، ١٣٠٢، ١٣٠٣، ١٣٠٤، ١٣٠٥، ١٣٠٦، ١٣٠٧، ١٣٠٨، ١٣٠٩، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٢، ١٣١٣، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣١٦، ١٣١٧، ١٣١٨، ١٣١٩، ١٣٢٠، ١٣٢١، ١٣٢٢، ١٣٢٣، ١٣٢٤، ١٣٢٥، ١٣٢٦، ١٣٢٧، ١٣٢٨، ١٣٢٩، ١٣٣٠، ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٣، ١٣٣٤، ١٣٣٥، ١٣٣٦، ١٣٣٧، ١٣٣٨، ١٣٣٩، ١٣٤٠، ١٣٤١، ١٣٤٢، ١٣٤٣، ١٣٤٤، ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩، ١٣٥٠، ١٣٥١، ١٣٥٢، ١٣٥٣، ١٣٥٤، ١٣٥٥، ١٣٥٦، ١٣٥٧، ١٣٥٨، ١٣٥٩، ١٣٦٠، ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٦٣، ١٣٦٤، ١٣٦٥، ١٣٦٦، ١٣٦٧، ١٣٦٨، ١٣٦٩، ١٣٧٠، ١٣٧١، ١٣٧٢، ١٣٧٣، ١٣٧

الأثر الطبي : منبه ، ويزيل الانتفاخ ، وطارد للغازات ، وفي علاج السعال والربو ، ويساعد على الهضم ، ويساعد على توسيع المسالك الهوائية .

يقول داود في هذه المادة ما يأتي :

« الحلتيت هو صمغ الأنجدان ، وهو حار يابس يستأصل شأفة البلغم والرطوبات الفاسدة ، وينقي الصوت والصدر ، ويحلل الرياح ، ويرد المعدة والكبد ، والاستسقاء ، واليرقان ، والطحال ، عسر البول ، والأورام الباطنة والقروح والفالج » .

وجاء في كتاب كنوز الصحة :

أن مخلوط الحلتيت مع المر والعسل يشفى من الآلام العصبية والتشنج .
ومن أنواع الجنس *Ferula* يوجد في شمال إفريقيا أنواع تنمو برياً ، منها :
F. marmarica, *F. sinaica*, *F. comunis* ، كما ينمو النوع الأول بالسعودية والعراق ، وكذلك *F. ruthoensis*., *F. ovina* ، وكلها تحتاج لمزيد من الدراسة لمعرفة مكوناتها .

(١١٨)

حشيشة الدينار

الاسم الإنجليزي : Hops

الاسم اللاتيني : *Humulus lupulus* L.

الفصيلة : التوتية *Moraceae*

موطن النبات : تعد منطقة الشام موطناً أصلياً للنبات ، ويزرع في كثير من دول العالم ومنها بعض الدول العربية .

الوصف النباتي : نبات عشبي معمر ومتسلق ، ويتجدد نموه كل سنة ، حيث ترسل جذوره سيقاناً خشبية ضعيفة مضلعة ، تحمل أوراقاً غائرة التفصص ، والأزهار وحيدة الجنس ، والنبات ثنائي المسكن . الأزهار المؤنثة تجتمع في نورات جالسة مخروطية الشكل .

الجزء الطبي : النورات المؤنثة .

الجوهر الفعال : راتنج ومواد أخرى مرة عطرية مخدرة ، أهمها اللوبيولين والهيوميولين .

الأثر الطبى : تستعمل حشيشة الدينار فى الطب الشعبى لتأثيرها المهدئ والمنوم ، وكذلك تستعمل أحيانا فى الكمادات لعلاج الجروح والقروح . وفى أمريكا الشمالية يستخدمون حشيشة الدينار كمشروب يزيد من إفراز البول .



(حشيشة الدينار)

التأثير التالى : استخدامها الرئيسى فى صناعة البيرة ، لتوقف عمل البكتريا ولتحسين رائحة المشروب ولتكسبه مرارته المميزة .

حناء

الاسم الإنجليزي : Henna

الاسم اللاتيني : *Lawsonia inermis* L.

الفصيلة : الحنائية *Lythraceae*

موطن النبات : يرجح أن يكون إيران أو الهند ، وتزرع الحناء اليوم في تونس وليبيا ومصر



والسودان والجزيرة العربية وتنتشر زراعتها في المناطق الحارة .

الوصف النباتي : نبات شجيري له جذر وتدى ، وله أفرع خضراء ، تتحول إلى اللون البنّي عند النضج ، والأوراق بسيطة جلدية ، والأزهار صغيرة بيضاء لها رائحة زكية ، والثمرة علبة تحتوى على بذور هرمية الشكل .

الجزء الطبّي : الأوراق .

الجوهر الفعال : تحتوى الأوراق والأغصان الغضة على مادة تسمى لوسون Lawsone ، ومواد راتنجية ودهنية وتانينات تعرف باسم حناتانين Hennatanin ، وزيت طيار أهم مكوناته ألفا ، بيتا أيونون (α, β Ionone)

الأثر الطبّي : تستخدم الأوراق كقابض ، وفي الشام الجروح والحروق وعلاج الحساسية الجلدية والتهاب ما بين الأصابع ، والتهابات المعدة . وأخيرا ثبت أن أوراق الحناء تحتوى على عنصرين فعالين ، أحدهما ينبه القلب والآخر يسبب ارتخاء العضلات .

ويقول داود في الحناء :

« سحيقه عظيم النفع في قلع البثور وماؤه يذهب اليرقان ويفتت الحصى ويقطع النزلات والصداع ، وهو مع السمن يحل الأورام وأوجاع المفاصل » .

(١٢٠)

تين شوكى (صبار — هندی)


الاسم الإنجليزى : Prickly pear

الاسم اللاتينى : *Opuntia ficus-indica* L.

الفصيلة : الشوكية Cactaceae

موطن النبات : ينمو في معظم البلاد العربية .

الوصف النباتي : نبات عصيرى يزرع في كثير من البلاد العربية لثماره التى تؤكل . وسيقان النبات متحورة إلى سيقان ورقية *phylloclades* ، تحمل الأوراق الصغيرة التى تسقط بسرعة، وتحمل في آباطها أشواكا محمولة على أريولات *areoles* وتحمل السيقان المتحورة أزهارا مفردة ، والثمار لبية مغطاة بأشواك .



(تين شو كى)

- الجزء الطبى : الثمار والسيقان .
 الجوهر الفعال : تحتوى الثمار على سكر الجلوكوز ، والفركتوز ، وحامض الاسكوربيك ، وزيت دهنى ، ومادة صمغية تسمى التراجكانث Tragacanth وأكسالات الكلسيوم ، وتانينات ، ومواد ملونة ، وخميرة تسمى *Saccharomyces opuntiae* والتي تسبب تخمر الثمار .
 الأثر الطبى : بجانب كون الثمار مغذية فهي قابضة ، ويمكن أن تستخدم لتحضير الكحول .
 إذا أكلت الثمار بكثرة يمكن أن تسبب انسدادا فى الأمعاء بسبب تراكم البذور .

(١٢١)

صنوبر

الاسم الإنجليزى : Pine

الاسم اللاتيني : **Pinus sp.**
الفصيلة : **Pinaceae** الصنوبرية
موطن النبات : حوض البحر المتوسط .



(صنوبر)

الوصف النباتي : أشجار الصنوبر أشجار عالية دائمة الخضرة ، تحمل أوراقا إبرية وأفرعا قزمية ، وأخرى طويلة مقسمة إلى عقد وسلاميات ، وتحمل الأفرع القزمية أوراقا خضرية إبرية يختلف عددها حسب النوع ، ويتراوح عددها من ١ — ٥ ، والأشجار أحادية المسكن ، أى تحمل مخاريط مذكرة وأخرى مؤنثة . وتنقسم أنواع الصنوبر إلى مجموعتين مجموعة

الصنوبر الصلبة والمجموعة اللينة .

- الجزء الطبى : الخشب والثمار .
الجوهر الفعال : تمتاز مجموعة الصنوبر الصلبة بأخشابها الراتنجية الثقيلة الجامدة وهى مصدر الراتنج الصنوبرى الذى يستخدم فى الأغراض الطبية ، حيث يحتوى على البورنيول Borneol وزيت التربنتين Turpentine
الأثر الطبى : يستخرج من هذا الزيت مادة هيدرات التربين وهى علاج شائع لأنواع السعال والزكام .
كما أن ثمار الصنوبر تدخل فى إعداد كثير من الأطباق الغذائية .

(١٢٢)

مصطكى (فستق شرقى — بطوم)

- الاسم الإنجليزى : Mastic tree
الاسم اللاتينى : Pistacia lentiscus L.
الفصيلة : أناكاردية Anacardiaceae
موطن النبات : ليبيا والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان وفلسطين .
الوصف النباتى : شجرة صغيرة يمتاز لحاؤها بوجود مواد راتنجية ، والشجرة دائمة الخضرة ، والمواد الراتنجية ترشح من اللحاء ، إما تلقائياً أو بعمل شقوق رأسية فى الساق فتخرج العصارة وتتجمد بسرعة ، ويسمونه فى الجزائر فستق شرقى ، وسماء ابن البيطار صمغ العلك .
الجزء الطبى : اللحاء وما به من مواد راتنجية ، وكذلك الأوراق والثمار والبذور .
الجوهر الفعال : الإفراز الراتنجى والمصطكى ، وهى مادة شفافة لونها أصفر شاحب ، كما تحوى البذور على زيت طيار .
الأثر الطبى : تمضخ المصطكى لتقوية الأسنان وإزالة الرائحة الكريهة من الفم .
ويستخدم محلول المصطكى فى الإثير أو الكحول كى يشرب به القطن ويوضع على الأسنان لتسكين الألم ، ويستخدم الراتنج ذاته فى حشو الأسنان وإيقاف التسوس .



(مصطكى)

وتستعمل المصطكى فى صناعة العطور ، كما أنها منبهة ومدرّة للبول وقابضة ، وتستخدم كذلك لعلاج البرد والنزلات الصدرية .
جاء فى تذكرة داود عن المصطكى ما يأتى :
« يسمى أيضا العلك الرومى ، حارة يابسة تذهب الصداع والنزلات وتسهل البلغم والصفراء مع الصبر . وتنقى القصبة وتقطع النزف مع الكهرمان ، وتذهب الرياح الغليظة وسوء الهضم وضعف الكبد والطحال » .

(١٢٣)

توت شوكى

الاسم الإنجليزى : Black – berry
الاسم اللاتينى : Rubus fruticosus L.
الفصيلة : الوردية Rosaceae

موطن النبات : ينمو النبات برياً في بعض بلدان البحر المتوسط ، والشام .
الوصف النباتي : نبات معمّر له ساق خشبية زاحفة أو متسلقة ، يحمل أشواكاً ، والأوراق
مركبة (ثلاث وريقات) ، لها حافة مسننة ، وأعناق الأوراق تحمل
أشواكاً ، والأزهار بيضاء أو قرمزية ، والثمار متجمعة من عدد من
الأكينات السوداء .

الجزء الطبي : الثمار والأوراق والجذور .
الجوهر الفعال : تانينات وإنتوسياتين وبكتين .
الأثر الطبي : الثمار قابضة ، وتستخدم كغرغرة لشفاء اللوز والحنجرة ، والزور من
الالتهابات وبثور الفم . كما يستخدم منقوع الأوراق لعلاج الدستاريا
والإسهال ، ولوقف الدم الزائد عند السيدات .
ويستخدم مغلي الجذور لعلاج حصي الكلى والكحة . ويستخدم
شراب الثمار لإيقاف الإسهال عند الأطفال .

(١٢٤)

أتل (عيل ، طرفة)

الاسم الإنجليزي : Tamarisk
الاسم اللاتيني : *Tamarix sp. L.*
الفصيلة : الأتلية *Tamaricaceae*
موطن النبات : شمال أفريقيا والسعودية والسودان .
الوصف النباتي : أشجار هذا الجنس دائمة الخضرة ، تسمو لارتفاع حوالي ١٥ متراً ،
تحمل أوراقاً حرشفية صغيرة ، وأزهاراً صغيرة في نورات راسمية ،
طرفية ، جالسة ، حمراء أو صفراء أو بيضاء اللون .
للأتل أنواع كثيرة أهمها : *T. arabica* . *T. nilotica* *T. aphylla* .
الجزء الطبي : القلف والأفرع الحديثة .
الجوهر الفعال : تانين بنسبة ١٠٪ . ويستخدم في الدباغة .



(أتل)

الأثر الطبى : تستخدم الأفرع فى علاج مرض السيلان والأمراض الجلدية والإسهال
والمعص المعوى .

غرغار (غرغاج — دردار)

الاسم الإنجليزي : Common elm

الاسم اللاتيني : *Ulmus campestris* L.

الفصيلة : الغرغارية *Ulmaceae*

موطن النبات : غرب البحر المتوسط .

الوصف النباتي : شجرة عالية متساقطة الأوراق ، والأوراق متبادلة على الساق ، والأزهار متجمعة في نورات راسيمية ، وأسدية الأزهار حمراء والثمار قرصية الشكل .

الجزء الطبي : القلف والأغصان الصغيرة .

الجوهر الفعال : يحتوى القلف على تانين ومواد غروية ومواد مرة .

الأثر الطبي : القلف قابض ويستخدم في حالات الإسهال ، ومن الخارج يستخدم لعلاج الجروح والخراريج .

وفي أمريكا يستخدم الهندود الحمر قلف بعض أنواع الغرغار

U. rugosa, U. rubra لعلاج سوء الهضم ، وكمقو ، وبكميات كبيرة

كمقيئ .

الفصل الخامس

نباتات طبية أخرى

هناك الكثير من النباتات البرية في البلاد العربية يستخدمها الأعراب والفلاحون لشفاء الكثير من الأمراض ، كما توجد بعضها في أسواق العطارين وتوصف للمرضى وهم يؤمنون بتأثيرها على مرضاهم . هذه النباتات لا يزال الكثير منها مجهولا تركيبيا وما تحويه من مواد كيميائية ، والبعض الآخر يحتوى على مواد غير التي ذكرت قبل ذلك مثل بعض الفيتامينات أو الأنزيمات أو بعض المعادن . ولا زال البحث جاريا في معامل كليات العلوم والصيدلة وكذلك في مراكز البحوث لمعرفة كنهها وتأثيرها الفسيولوجي إن وجد ، وفيما يلي بعض هذه النباتات المذكورة في مجموعة الطب الشعبي في البلاد العربية .

(١٢٦)

أدهاتودا

الاسم الإنجليزي : Malabar nut tree

الاسم اللاتيني : Adhatoda vasica Nees

الفصيلة : الأكانثية Acanthaceae

موطن النبات : حوض البحر المتوسط ، ويزرع في كثير من البلاد العربية من أجل الزينة .

الوصف النباتي : تحت شجرة ، تنمو لارتفاع ١ — ٢ متر . وللنبات أوراق متقابلة غير

مؤذنة بسيطة رحيمة ، وتوجد الأزهار في نورات غير محدودة سنبلية ، والأزهار بيضاء اللون غير منتظمة .

الأثر الطبي : يعتقد أن جذور وأوراق النبات لها أثر فعال في علاج الكحة ، والأزمات

الصدرية ، والتزلات الشعبية ، والمalaria . وتستخدم الأوراق في علاج

الروماتزم ، وله تأثير فعال كمبيد للحشرات .



(أدھاتہ دا)

(١٢٧)

أجاف

الاسم الإنجليزى : Agave

الاسم اللاتينى : Agave sisilana perr.

الفصيلة : الأجافية Agavaceae



(أجاف)

موطن النبات : أمريكا ، ويزرع في بعض البلدان العربية .
الوصف النباتي : تعتبر الأجاف مصدرا هاما للألياف وخاصة السيسال والبوريتان ، كما
تعتبر أنواع أخرى مصدرا لعصير سكري . وقد استخلص حديثا من
بعض أنواع الأجاف مادة أولية يسهل تحويلها إلى الكورتيزون .
ويزرع الأجاف في بعض البلاد العربية لهذه الأغراض ، ويقال إن عصير
الأوراق ملين ومدر للبول وضد الأسقربوط .
كما توجد أنواع أخرى من الأجاف أهمها النوع المنتشر في منطقة شمال
أفريقيا *A. americana* . وهو من النباتات السامة . وأهم محتوياته زيوت
طيارة وإكسلات وصابونيات .


عقول (شوك الجمال)

الاسم الإنجليزي : Alhagi

الاسم اللاتيني : Alhagi maurorum Medik.

الفصيلة : البقولية (القرنية) Leguminosae

موطن النبات : معظم البلاد العربية .



(عقول)

الوصف النباتي : عشب معمر يحمل أشواكا هي أفرع متحورة ، والأوراق صغيرة بسيطة كاملة سوية الحافة تسقط بسرعة ، والأزهار مفردة أرجوانية اللون ، والثمار قرنية محززة بين البذور .

الأثر الطبي : يستخدم النبات كملين ومدر للبول ، وزيت الأوراق يستخدم لعلاج الروماتزم . أما إفرازات الساق وهي ما يطلق عليها المن في العراق فيستخدمها العامة كملين خفيف .
وقد ثبت أن النبات إذا وجد في بيئة جافة يحوى مواد امنبهة للقلب ، أما إذا وجد في بيئة رطبة فيكون خاليا من هذه المواد .

(١٢٩)

دمسيسة

الاسم الإنجليزي : Damaseisa

الاسم اللاتيني : *Ambrosia maritima* L.

الفصيلة : المركبة *Compositae*

موطن النبات : حوض البحر المتوسط والسودان .

الوصف النباتي : عشب كثير التفرع مغطى بزغب رمادى ويحمل أوراقا مركبة مجزأة تجزءا كبيرا ، وذات رائحة مميزة ، وهامات الأزهار صغيرة صفراء محمولة في نوريات سنبلية ، والأزهار وحيدة الجنس وتحمل الأزهار المذكورة في أعلى الفرع ، أما الأزهار المؤنثة ففي أسفله ، وتتركب الهامة من زهرة مؤنثة واحدة .

الأثر الطبي : تستعمل الدمسيسة لعلاج حصوة الكلى ، وعلاج التقلصات وتنشيط الكبد ، وفي العلاج الشعبى تستعمل الدمسيسة لتفتيت الحصوات المرارية والكلوية والكبدية ، كما يستخدم مغلى النبات لعلاج الآلام الروماتزمية والأزمات الصدرية والمرض السكرى .



(١٣٠)

عود العطاس (سرة الكبش)

الاسم الإنجليزي : Pellitory

الاسم اللاتيني : *Anacyclus pyrethrum* L.

الفصيلة المركبة : *Compositae*

موطن النبات : ليبيا ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا وجزر الخالدات .

الوصف النباتي : عشب حولي زاحف ، يحمل أوراقا مركبة ومجزأة ، وأزهارا صفراء ذهبية

تتجمع في نورات هامية .

الأثر الطبى : تستخدم الجذور والأجزاء السفلى للساق لإدرار اللعاب ولذلك تستخدم



(عود العطاس)

كمليس (Lozenges) في حالات جفاف الفم والحلق ، كما تستخدم صبغة الجذور لعلاج آلام الأسنان المصابة ، والآلام الروماتزمية . ويستعمل النبات في علاج كثير من الأمراض كالصرع ومرض النوم وعرق النسا ، وكذلك منقوع الجذور في علاج الأزمة وكمعرق . كما توجد من هذا الجنس عدة أنواع مثل *A. monanthos* ويسمى في ليبيا تفرقة ، و *A. clavatus* الذي يمتاز بوجود أزهار شعاعية بالإضافة إلى القرصة الموجودة بنورته . كل هذه الأنواع لا تزال مجهولة من الناحية الكيميائية ، ولذلك يجب الاعتناء بدراساتها .

(١٣١)

أناناس

الاسم الإنجليزي : Pine apple

الاسم اللاتيني : *Ananas comosus* Merr.

الفصيلة : Bromeliaceae

موطن النبات : جنوب السودان والصومال .



(أناناس)

الوصف النباتي : عشب كبير يحمل أوراقا طويلة رمجية متشعبة ، ويحمل أزهارا متجمعة عند القمة تحيط بها القنابات والأفرع الجانبية . والثمرة مركبة من عدد من الثمرات الناتجة من الأزهار وهي التي تكون الثمرة المركبة للأناناس .

الجزء المستعمل : الثمار والسيقان .

الجوهر الفعال : استخلص من السيقان البرومالين Bromelain وهو إنزيم يهضم البروتين .

الأثر الطبي : يستخدم الإنزيم في الطب لأنه يهضم البروتين ، كما يفعل الببسين Pepsin تماما في المعدة .

يستخدم الإنزيم لتبيل اللحم ، كما يستخلص من الثمار عصير سكري يمكن تحويله إلى كحول لاستخدامه في الطب ولعمل الخل .

هليون (شوك — كشك ألماظ — سكوم)

الاسم الإنجليزي : *Asparagus*

الاسم اللاتيني : *Asparagus officinalis L.*

الفصيلة : *Liliaceae* الزنبقية



(هليون)

موطن النبات : أوروبا وغرب آسيا ، ويزرع في معظم البلاد العربية .
الوصف النباتي : عشب معمر له جذور عرضية درنية ، وتحمل الساق أفرعا متحورة تعرف بالسيقان الورقية (Cladodes) ، والثمار لينة حمراء . والسيقان الجديدة عسيرية جدا وشحمية ، وهي تؤلف الهليون في التجارة ، والهليون محصول هام في عالم الخضروات ، ومحتواه البروتيني أكثر منه في معظم الخضروات ، وللهليون قيمة طبية أكيدة وهو غني بالفيتامينات .

ينمو على سواحل البحر المتوسط عدة أنواع منها *Asparagus stipularis* وهو متسلق أو زاحف وثمرته سوداء والسيقان الورقية صلبة ومفردة والأوراق الحقيقية متحورة إلى حراشيف .

الجوهر الفعال : وجد أن الهليون يحتوي على بروتين ودهن وألياف وأملاح الكالسيوم والفسفور والنشويات ، بالإضافة إلى فيتامينات A, B₁, B₂, C . كما يحتوي النبات على مادة الأسبارجين Asparagin .

الأثر الطبي : في الطب الشعبي يستعملون الجذور لتفتيت الحصوات الكلوية ، وكذلك يستعملون مغلى النبات كمعرق ، ومغلى السيقان الخضراء الطرية لإدرار البول ، وعلاج الصفراء ، وأمراض الكبد والروماتزم . أما الثمار فتستعمل لعلاج اضطرابات المعدة وعلاج أمراض كثيرة يرونها العامة .

(١٣٣)

الكرنب (الملفوف)


الاسم الإنجليزي : Cabbage

الاسم اللاتيني : *Brassica oleracea* var. *capitata* L.

الفصيلة : الصليبية *Cruciferae*

موطن النبات : أوروبا ، ويزرع اليوم في معظم البلاد العربية .

الوصف النباتي : نبات حولي له ساق طويلة وغلظتها تحمل رأسا ضخمة من الأوراق العسيرة ، وتؤكل فيها عادة الأوراق الداخلية ، وهي بيضاء اللون مائلة للاصفرار لعدم تعرضها للضوء . ويوجد من الكرنب أنواع كثيرة . وتتميز أنواع الكرنب عن بعضها بواسطة الشكل واللون والحجم .



(كرنب)

جاء في بعض المراجع أن عصير أوراق الكرنب مع عصير الليمون يفيد في علاج بعض أمراض الكبد الوبائي الناتج من التسمم الكحولي . وحالات التهاب المفاصل ، وداء النقرس . وتفيد أوراق الكرنب المفرومة في علاج أمراض آلام الأمعاء والآلام المصاحبة للدورة الشهرية عند بعض السيدات ، وعلاج بعض حالات الصداع ، وآلام الصدر والحلق ، والربو ، ولسعات الحشرات ، كما تفيد أوراق الكرنب الجافة في تخفيف والتشام الجروح والبثور وبعض الأمراض الجلدية (الأهرام في ١٩٨٦/٦/٦) . وفي خفض نسبة السكر في الدم .

(١٣٤)

حشيشة العقرب (قنطريون)

الاسم الإنجليزي : Centaury

الاسم اللاتيني : *Centaureum spicatum* Fritch

الفصيلة : الجنتيانية *Gentianaceae*

موطن النبات : حوض البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية .

الوصف النباتي : عشب حولي يوجد في الأماكن الرطبة ، له أوراق متقابلة وبسيطة ، والأزهار وردية اللون محمولة على نورات سنبلية مركبة ، وتستخدم الأزهار والثمار لعلاج ضغط الدم العالي وإخراج الحصوات الكلوية ، والحالبية ، ولعلاج الحروق الجلدية . ويدخل في تركيب المراهم المستعملة لعلاج عرق النسا ، كما يستخدم منقوع النبات لعلاج مرض السكر .

وفي ليبيا والبلاد العربية المجاورة يوجد نوع آخر اسمه *Centaureum erythraea* ويسمونه قنطريون أو مرارة الحنش ، وتستخدم الأزهار والثمار كمقو وضد الحمى ، وفقر الدم ، وكذلك لتفتيت الحصوات الكلوية وأمراض أخرى كثيرة كالاضطرابات الكلوية .

(١٣٥)

هندباء (مقد — سديس)

الاسم الإنجليزي : Endiol

الاسم اللاتيني : *Cichorium pumilum* var. *endivia* L.

الفصيلة : المركبة *Conpositae*

موطن النبات : منطقة شمال أفريقيا والشام .

الوصف النباتي : عشب حولي له أوراق جذرية وأزهار زرقاء في مجموعات جالسة على الساق . والأوراق ملتفة حول الساق .



(هندباء)

- الجزء الطبى : الأوراق .
الجوهر الفعال : تحتوى الأوراق على مادة مرة .
الأثر الطبى : الأوراق مهضمة والجذور مقوية ، ملطفة للأغشية المخاطية ، وتعالج الحمى ، والأوراق منبهة وطاردة للغازات ، وتستخدم كعلاج للروماتيزم .

(١٣٦)


قاوون (شمام)

الاسم الإنجليزي : Sweet melon

الاسم اللاتيني : *Cucumis melo* L.

الفصيلة : القرعية *Cucurbitaceae*

موطن النبات : يزرع في بعض البلاد العربية ، وينمو برياً بالسعودية .



(قاوون)

الوصف النباتي : نبات زاحف أو متسلق ، حولى ، يحمل أوراقاً كبيرة وبرية ، والثمار كروية ، ولونها متغير بين الأصفر والأخضر .

الجزء الطبى : الثمار والبذور والجذور .

الجوهر الفعال : تحتوى الثمار على بروتينات ونشويات ومواد دهنية وألياف ومعادن وفيتامينات A, B₁, B₂, C وتحتوى البذور على زيوت دهنية وطيارة وبروتينات .

الأثر الطبى : الثمار فمدرّة للبول وملطفة للأغشية المخاطية . وتستخدم خارجياً لعلاج الأكرىما ، أما الجذور فمسهلة ومقيئة .

(١٣٧)

خيار

الاسم الإنجليزى : Cucumber

الاسم اللاتينى : *Cucumis sativus* L.

الفصيلة : القرعية Cucurbitaceae



(خيار)

موطن النبات : يزرع في كافة البلاد العربية .
الوصف النباتي : الخيار نبات زاحف ، خشن الساق ، وله أزهار إبضية صفراء ، والثمرة لينة تتدرج من مستديرة إلى مستطيلة ، ومحتواها المائي كبير ، ويؤكل الخيار نيئاً أو مخللاً أو مطهياً .

الجزء الطبى : الثمار .

الأثر الطبى : من الخارج :

— عصير الخيار الطازج ينقى جلد الوجه ويكسبه نضارة ، ولهذا الغرض يطلى الوجه في المساء بالعصير ليستمر مفعوله طيلة الليل .
قشر الخيار يسكن الصداع إذا وضع بوجهه الداخلى فوق الجبهة والصدغين وثبت فوقهما برباط .

من الداخلى :

— الخيار المفروم مع الحليب يسكن العطش في الحميات ويخفف الاضطرابات العصبية ، وكذلك يوصى مرض السكرى بالإكثار من أكل الخيار لتنقية الجسم من السموم .

(١٣٨)

حب العزيز

الاسم اللاتينى : *Cyperus esculentus L.*

الفصيلة : *Cyperaceae* الصليبية


موطن النبات : مصر والشام .

الوصف النباتي : عشب جذوره شعرية ليفية طويلة ، تنتهى بدرنات ، عليها حلقات دائرية ، حلوة المذاق ، يحمل النبات سنابل فاتحة اللون .

الجوهر الفعال : درنات حب العزيز تعد مصدراً غنياً بالمواد البروتينية والدهنية .

الأثر الطبى : تستعمل درنات النبات لعلاج التهابات الصدر ، ومدرّة للبن ، لذلك يعطى للسيدات بعد الولادة ، هذا ويصنع من النبات شراب منعش يسمى (السويّا) .

ويدخل زيت النبات في صناعة الصابون العطري ، أما بقايا الدرنات فتعطى علفاً للحيوانات .



(حب العزيز)

(١٣٩)

سرسوع

الاسم الإنجليزي : Rosewood

الاسم اللاتيني : *Dalbergia sisso* L.

الفصيلة : البقولية (القرنية) Leguminosae

موطن النبات : يزرع في معظم البلاد العربية من أجل الزينة .



(مرسوع)

الوصف النباتي : شجرة نصف متساقطة الأوراق ، أوراقها مركبة ، ريشية من خمس وريقات ، بيضية مقلوبة الوضع ، ومتبادلة على الفروع ، وتحمل الأزهار في عنقايد إبطية لونها أبيض أو أصفر ناصع ، والثمرة قرنية خضراء صغيرة مسطحة ، مضغوطة ، تصفر عند نضجها وبداخلها بذرة واحدة كلوية الشكل .

الأثر الطبي : يستخدم نقيع الأوراق في البلاد العربية لعلاج مرض السيلان Gonorrhoea الذى يصيب الجهاز التناسلى والبولى .

(١٤٠)

بزيط ، بلحة بن جحا ، طيار

الاسم اللاتيني : *Ecballium elaterium* L.

الفصيلة : *Cucurbitaceae* المركبة

موطن النبات : حوض البحر المتوسط ، وينتشر في كثير من دول شمال أفريقيا من العالم العربي .



(بزيط)

الوصف النباتي : نبات معمر زاحف يشبه نبات الخيار ، أوراقه معنقة ، متكاملة الحافة ، بيضية مثلية الشكل ، الأوراق والساق والثمار مغطاة بشعيرات شائكة ، الأزهار صفراء اللون ، وتوجد طول السنة غالبا ، الثمار بيضاوية مستطيلة في حجم ثمار البلح ، تنفصل عند نضجها عن أعناقها عند تعرضها لأي حركة ، عندها تقذف الثمار محتواها من البذور بقوة ولمسافات بعيدة ، البذور سوداء وعليها مادة مخاطية .

الجزء الطبي : الثمار الناضجة .

الجوهر الفعال : يحتوي النبات على الكيو كوربيتاسينات Cucurbitacins وحامض الإكباليك ecbalic acid والإكبالين Ecaballin وبعض القلويدات الغير المعروفة .

الأثر الطبي : يستعمل النبات علاجا فعالا في حالات مرض اليرقان « الصغير » وذلك بعصر الثمار في أذن أو أنف المريض .

(١٤١)

علفة (شيخ — فرفور)

الاسم الإنجليزي : willow herb

الاسم اللاتيني : *Epilobium hirsutum* L.

الفصيلة : الأونجرية *Onagraceae*

موطن النبات : شمال أفريقيا .

الوصف النباتي : عشب معمر ، يحمل وبرا ويخرج الساق القائم من جذر مداد ، ويحمل أوراقا بسيطة مسننة الحافة ، والأزهار أرجوانية محمولة في نورات راسيمية طرفية والثمار عليية .

الجزء المستعمل : عصير النبات .

الجوهر الفعال : حامض المالك *Malic acid*

الأثر الطبي : النبات سام يحدث انقباضات ، غير أن عصير النبات يستخدم لعلاج البثور الجلدية ، كما يستخدم ضد مرض بكتريا الستافيلوكوكس في جنوب أفريقيا .



(علفة)

(١٤٢)

جرجير

الاسم الإنجليزي : Eruca

الاسم اللاتيني : Eruca sativa Miller

الفصيلة : الصليبية Cruciferae



- موطن النبات : يوجد برياً في شمال أفريقيا والسعودية ، ويزرع في جميع البلاد العربية .
الوصف النباتي : عشب حولي ، له أوراق بسيطة مجزأة ، وأزهار صفراء اللون ، والثمرة خردلة متفتحة قصيرة لها منقار طويل .
الجزء المستعمل : الأوراق الغضة مع الغصن كله قبل الإزهار .
الجوهر الفعال : مادة خردلية ومواد مرة مع فيتامين (C) ، وأملاح اليود والسكريات والحديد .
الأثر الطبي : استعماله طبياً من الخارج :
— يستخدم عصير الجرجير كعلاج لإنبات الشعر بعد سقوطه ، كما يستخدم مرهم الجرجير في علاج الحروق .

- أما من الداخل فيستخدم الجرجير في مجالات كثيرة منها :
- معالجة جميع أعراض مرض الأسقربوط كنزيف اللثة .
 - علاج الآلام الروماتزمية .
 - معالجة داء الخنازير .
 - يحفظ كمية السكر في بول المصابين .
 - يعمل على الشفاء من الإصابات الرئوية .
 - يساعد على تنظيف الصدر من البلغم .
 - يساعد على الهضم وإدرار الصفراء .
 - إدرار البول والطمث .
 - بذور الجرجير تقوى الجنس .

(١٤٣)

خس (سلاطة)

الاسم الإنجليزي : Lettuce

الاسم اللاتيني : *Lactuca sativa* L.



(خس)

- الفصيلة المركبة **Compositae** :
موطن النبات : جنوب أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا ويزرع في معظم الدول العربية .
الوصف النباتي : عشب معمر له أوراق قاعدية وينتج في نهاية الموسم عنقا يحمل الأزهار والثمار ، وللخس عصير لبنى .
الجوهر الفعال : يعتبر نبات الخس مصدرا غنيا للفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد .
الأثر الطبي : أوراق الخس مليئة ومسكنة ، وزيت البذور مقول للجنس . ويفقد الخس في تهدئة الأعصاب ويعمل على خفض نسبة السكر في الدم ، وكان المصريون القدماء يزرعونونه ويعتبرونه عنوان الخصوبة .

(١٤٤)

مانجو



(مانجو)

الاسم الإنجليزي : Mango

الاسم اللاتيني : *Mangifera indica* L.

الفصيلة : الأناكاردية *Anacardiaceae*

موطن النبات : الهند والملايو ، وتزرع المانجو اليوم في كثير من البلاد العربية .

الوصف النباتي : شجرة دائمة الخضرة تعمر طويلا ، والأوراق رمجية طويلة حوالى ٢٥

سم ، جلدية الملمس ، ناعمة داكنة الخضرة ، والأزهار صغيرة بيضاء تميل إلى الاصفرار تحمل في عناقيد طويلة . وتختلف الثمار في الشكل والحجم والصفات تبعا للصنف ، فهي إما بيضية أو قلبية أو كلبية أو كروية ، وللثمار عادة رائحة عطرية واللحم يرتقلى اللون أو أصفر عصيرى كثير الألياف أو خال منها .

الأهمية الاقتصادية: تحتوى المانجو على ١١ — ٢٠٪ سكر ، وهى غنية بالمواد الغذائية ، والثمار الناضجة مليئة مدرة للبول . والدخان المتصاعد عن حرق الأوراق له تأثير فعال على أمراض الحلق ، ويستخدم المسحوق الناتج من سحق البذور المجففة في معالجة الإسهال والدوسنتاريا .

(١٤٥)

بصل الذئب (كيطوط)

الاسم الإنجليزي : Fair haired hyacinth

الاسم اللاتيني : *Muscari comosum* L.

الفصيلة : الزنبقية *Liliaceae*

موطن النبات : منطقة شمال أفريقيا وبعض البلاد العربية الأخرى .

الوصف النباتي : نبات له بصلة أرضية وأوراق شريطية ضيقة ، والأزهار صغيرة محمولة على نورة راسمية طرفية ، وتنتهى النورة بعدد من الأزهار العقيمة طويلة الأعناق ، وزرقاء اللون .

تنمو عدة أنواع أخرى من الجنس *Muscari* منها *M. maritimum* ، *parviflora* فى حقول الشعير على ساحل البحر المتوسط .

- الجزء المستعمل : النبات دون البصلة .
الأثر الطبى : تؤكل الأجزاء العليا مع السبانج ، والنبات مقو للمعدة ، حيث إنه يزيل الحموضة .
ويعتقد البعض أن النوع *M. maritimum* يدر اللبن عند الحيوانات ،
ويستخدم كلبخة تخفف من حرارة الجسم .

(١٤٦)

حريقة (ودن الفار — لسان الطير — حشيش الریح)

- الاسم الإنجليزى : Parietary
الاسم اللاتينى : *Parietaria officinalis* L.
الفصيلة : الحريقية *Urticaceae*
موطن النبات : منطقة شمال أفريقيا .
الوصف النباتى : عشب يحمل أوراقا بسيطة متبادلة ، وأزهارا صغيرة شبه أرجوانية ،
ويختلف عن نباتات الفصيلة الحريقية بعدم حمله الأوبار اللاسعة *Stinging hairs*
وينمو النبات فى الأماكن الظليلة والمظلمة وتحت أشجار النخيل .
الجزء الطبى : النبات بدون الجذور .
الجوهر الفعال : صبغات فلافونية *flavonoid pigments* ونترات البوتاسيوم .
الأثر الطبى : النبات مدر للبول ، وملين ، ويستخدم أيضا لعلاج الجهاز البولى والتهاب الشعب . ومن الخارج يستخدم لعلاج الجروح وعند مزج النبات بزيت الزيتون يعالج التهابات الجلدية .


نخيل البلح

الاسم الإنجليزي : Palms

الاسم اللاتيني : *P. dactylifera* L. *Phoenix* spp. L.

الفصيلة : النخيلية *Palmae*

موطن النبات : معظم البلاد العربية .



(نخيل البلح)

الوصف النباتي : النخيل أشجار غير متفرعة ، والساق أسطوانية الشكل مغطاة بقواعد الأوراق ، والأوراق مركبة كبيرة ريشية ، ويوجد للأوراق أعماق تحيط بالساق ، والنورات المذكرة والمؤنثة تحمل على نباتات منفصلة ، والنورة أغريضية مركبة يتفرع محورها إلى عدة فروع لحمية تحمل أزهارا جالسة ويغلفها غلاف يشبه القارب يسمى (إغريض) ، والثمرة لينة اندوسبرمية ، والنخلة الواحدة يمكن أن تعطي من الثمار ما يزيد على ٤٥ كجم من الثمر سنويا ولمدة تربو على قرن من الزمان .

ويعتبر النخيل أساس ثروة الصحراء وله عند العرب منزلة خاصة ، وقد جاء ذكر ذلك في الكتب المقدسة كما ورد أيضا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام .

وللنخيل عدد كبير من السلالات وهو من أهم النباتات الاقتصادية ، فثماره تحتوي على مقدار من المواد الغذائية ، إذ تحتوي على نسبة عالية من المواد النشوية المولدة للطاقة وللنشاط والحركة ، كما تحتوي على كمية من الفيتامينات التي تقى من مرض البلاجرا وكمية من مركبات الجير التي تدخل في تكوين العظام . وقد ذكر أطباء العرب أن طلع النخل يقوى الجسم ويزيل العقم ، ولقد أثبتت البحوث الحديثة صدق ذلك ، فقد ثبت أن الطلع يحتوي على سكر القصب بنسبة وجوده في سكر القصب ، كما يحتوي على نسبة كبيرة من المواد الزلالية تفوق نسبها في اللحوم وتحتوي على عناصر الكالسيوم والفوسفور والحديد ، إلى جانب احتوائه على فيتامينات (B, C) كما أمكن فصل مادة الروتين منه ، وهي المادة اللازمة لمرونة الشعيرات الدموية ، وثبت أيضا أن الطلع يحتوي على هرمون الإليسترون الذي ينشط المبيض ويساعد على تكوين البويضة .


بسلة (جلبان)

الاسم الإنجليزي : Pea

الاسم اللاتيني : *Pisum sativum* L.

الفصيلة : البقولية (القرنية) *Leguminosae*

موطن النبات : مناطق شمال أفريقيا ، ويزرع في معظم البلاد العربية .



(بسلة)

الوصف النباتي : متسلق حولي يحمل أوراقا مركبة ، ريشية ، تنتهى بمحلاق ، والأزهار حمراء أو بيضاء ، والثمار القرنية تحوى البذور الكروية .

الجزء المستعمل : الثمار والبذور .

الجوهر الفعال : تحتوى البسلة على Lectins, amino-nitrites, Choline, trigonelline
الأثر الطبى : للبذور تأثير على خفض نسبة السكر فى الدم ، وتستخرج من البذور صبغة تستخدم لعلاج التهاب أغشية المخ .

(١٤٩)

رجلة (رشاد — حرفا — بليشة)

الاسم الإنجليزى : Purslane

الاسم اللاتينى : *Portulaca oleracea* L.

الفصيلة : *Portulacaceae* الرجلة

موطن النبات : ينمو برياً فى معظم البلاد العربية وحول حوض البحر المتوسط والخليج



(رجلة)

العربي والسودان .

الوصف النباتي : عشب حولي ينمو برياً بين المزروعات ، يحمل أوراقاً متشعبة بسيطة

ذات أذينات حرشفية . والأزهار صغيرة خضراء والثمار عليية تتفتح بشق عرضي ، وتؤكل الرجلة كخضار نئى أو مطبوخ .

الجوهر الفعال : الرجلة غنية بالمواد المعدنية كالبوتاسيوم والحديد .

الأثر الطبى : فى الطب الشعبى تستخدم الرجلة لإزالة الالتهابات الموضعية ، كما

تستخدم لعلاج الإمساك ، والدستاريا ، والبواسير ، وضد التزيف المعدى ، كما تدخل فى بعض الأدوية لعلاج المرض السكرى .

ومن الظاهر تستعمل الأوراق لعلاج الخراج والالتهابات ، ويستخدم النبات كله لإدرار البول وكادة منعشة وطاردة للديدان .

وفى الحدائق يزرع النوع *Portulaca grandiflora* L. كنبات زينة لأن لأزهاره ألواناً جميلة مختلفة . والنبات يحتاج إلى مزيد من الدراسة لمعرفة مكوناته .

(١٥٠)

خرشوف

الاسم الإنجليزى : Artichoke

الاسم اللاتينى : *Cynara scolymus* L.

الفصيلة : المركبة *Compositae*

موطن النبات : يتوطن الخرشوف منطقة البحر المتوسط ، ويزرع فى بعض البلاد العربية .

الوصف النباتى : عشب كبير له أوراق مركبة ، والأزهار فى نورة هامية ، تحاط بمحيطات

من القنابات الكبيرة ، وتؤكل النورات غير الناضجة والقواعد المنتفخة للقنابات والتخت المتضخم نيئة أو مطهوة . والخرشوف من الخضروات ذات القيمة الغذائية المرتفعة ، فهو يحتوى على مقادير عالية من فيتامين (A) ، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية وأهمها الحديد .

استخلص من الخرشوف مادة السينارين التى تستخدم كمنشط للكبد وخفض نسبة الكولسترول فى الدم . والنبات غنى بالأنثولين (مادة



(خرشوف)

كربوايدراتية) تصلح كغذاء لمرضى السكر . وقد ثبت بتحليل الخرشوف أنه يحتوي ، بجانب مادة السينارين ، على مادتين تربتيتين ومادة أسترولية .

وبجانب الخرشوف يوجد أنواع أخرى من الجنس *Cynara* تنمو برياً في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب مثل *C. cardunculus* ويسمونه خرشيف أو خرشوف مشوك ، ويستعمل كمدر للبول في الطب الشعبي ومقو للصحة وملين خفيف ، أما مغلى النبات فيعمل منه مرهم لعلاج رائحة القدم الكريهة والنوع الآخر *C. humilis* ويستعمل مغلى جذوره لعلاج

تورم الكبد ويسمونه في الرباط فجة .
ويتناول الناس الخرشوف دون طهي أو على هيئة عصير من الأوراق أو
الساق ، ويتم تناول عصير الخرشوف قبل الوجبات للوقاية من التعرض
لأمراض الروماتزم .

(١٥١)

عناب

الاسم الإنجليزي : Jujuba

الاسم اللاتيني : *Zizphus jujuba* Miller .

الفصيلة : Rhamnaceae العناية

موطن النبات : الصين ، ويزرع في كثير من البلاد العربية من أجل ثماره الحلوة .
الوصف النباتي : شجرة صغيرة شوكية ذات ثمار حسلية لحمية صغيرة ، لونها أحمر داكن ،
لها أبيض . وتستعمل الثمار طازجة أو مجففة أو محفوظة ، ويزرع العناب
في الصين منذ أكثر من أربعة آلاف سنة ، وهو لا يزال ضمن الخمسة
أنواع الأولى من الفاكهة في الصين .

الجزء الطبي : الثمار .

الأثر الطبي : تستخدم عصارة الثمار لعلاج الكحة وعمل دواء مقو ، ويستخدم منقوع
الأوراق كمادة قابضة ، كما يستخدم القلف لعلاج الإمساك والدستاريا ،
وكذلك لعلاج الاضطرابات البولية .

(١٥٢)

سدر (نبق)

الاسم الإنجليزي : Christ's thorn

الاسم اللاتيني : *Zizyphus spina-Christi* L .

الفصيلة : Rhamnaceae العناية



(سدر)

- موطن النبات : شمال أفريقيا والسودان وشبه الجزيرة العربية والإمارات .
- الوصف النباتي : شجرة تحمل أوراقا بسيطة متبادلة بيضة ، وللورقة ثلاثة عروق من أسفل ، والأذينات متحورة إلى أشواك ، والثمار صفراء أو بنية ، وهي حسلية تؤكل لحلاوتها .
- الجزء الطبي : الثمار (النبق) ، والأوراق ، والخشب .
- الجوهر الفعال : تحتوى ثمار السدر (النبق) على نسبة عالية من فيتامين C .
- الأثر الطبي : في الطب الشعبي يستخدم فحم الخشب مخلوطا بالخل لعلاج لدغة الثعالب ، ومغلى الأوراق قابض وطارد للديدان وضد الإسهال . والعامة في مصر يستخدمون لبخة الأوراق لعلاج الخراج والتهاب العيون ، وتستعمل الثمار ضد الحمى وكملين ، وتوصف لعلاج مرض الحصبة .

الباب الثالث

النباتات العطرية

عرف الإنسان النباتات العطرية منذ القدم ، واستخلصت زيوتها العطرية . وبلغ من اهتمام الملوك بالعطور ونباتاتها أن أرسلت الملكة حتشبسوت أسطولا ضخما إلى بلاد بنط والصومال ، واستوردت من هناك بذورا وشتلات وأشجارا ، كما استوردت من فينقيا (سوريا ولبنان) بذور وشتلات الغاز والأرز ، وبلغ من شدة عنايتها بنجاح هذه النباتات أن استخدمت الأخصائيين من الفينيقيين لزراعتها والعناية بها .

كما اهتم العرب بالنباتات العطرية والعطور أكثر اهتمام ، حتى فرض المأمون جزيته على فارس مائة ألف زجاجة من زيت الورد . وازدهرت زراعة النباتات العطرية في العهد الإسلامي ، وكان لدمشق القدح المعلى ، حتى نسب إليها أفخر أنواع الورد *Rosa damascina* أو الورد الدمشقي ، وهو الذى عرفه العالم بعد ذلك في التجارة باسم الورد البلغارى بعد أن نقله الأتراك إلى الأناضول ثم إلى بلغاريا . ومن النباتات العطرية ، استخلصت الزيوت العطرية مثل زيت الياسمين وزيت العطر ، ومنها صيغت مستحضرات التجميل والتي تسمى Cosmetics المشتقة من كلمة *Cosmos* التي تعنى الفناء الخارجى كمجموعة متجانسة ، ولذا تعنى مستحضرات التجميل بأنها المواد التي توضع من الخارج لتنسيق وزيادة جمال وجاذبية الوجه أو الشعر أو الجلد ، والكلمة اليونانية *Kosmetekos* تعنى « ماهر في الديكور » .

والمستبح لثمن صناعة التجميل يأخذه العجب عندما يعلم أن التزين بدأ مع الحياة ، وفي سبيل الخلود والحياة ذاتها . ومن ضفاف النيل بدأت هذه الصناعة تنتشر في ربوع الشرق الأدنى حتى وصلت إلى الهند ، وقد استخدمت زيوت التطيب والصبغات وزيوت الشعر والكحل وغيرها من أغراض العبادة سواء بالنسبة للإنسان الحى أو بعد موته عند تحنيطه بواسطة الكهنة . وبهذه المناسبة ، نذكر أنه في فترة حكم كليوباترا ازدهر فن وعلم مستحضرات التجميل ، ليس فقط في مجال الاستخدام ولكن أيضا في مجال كيفية تحضير المركبات . ولقد عرف الشرق الأوسط في هذه الفترة مركبات عديدة للعناية بالجلد ، من مرطبات ومطهرات ومنظفات ، ثم مساحيق الوجه لتغطية الوجنت ، وكحل للرموش ، وآخر للجفون ثم مطريات للجلد ، ومعاين لإزالة الشعر من الوجه . وبالنسبة لشعر الرأس ، فقد انتشرت المصنفات من مراهم وزيوت وأصباغ ثابتة ومؤقتة وعطور . وأما بالنسبة للأيدي فقد عرفت

في أيام كليوباترا مواد طلاء الأظافر Mancure وكذلك مزيلات الطلاء ، ثم غسولات الفم والأسنان .

ويؤرخ مسجلو تاريخ صناعة التجميل الفترة ما بين القرن السابع والثاني عشر بالحقبة العربية ، وتميزت هذه الحقبة بترجمة ثم استيطان وهضم الثقافات والعلم الإغريقي . وظهر علماء العرب وكأنتهم دوائر معارف في كل العلوم . ووجدنا مظاهر العناية بالعطور تعم قصور الخلفاء في دمشق وبغداد ، وانتشر على نطاق كبير استخدام مستحضرات التجميل في بلاط جوارى الخلفاء . ومن العلماء الذين نفخر بهم وبأعمالهم ، وكان لهم أثر مباشر في اضطراد نمو صناعة العطور ومستحضرات التجميل نذكر :

- (١) جابر بن حيان (٧٢١ — ٨٠٥ م) له طرق مختلفة في التقطير والترشيح .
 - (٢) الرازي (٨٤١ — ٩٢٤ م) وهو كيماوى وطبيب ، ويعتبر أكبر طبيب في العصور الوسطى وهو أول من وصف المركبات الكيميائية للتطبيق .
 - (٣) أبو القاسم (٩٣٦ — ١٠١٣ م) وهو طبيب وعالم من الأندلس ، له أعمال أصيلة وابتكارات في عمليات التقطير والتسامي للأدوية والكيميائيات .
 - (٤) ابن سينا (٩٨٠ — ١٠٣٧ م) وهو أشهر من أن يكتب عنه . موسوعة في الفلسفة والعلم والطب والجراحة والكيمياء ، وهو أول من نجح في تقطير ماء الورد .
- وهناك مجموعة أخرى من العلماء العرب لهم أكبر الأثر بالنسبة لتطور صناعة العطور . وكانت المرأة العربية تولى زيتها عناية بالغة ، ومن أشهر مستحضرات التجميل في ذلك الوقت الطيب ، وكانوا يستخدمونه على هيئة بخور ينتج عند حرقه رائحة لطيفة ، ومنها أيضا الصندل والعود والند والرند .

وفي عهد المماليك اتخذت العطور طابعا جنسيا ، وتخصص عدد كبير من العطارين في صناعة هذه الدهانات الخاصة لأجزاء جسم المرأة والرجل . وتلعب الكائنات الدقيقة دورا كبيرا في مستحضرات التجميل وتصنيفها ، ومن أهم هذه الكائنات البكتريا والفطريات . وليست الزيوت الطيارة فقط هي التي تستعمل طيبا ، ولكن أيضا روائحها . ولقد أثبت الطبيب السوفييتي « شو كاجازانوف » صحة ذلك ، وهو يؤكد أنه قد أفلح عن استخدام العقاقير لعلاج مرضاه بعد أن ثبت أن العلاج بالروائح العطرية الطبيعية سهل وناجح وممتع للمريض ، كما لا يصاحبه أى أعراض جانبية على الإطلاق ، فهو يعالج مرضى الكلى عن طريق شم أوراق نباتات الذرة ، ومرضى عسر الهضم والتهاب القولون بشم النعناع ، والمغص وآلام البطن بشم الورد ، والالتهابات الجلدية برائحة الريحان ،

وحالات الإصابات بالبرد والزكام بشم أوراق اليوكالبتوس ، وعلاج آلام اللثة والأسنان بشم أزهار القرنفل ، أما أزهار البرتقال فرائحتها تزيل الصداع .
ويضيف الطبيب أنه يمكن للمريض الذى لا يستطيع الحصول على النباتات والأزهار الطبيعية الاستعاضة عنها بشم زيوتها المركزة التى تحمل نفس الرائحة والتى تؤدى نفس المفعول العلاجى .

وتنقسم الزيوت عامة إلى زيوت طيارة **Etherial oils** وزيوت دهنية ، والأخيرة تسمى أيضا بالزيوت الثابتة ، كما وتعرف كذلك الزيوت الطيارة بالزيوت العطرية .

الفصل الأول

نباتات عطرية تحتوى على زيوت طيارة (أو عطرية)

الزيوت العطرية :

تتميز هذه الزيوت بأنها تتبخر أو تتطاير عند تعرضها للهواء ، ولها طعم مستساغ ورائحة عطرية قوية ، ويمكن استخلاصها من الأنسجة النباتية بسهولة دون أن يتغير تركيبها ، وللزيوت العطرية تركيب كيميائى معقد . وأهم مزايا هذه النباتات أنها تساعد على طرد الغازات من المعدة والأمعاء ، وتزيل الانتفاخ والشعور بالامتلاء عقب الأكل ، كما أن رائحتها العطرية تكسب المشروبات التى تصنع منها والمأكولات التى تضاف إليها نكهة مستحبة ، وللعطارات أيضا بعض الخواص المطهرة ، فهى تطهر الفم وتخفى الرائحة الكريهة التى قد تتولد فيه ، كما أن بعضها يساعد على تطهير المسالك البولية ، وإذا وضع زيتها على الجلد من الخارج فإنه يهيج البشرة ويجذب الدم إلى السطح وبذلك يعمل على تورد البشرة واحمرارها . وتنتمى هذه النباتات إلى حوالى ٦٠ فصيلة ، ولكن تتميز منها على وجه الخصوص الفصائل الغارية والآسية والخيمية والشفوية والمركبة والسذبية والمرسينية والصنوبرية . وتختلف كمية الزيت الموجودة فى النبات ، فقد تكون ضئيلة للغاية وقد توجد بنسبة ٢٪ . وتفرز الزيوت من شعور غدية ، كما فى نباتات الفصيلة الشفوية والمركبة ، أو فى خلايا داخلية ، كما فى الفصيلتين الغارية والفلفلية ، أو فى قنوات زيتية ، كما فى الفصيلة الخيمية ، وفى غدد انقراضية Lysigenous glands أو انفصالية Schizogenous glands ، كما فى الفصيلتين السذبية والصنوبرية .

وقد يكون النبات كله مصدرا للزيوت كما فى الصنوبريات ، أو يكون فى جزء خاص من النبات مثل الأزهار (الورد) ، أو الثمار (البرتقال) ، أو الأوراق (النعناع) ، أو القلف (القرفة) ، أو الجذور (الجنزيبيل) ، أو الخشب (السدر) أو البذور (الحبهان) . وقد يكون للنبات نوعان من الزيوت الطيارة كما فى البرتقال ، حيث يتكون فى بتلات الأزهار نوع من الزيوت يختلف عن الزيت الذى يتكون فى قشرة الثمرة .

وفى أغلب الأحوال توجد الزيوت الطيارة فى النباتات متحدة مع مواد أخرى مثل الصمغ والراتنجات ، كما أن تركيب الزيوت يكون عادة واحدا فى أجزاء النبات المختلفة ، ولكن فى بعض النباتات تختلف طبيعة الزيوت وتركيبها تبعا لعضو النبات الذى يحتوى عليها ،

فمثلا في نبات القرفة يحتوي زيت القلف على نسبة كبيرة من Cinnamic aldehyde ، بينما زيت الأوراق غني باليوجينول Eugenol ، كما أن زيت الجذور غني بالكامفور Camphor .
ووجد أن التركيب الكيميائي للزيت في عضو ما بالنبات قد يختلف تبعاً لتغير الأحوال الجوية المحيطة بالنبات .

ويعتقد بعض العلماء أن الزيوت النباتية الطيارة ما هي إلا مواد إخراجية وليست مواد أيضية ، ويعتقد البعض الآخر أن بعض هذه الزيوت الطيارة تجذب الحشرات لإتمام عملية التلقيح الخلطي الهامة ، والبعض الآخر يعمل على إبعاد بعض الحشرات والحيوانات الضارة عن النباتات ، كما أن بعض هذه الزيوت الطيارة تعمل على تقليل سرعة النتح من النباتات ، وخاصة في الأجواء الحارة ، كما أن البعض الآخر يستخدم كمذيب للراتنجات في حالة التثام الجروح .

وبجانب الفوائد الطبية للزيوت الطيارة التي سبق ذكرها ، فإنها اليوم تعتبر مواد أساسية في تحضير مستحضرات التجميل ومعاجين الأسنان والروائح العطرية .
وتستخلص الزيوت الطيارة من أنسجة النباتات بطرق مختلفة ، تتوقف على كمية الزيت والعضو النباتي ، ويوجد ثلاث طرق أساسية ، وهي العصر والاستخلاص بالمذيبات والتقطير .
وتصنف أحيانا الزيوت الطيارة تبعاً للمادة الكيميائية الموجودة في الزيت إلى المجموعات الآتية :

- (١) مجموعة الهيدروكربونات Hydrocarbons ، ومنها :
المرسن Myrcene (زيت حشيشة الدينار وزيت حشيشة الليمون) والأوسمين Ocimene (زيت الريحان) ، والبارسيمين Bara cymene (زيت السعتر والكسبرة وزيت جوزة الطيب .
- (٢) مجموعة الألدهيدات Aldehydes ، ومنها :
السترال Citral (زيت المواخ) والفلاندرال Phellandral ويوجد في اليوكالبتوس .
- (٣) مجموعة الكيتونات Ketones ، ومنها :
المنثون Menthone (زيت الفلية) والكرفون Carvone (زيت الكراوية) والكمافور Camphor (زيت الكافور) .
- (٤) مجموعة الإسترات Esters ، ومنها :
سترات الجيرانيم Geranyl acetate (حشيشة الليمون) ، وسالسلات الميثل (زيت البتول) .

(٥) مجموعة التربينات الكحولية ، ومنها :

السترونيلول Citronellol (زيت الورد والسترونيلا) والجيريانيول (الجارونيا) ،
واللينالول Linalol (زيت جوزة الطيب والكزبرة) .

(٦) مجموعة الفينول الأثيرية Phenolic ether مثل :

الثيمول Thymol (السعتر والريحان)

وكثير من النباتات التى تحتوى على الزيوت الطيارة ، بجانب أنها نباتات طيبة ، فهى تدخل
فى تركيب أدوات التجميل ، وأهم هذه النباتات :

الأقحوان — البردقوش — البنفسج — الحسك — حشيشة الليمون — حصالبان — الريحان
— الزيزفون — السوسن — العطر — الفتنة — الحلبة — القرنفل — الكرم — المريمية — الورد —
النعناع — الياسمين — اليوكالبتوس .

أما النباتات الأخرى التى تحتوى على الزيوت الطيارة ، فبجانب أنها نباتات طيبة ،
فتستخدم فى كثير من الأحوال كتوابل ، وأهم هذه النباتات :

البقدونس — الجزر — الجعدة — الحارة — الخلة — السعتر — الشبث — الشمر —
الطرخون — الكرفس — الكراوية — الكزبرة — الكمون .

(١٥٣)

فتة

الاسم الإنجليزى : Cassie

الاسم اللاتينى : Acacia farnesiana Willd

الفصيلة : القرنية Leguminosae

موطن النبات : الهند الغربية ، ولكنها الآن تزرع فى مناطق كثيرة كمصدر للعطر فى
جنوب فرنسا ومصر وسوريا والجزائر والمغرب .

الوصف النباتى : شجيرة شائكة كثيرة التفرع ، تحمل أوراقا مركبة ريشية مزدوجة ،

وأزهارا صفراء فى هامات زكية الرائحة ، والثمار قرون غير متفتحة .

عرفها الفراعنة باسم (برش) ، كما عرفوا أزهارها باسم (سانار) ،

ويعرف الزهر فى سوريا باسم (العمير) ، وفى السعودية باسم (بان) ،

وفي الجزائر باسم (فتنة) ، وفي المغرب باسم (مسك الصناديق) .
وتشير جميع الأسماء إلى رائحة الأزهار العطرة الجميلة وما تحويه من زيت
طيّار .



(الفتنة)

الجزء الطبّي : الأزهار والقرون .
الجوهر الفعّال : الزيت الطيّار ، وأهم محتوياته الفارينسول والجيرانبول واللينالول .
وتحتوي الثمار على ٢٣٪ تانين ، وكذلك القلف .
الأثر الطبّي : تستعمل القرون كقابض في الدباجة ، ولعلاج الإسهال ، كما يعمل منها

مرهم للإكزيما وتهتك ما بين أصابع القدم .
وتستخدم الأزهار ضد المغص ، والصمغ كملين ، ويستعمل الزيت
بكثرة في الدهانات والحشيات العطرية والمساحيق . والفتنة هي المصدر
الرئيسي للعطر Cassie perfume الفرنسي ، وقد أقيمت مزرعة لنبات
الفتنة غرب بيروت .

الفتنة كتابل : يستعمل الزيت في تحضير الروائح العطرية .

(١٥٤)

سندقورة (أجوجا)

الاسم الإنجليزي : Herb ivy (ajuga)

الاسم اللاتيني : Ajuga iya (L.) schreber

الفصيلة : الشفوية Labiatae




(سندقورة)

- موطن النبات : سواحل البحر المتوسط في مصر وليبيا ، وفلسطين ولبنان .
الوصف النباتي : عشب معمر مغطى بزغب أبيض ، له أوراق بسيطة شريطية متموجة
الخافتة ، وأزهار أرجوانية أو صفراء محمولة على نورات سنبلية عطرية .
الجزء الطبي : النبات كله ، وخصوصا الأوراق .
الجوهر الفعال : الزيت الطيار Cyasterone
الأثر الطبي : يستخدم مغلي النبات ضد الحمى وعلاجاً لمرض السكر .

(١٥٥)

ثوم

- الاسم الإنجليزي : Garlic
الاسم اللاتيني : *Allium sativum* L.



(ثوم)

- الفصيلة : الزنبقية *Liliaceae*
- موطن النبات : لا يعرف موطنه الأصلي ولكنه يزرع في معظم البلاد العربية .
- الوصف النباتي : نبات يشبه البصل ، ويختلف عنه في أن بصلته مركبة ، وتتكون من عدة بصيلات ، كل منها بصلة صغيرة ، وهو نبات معمر ذو أوراق شريطية ضيقة ، وتعرف البصيلات بالفصوص وهي مغطاة بقشرة بيضاء . وقد استعمل الثوم منذ القدم في تنبيل الحساء والسلطات .
- الجزء الطبي : فصوص الثوم . ويلاحظ أن فاعليته تزداد بعد تخزينه لمدة ستة أشهر .
- الجوهر الفعال : زيت طيار مع مركبات كبريتية وفيتامين وهرمونات ومواد مضادة للعدوى ، وقد استخلصت منه مادة الأليسين وهي المادة الأساسية للصفات العلاجية .
- الأثر الطبي : من الخارج :
- ١ — يستعمل الثوم لتسكين الآلام الموضعية مثل الآلام الروماتزمية .
 - ٢ — تسكين آلام الأسنان ، بوضع الثوم المهروس فوق موضع الألم .
 - ٣ — تسكين آلام الأذن ، بتنقيط بضعة نقط من زيت الزيتون الذي طبخت به بضعة فصوص من الثوم .
 - ٤ — معالجة الجروح العفنة والقروح .
 - ٥ — معالجة القشور في فروة الرأس .
- من الداخل :
- ١ — يقوى مناعة الجسم ويكسبه نشاطا ، ولذلك يوصى بأكله للوقاية من الأوبئة (التيفويد والدستاريا) .
 - ٢ — يعتقد أنه يقى من الإصابة بالسرطان .
 - ٣ — يقى إلى حد كبير من الإصابة بمرض شلل الأطفال .
 - ٤ — يفيد مرضى البول السكري فهو يخفض نسبة السكر في الدم .
 - ٥ — يخفض ضغط الدم العالى عند مرضى تصلب الشرايين .
 - ٦ — يعالج تقيح اللثة المزمن .
 - ٧ — علاج الإسهال المزمن .
 - ٨ — يقتل الثوم الديدان المعوية ويطهر الأمعاء خصوصا عند الأطفال .
- وقد استخدم الثوم منذ القدم ، مقويا ومشهيا وجاليا للصوت ومطهرا

للأمعاء ، وفي عام ١٩٤٤ عزلت مادة الأليسین وهی المادة الأساسية التي تكمن وراء الصفات العلاجية النادرة ، والرائحة الخاصة لنبات الثوم ، وتنتج مادة الأليسین عند قطع الثوم أو جرحه نتيجة فعل أنزیم الألینیز علی الحامض الأمینی ألین ، وحرارة الطهي تدمر المواد ، ولذلك ينصح بأكله في صورته الطازجة أو نصف مطبوخ .

(١٥٦)

خلّة

الخلّة البلدی واسمها العلمی : *Ammi visnaga* (L.) Lamk

الخلّة الشیطانی واسمها العلمی : *Ammi majus* L.

الفصيلة : الخيمية *Umbelliferae*

موطن النبات : تنتشر نباتات الخلّة بين المزروعات في البلاد العربية التي تطل علی البحر المتوسط ، وكذلك العراق والخليج العربي ، والعربية السعودية والسودان .

الوصف النباتي : بالرغم من أن كلا من الخلّة البلدی والخلّة الشیطانی نوعان لجنس واحد ، إلا أن مكوّناتهما تختلف تماما عن بعضهما .

الخلّة نبات عشبي حولي يبلغ ارتفاعه حوالي المتر ، والساق خضراء فاتحة مخططة طوليا ، كثيرة التفرع ، والأوراق تختلف في النوعين فهي في الخلّة البلدی مفصصة ريشية أو خيطية وتحيط قواعدها العريضة بالعقد ، أما في الخلّة الشیطانی فهي مفصصة ريشية مسننة الحافة . والنورة طرفية خيمية مركبة ، والأزهار بيضاء مخضرة ، والثمار بنية اللون تنفصل إلى ثمرتين ، وتختلف ثمار الخلّة الشیطانی عن ثمار الخلّة البلدی في أنها (أي الشیطانی) ، لونها بني خال من اللون البنفسجي ، وأن النورة عند تمام النضج تنفرط وتسقط الثمار علی الأرض ، فيساعد ذلك علی انتشارها . أما الخلّة البلدی فتحفظ النورة بشكلها بعد تمام النضج ، ويساعد ذلك علی جمع ثمارها دون فقد المحصول .

الجزء الطبّي : الثمار الناضجة الجافة .



(خلة)

الجوهر الفعال : تحتوي ثمار الخلة البلدى على مادة الخلين Khelin ، وهى المادة الفعالة الأساسية التى ترجع إليها القيمة الطبية والاقتصادية لهذا النبات ، كما تحتوي الثمار على جلوكوسيد يعرف بالخلول ومادة تسمى فزناجين ، أما ثمار الخلة الشيطاني فتحتوى على الأمويدين Ammoidin والبيرجابتين Pergapatin والزانشوتوكسين Xanthotoxin ، وأهم هذه المواد هى مادة الأمودين وهى خالية تماما من مادة الخلين .

الأثر الطبى : يستخدم مغلى الخلة البلدى فى الطب الشعبى مدررا للبول ، ومهدئا لآلام

المغص الكلوى ، ويساعد على نزول حصى الجهاز البولى ، وتدخل مادة الخلين فى المستحضرات الطبية التى تستعمل فى علاج آلام الكلى والحالب ، ويرجع تأثير الخلة البلدى المسكن لوجود مادة الخلين التى تقلل من انقباض عضلات الحالب ، وتساعد على ارتخائه فيتسع مجراه ، وبذلك يسهل مرور الحصى إلى المثانة . كما تستعمل لنفس السبب فى علاج الذبحة الصدرية وبعض أمراض القلب .
أما استعمال الخلة الشيطاني فيقتصر على علاج الأمراض الجلدية ، مثل البهاق .

والمصريون أول من اكتشف فوائد بذور الخلة واستعمال خلاصتها المائية فى إنزال الحصوات الكلوية ، كما اكتشفوا فاعلية مادة الأمودين وكذلك الخلين .

(١٥٧)

شبت (ستوت)

- الاسم الإنجليزى : Dill
الاسم اللاتينى : *Anethum graveolens* L.
الفصيلة : *Umbelliferae* الخيمية
موطن النبات : لا يعرف موطنه الأصلى ولكنه زرع من قديم الزمان فى اليونان وإيطاليا وفلسطين ، وهو يزرع اليوم فى كثير من البلاد العربية وفى أوروبا والهند والولايات المتحدة .
الوصف النباتى : نبات حولى صغير ، أو ثنائى الحول ، ذو أوراق خضراء خيطية رفيعة ، وأزهار صفراء ، والبذور منضغطة ومبططة ولونها بنى ناصع ، عليها خمسة عروق طويلة .
الجزء الطبى : الثمار الناضجة .
الجوهر الفعال : زيت مستخلص من الثمار ويسمى بزيت الشبت *Dill oil* ، وأهم مكوناته مادة الكارفون *Carvone* (٥٣ — ٦٣ ٪) ، وكذلك مادة الليمونين *Limonene* ، والفيلاندرين *Phellandrene* . وزيت الشبت لونه أصفر



(شبت)

فاتح ورائحته عطرية نفاذة .
: يستعمل زيت الشبت كطارد للغازات في حالة الانتفاخ والمغص ،
وخاصة عند الأطفال ، ولتحسين طعم كثير من العقاقير ، كما تستخدم
الأوراق مع بعض الأطعمة لإكسابها طعما ورائحة مقبولة .

الأثر الطبى

(١٥٨)

حشيشة الملاك

الاسم الإنجليزي : Angelica

الاسم اللاتيني : *Angelica archangelica* L.

الفصيلة : الخيمية Umbelliferae



(حشيشة الملاك)

- موطن النبات : حوض البحر المتوسط .
 الوصف النباتي : عشب معمر غليظ ذو أوراق ريشية مركبة كبيرة ، وأزهار بيضاء مخضرة صغيرة في نوريات خيمية مركبة .
 الجزء الطبى : النبات كله .
 الجوهر الفعال : زيت عطرى ، وتحتوى الجذور على الحامض الإنجىلى (ك. يد ٨)
 Angelic acid ، وعلى الفلاندرين (ك. يد ١٠) Phelandrene ،
 وحامض الفالريك Valeric acid .
 الأثر الطبى : تستخدم فى الطب الشعبى لإدرار الطمث وعلاج النقرس والروماتزم والتهاب الشعب والحمى المتقطعة .
 الاثر التابلى : فتح الشهية ، وهى مهضمة ، وتضاف عادة إلى الحلوى والفطائر .

(١٥٩)

كرفس (كرافس)

- الاسم الإنجليزى : Celery
 الاسم اللاتينى : Apium graveolens L.
 الفصيلة : الخيمية Umbellifera
 موطن النبات : أوروبا وآسيا ويزرع اليوم فى كثير من الدول العربية ووجد أنه ينمو برياً بالسعودية .
 الوصف النباتي : عشب عطرى يحمل أوراقاً مركبة ريشية (٣ وريقات) ، وأزهاراً بيضاء صغيرة محمولة على نوريات خيمية ، لها أعناق قصيرة ، والثمار ملساء منضغطة .
 الجزء الطبى : الثمار (البذور) والجذور والأوراق الغضة .
 الجوهر الفعال : زيت الكرفس ، ويتركب من مركبة لاكتونى وهو مصدر الرائحة المعهودة للكرفس .
 الأثر الطبى : وصف لمعالجة البول السكرى وفقر الدم والإمساك ، كما يؤكل الكرفس لمعالجة الآلام الروماتزمية وذاء النقرس ؛ ويؤكل لمداداة الانقباض النفسى والضعف العصبى والجنسى .

جاء في تذكرة داود عن الكرفس ما يأتي :

« الكرفس حار يابس يفتح السدد ويزيل اليرقان وعسر البول ويذيب الحصا ويعيد للكهل قوة الشباب ويزيل الربو وعسر التنفس والرياح الغليظة والفواق ويرد الأحشاء وخصوصا الكبد ، وينقى البدن من غوائل السموم والمغص ، بزره أقوى من أصله وعصارته بدهن الورد والخل طلاء ناجح في الحكمة والجرب مع القطرون والكبريت . »

(١٦٠)

أقحوان (أزريون)

الاسم الإنجليزي : Mary gold

الاسم اللاتيني : *Calendula officinalis* L.

الفصيلة : المركبة *Compositae*

موطن النبات : منطقة شمال أفريقيا ، الكويت ، الشام .

الوصف النباتي : عشب حولي يرتفع إلى حوالي ٥٠ سم طولا ، ويحمل أزهارا في نورات هامية صفراء أو برتقالية اللون . والثمار أكينية ملتوية -حلقية أو ذات منقار وعليها نتوءات .

الجزء الطبي : الأوراق والأزهار والثمار .

الجوهر الفعال : يحتوي النبات على زيت طيار ، يحتوي على كاروتينات Carotenoids ، ومادة الكالنديولين Calendulin ، كما يحتوي على صابونيات وتانينات وستيرونات وحامض السلسليك ، أما الأزهار فتحتوي على Azulenogenie sequiterpene .

الأثر الطبي : تستخدم الأوراق كمعرق ومدر للبول ومدر للطمث وقابض ومسكن

ومضاد للقيء . وتستخدم الأزهار في استخراج الكالنديولين Calendulin الذي يستخدم في تحضير المراهم لعلاج الجروح وتشققات الجلد . كما يستعمل مستحلب الأزهار لاحتوائها على هرمون جنسي لمعالجة



(أقحوان)

الضعف الجنسي عند الذكور . والمستحلب يدر الطمث عند السيدات
ويسكن ما يرافقه من آلام . كما يستخدم المستحلب لمعالجة سرطان الرحم
وسرطان المعدة .

(١٦١)

كراوية (كروية)

الاسم الإنجليزي : Caraway

الاسم اللاتيني : Carum carvi L.

الفصيلة : الخيمية Umbelliferae

موطن النبات : يزرع في معظم البلاد العربية ، وموطنه أواسط وشمال أوروبا ، وينتشر اليوم في المناطق المعتدلة من نصفي الكرة الأرضية .

الوصف النباتي : عشب معمر له جذور غليظة ، وأوراق مركبة ، والأزهار صغيرة بيضاء ، والثمار بنية مخضرة اللون ، لها رائحة عطرية ، وعند عصرها يحصل منها على زيت عطري (زيت الكراوية) .

الجزء الطبي : الثمار .

الجوهر الفعال : زيت الكراوية ، وأهم المركبات كيتون يعرف بالكارفون (ك. ١٠ يد ١٤ ا)

Carvone ، والليمونين (ك. ١٠ يد ١٤) Citrene

الأثر الطبي : يساعد على الهضم ، ويطرد الغازات ، ويسكن المغص ، ومن الخارج تستعمل الثمار الساخنة ككمادات لمعالجة المغص ، كما يدللك جدار البطن بزيت الكراوية لتسكين المغص المعوي وطرده الغازات .

ويستعمل الزيت في التدليك الموضعي لتسكين الآلام الروماتيزمية .

وفي الطب الشعبي تعطى البنور كشورية لإزالة انتفاخ البطن ، كما تعطى للنساء في الأيام الأولى من النفاس لإدرار اللبن .

يقول داود في الكراوية ما يأتي :

الكراوية نبت مثل الشبث له زهر أبيض ، والثمار حارة يابسة تحلل الرياح والنفخ ومهضم وتفتح الشهية وتمنع التخم .

(١٦٢)

حسك (مرير — بلعلع)

الاسم الإنجليزي : Mouse - thorn

الاسم اللاتيني : *Centaurea calcitrapa* L.

الفصيلة : المركبة *Compositae*

موطن النبات : حوض البحر المتوسط والسودان .

الوصف النباتي : عشب معمر ، طويل الساق ومتفرع كثيرا ، يحمل أوراقا طويلة مفصصة ، وأزهارا محمولة في نورات هامية محاطة بغلافه شوكية صفراء ، والأزهار بيضاء اللون إلى وردية . وينمو النبات على حواف الطرق والقنوات المائية .

الجزء الطبي : جميع أجزاء النبات .

الجوهر الفعال : يحتوي النبات على قلويدات وفلافونات *Flavones* وتربينات .

الأثر الطبي : يستخدم النبات كقابض وفاتح للشهية ، وفي علاج الجروح والتهاب العيون ، ولعلاج اضطرابات المعدة ، وضد الحمى المتقطعة ، وفي علاج الصداع . كما تستعمل الأزهار في علاج الحمى ، وتستخدم الجذور والثمار كمدررة للبول ، أما البذور فتستخدم لالتئام الجروح وفي علاج أمراض أخرى يؤمن بها العامة .

وينمو في دول شمال أفريقيا النوع البري *Centaurea alexandrina* L.

وله نورات كبيرة وأزهار صفراء محاطة بأشواك منحنية . ويستخدم المواطنون خلاصة الأفرع المزهرة لعلاج مرض السكر والقضاء على البكتيريا .

(١٦٣)

غرديب (بيريشيرم)

الاسم الإنجليزي : *Pyrethrum*

الاسم اللاتيني : *Chrysanthemum cinerarifolium* L.



(غرديب)

- الفصيلة المركبة **Compositae** :
موطن النبات : ينمو برياً في لبنان وسوريا وفلسطين وجنوب السودان ، ويزرع على مستوى تجارى في الجزائر وبلاد أخرى .
الوصف النباتي : هناك ثلاثة مصادر رئيسية للبيرثيرم كأهم ميبد حشرى ، الأول وهو اليوغسلافى وهو نبات برى معمر مغطى بزغب أزرق وأزهاره صغيرة تشبه الأقحوان وموطنه دالماسيا ويوغسلافيا حيث زرع منذ سنين ، وقد كونت أزهاره إحدى الصادرات الهامة للدولة وأعطيت العناية التامة فى جمع المحصول وتجفيفه وتعبئته .
والبيرثيرم غير قابل للاشتعال وغير سام ولا يترك مخلفات زيتية ، وهو شديد الفاعلية ضد الذباب والبراغيث والقمل وبعوض الملاريا والحمى الصفراء . ويعبأ البيرثيرم على هيئة أسطوانات مضغوطة من الميبد مذابا تحت ضغط ٩٠ رطلا على البوصة المربعة وعند فتح الأسطوانة مدة ثلاث ثوان تخرج منه سحابة من الأبخرة تشل الحشرات نهائيا .

وقد لوحظ أن تأثير المسحوق لا يستمر طويلا ويفقد خاصيته مع
مضى الزمن ، لذلك فكر الكيميائيون في استخدام أصله الفعال ،
وتوصلوا إلى عزله وتعريفه ، ومنذ ذلك الوقت عمت صناعة الخلاصة .

(١٦٤)

برتقال

الاسم الإنجليزي : Orange

الاسم اللاتيني : *Citrus sinensis* L.

الفصيلة : السبذية Rutaceae

موطن النبات : جنوب شرق آسيا ، ومن المحتمل أن يكون الصين ، ولقد زرع منذ
١٠٠٠ سنة ق . م في الشرق الأوسط ، ثم نقل إلى أوروبا في القرن الرابع
عشر ، ثم نقل إلى أمريكا وانتشرت زراعته في أنحاء العالم .



(برتقال)

الوصف النباتي : النبات شجرة متوسطة الطول (٢ — ٥ أمتار) دائمة الخضرة ، مستديرة القمة ، تحمل أشواكا رقيقة قابلة للانشاء ، وأزهارا بيضاء عطرة ، والثمرة كروية أو مستطيلة والللب حلو ، وأصناف البرتقال كثيرة .

الجزء الطبي : الثمار والأزهار .

الجوهر الفعال : لعصير البرتقال والللب فوائد كثيرة منها :

١ — ينقي الدم .

٢ — يفيد في حالات التهاب الأغشية المخاطية للأنف .

٣ — له أثر فعال في فتح الشهية .

٤ — قشرة الثمرة تستغل في امتصاص الغازات من المعدة والأمعاء .

٥ — تستغل قشرة الثمرة كمادة قابضة .

٦ — يعتبر البرتقال من أغنى الفواكه في فيتامين (C) المضاد للبرد والزكام .

٧ — تعتبر قشرة البرتقال مصدرا لزيت البرتقال العطري الذي له استخدامات كثيرة في الطب والغذاء .

٨ — تقطر الأزهار ويستخلص منها ماء الزهر المعروف .

(١٦٥)

كزبرة (كسبر)

الاسم الإنجليزي : Coriander

الاسم اللاتيني : *Coriandrum sativum* L.

الفصيلة : الخيمية (*Apiaceae*) *Umbelleferae*

موطن النبات : الاتحاد السوفيتي . ويزرع اليوم في كثير من البلاد العربية كمصر ، والسودان وليبيا والمغرب . والكزبرة من النباتات العطرية القديمة ، واستعملت أثناء العصور الوسطى في أغراض كثيرة .

الوصف النباتي : نبات حولي ذو رائحة نفاذة ، أملس ، والأوراق السفلى عريضة ، بينما العليا مجزأة ورفيعة ، والأزهار بيضاء محمولة على نورات خيمية ،

والأزهار الخارجية شعاعية ، والثمار كروية بنية إلى مخضرة اللون ، مائلة إلى الاصفرار .

الجزء الطبقي : الثمار المجففة ، وبتقطيرها يحصل على زيت عطري (زيت الكزبرة) .

الجوهر الفعال : كحول يعرف باللينالول (ك. ١٠ يد ١٨) Linalol وعلى الصنوبرين (١.١ يد ١) Pinene والفلفلين (ك. ١٠ يد ١٤) Cyenne .

الأثر الطبي : الكزبرة وزيتها مفيدان للمعدة ويعملان على طرد الغازات منها ، وتضاف الكزبرة إلى بعض العطارات المسهلة لمنع المغص . ويعمل الزيت على خفض نسبة السكر في الدم .

الكزبرة كئابل : مادة معطرة للحلوى وأطباق المشهيات ، ويستعمل زيت الكزبرة في المشروبات المعطرة كالشاي والقهوة ، وخلاصة الكزبرة أحسن للتعطير من الثمار أو الزيت .

يقول داود في الكزبرة ما يأتي :

« الكزبرة نبات عريض الأوراق مفرد الحب ، وهي تحبس القيئ وتمنع العطش والقروح والحكة والجرب أكلا وطلاء ، وماؤها بالسكر يشهى ويمنع التخم ويقوى القلب ويمنع الخفقان ، ومع الزعتر والسكر تزيل الدوستاريا ، ومع الصندل والينسون تقوى المعدة وتسقط الديدان » .

(١٦٦)

كمون

الاسم الإنجليزي : Cummin

الاسم اللاتيني : Cuminum cyminum L.

الفصيلة : الخيمية Umbellifera

موطن النبات : حوض البحر المتوسط ، ويزرع اليوم بكثرة في جنوب أوروبا والهند ومصر ، وخاصة مديرية قنا ، وعرفه قدماء المصريين (قميني) .

الوصف النباتي : الكمون عشب حولي صغير جذاب ، له أزهار قرمزية صغيرة ، وثمار بيضية طويلة لونها بني ، وهي حريفة وعطرية .

الجزء الطبقي التالي: الثمار ويستخلص منها زيت الكمون .



(كمون)

الجوهر الفعال : الزيت العطري وراتنج وصمغ ، والزيت خليط من الأنيثول والفلفلين والليمونين .

الأثر الطبي : وجوده في الطعام ينبه الأمعاء ويساعد على طرد الغازات ، كما يستخدم كمسكن للمغص المعوي .

الكمون كتابل : يستخدم في الطهي في البلاد الشرقية كفاتح للشهية ويدخل في تحضير مسحوق الكاري ، وفي صناعة المشروبات والمأكولات .

يقول داود في الكمون ما يأتي :

« يعرف الكمون بطيب الرائحة وهو يحلل الأرياح ويطرد البرد ويحلل الأورام

ويدفع السموم وسوء الهضم والتخم وعسر النفس والمغص الشديد شربا بالماء

والخل . وإن مزج بالزعرور وتفرغر بطبيخه سكن وجع الأسنان والنزلات » .

(١٦٧)


حشيشة الليمون

الاسم الإنجليزي : Lemon grass

الاسم اللاتيني : *Cymbopogon citratus* Stapf.

الفصيلة : النجيلية Gramineae

موطن النبات : تنتشر في المناطق الحارة ، ويزرع اليوم في الهند وسيلان وأفريقيا الشرقية



(حشيشة الليمون)

والكونغو ومدغشقر ، وفي كثير من البلاد العربية كمصر والسودان والسعودية .

الوصف النباتي : عشب عطري معمر ، يمكث في الأرض حوالى عشر سنوات ، وللنبات أوراق طويلة تشبه السيف ، وملساء . أدخلت زراعته في مصر ونجحت تماما ولكنها لم تنتشر لقلة معامل التقطير .

الجزء الطبي : الأوراق .

الجوهر الفعال : زيت عطري له طعم الليمون ، ورائحته قوية ، ويعزى ذلك إلى محتواه العالي من السترال (٧٠ — ٨٠ ٪) .

الأثر الطبي : يستعمل في الأغراض الطبية كمطهر وطارد للغازات والديدان المعوية . كما يستعمل في صناعة العطور ومستحضرات الزينة وصابون التواليت وكادة مطيبة . ويستعمل كذلك في صناعة المبيدات الحشرية ، حيث يضاف إلى العبوات لإخفاء رائحة الكيروسين .

وحشيشة الليمون تشبه نبات الإذخر في احتوائها على الزيت الطيار . وفي العراق ينمو النوع *C. olivieri* Bor. وتقتات عليه الجمال ، وهو نبات صحراوي ويستخرج من أوراقه وجذوره زيت يسمى *Camel grass oil* ، ويستعمل دواء لكثير من الأمراض كالروماتزم والآلام الحادة في الرأس والحمى . وفي بعض البلاد العربية ينمو النوع *C. parkeri* Stapf. ويسمونه في قطر « أصطخير » ، وربما كانت له نفس الاستعمالات التي ذكرت للأنواع السابقة .

(١٦٨)

حلفابر (إذخر — أبوركة — حشيشة الجمل)

الاسم الإنجليزي : Camel's hay


الاسم اللاتيني : *C. proximus* L. (*Cymbopogon schoenanthus* Spreng)

الفصيلة : النجيلية *Gramineae*

موطن النبات : شمال أفريقيا وكذلك شبه الجزيرة العربية ، وموطنه الأصلي الهند وجزر الهند الشرقية .

الوصف النباتي : عشب زكى الرائحة ، له أوراق شريطية ، يحمل الأزهار فى نورات سنبلية مركبة مائلة .

الجزء الطبى : النبات كله .



(حلفاير)

الجوهر الفعال : زيت طيار يحتوى على الجيرانىول Geraniol يشبه Lemon grass oil ، وهو مزيج من رائحة النعناع ومادة راتنجية مرة .

الأثر الطبى : النبات مضاد للمغص ، وطارد للغازات ، ومدر للبول ومقو ، ومعرق ، ويداوى آلام المعدة والعادة الشهرية . ومن الخارج يستعمل الزيت لعلاج الروماتزم ، وتستخدم الجذور فى تحضير العطور ومستحضرات التجميل .

وفى الهند يعتبر الإذخر من النباتات الطبية المدرجة فى دستور الأدوية الهندية ، ويعتقد أنه يفيد فى علاج الصلع .

(١٦٩)

سعد خشن

الاسم اللاتيني : *Cyperus longus* L.

الفصيلة : السعدية *Cyperaceae*

موطن النبات : مصر ، لبنان ، فلسطين وسوريا .

الوصف النباتي : يشبه السعد الخشن نبات السعد العادي *C. rotundus* ، ولكنه أطول وأقوى ، وله ساق مكنتزة وخاصة من أسفل ، وللنبات ريزومة زاحفة



(سعد الخشن)

خشبية وليست درنية ، وينمو في الأماكن الرطبة وكذلك حقول الأرز ،
ومنه عدة أصناف .

وريزومات السعد الخشن أو السعد الطويل معروفة منذ أيام قدماء
المصريين ، وكانوا يقدرونها لرائحتها الطيبة . وقد ذكر ثيوفراستس أنها
إحدى مكونات العطر المقدس KYPHI ، الذي كان يتكون من ست
عشرة مادة ، ولعب هذا العطر دورا هاما في حياة المصريين الدينية
وأعيادهم واحتفالاتهم .

الأثر الطبي : ريزومات السعد الخشن معروفة في الطب الشعبي القديم والحديث
لرائحتها الطيبة ، وتستعمل في صناعة العطور ، كما تستعمل طبيا كمدررة
للبول وعلاج الروماتزم .

(١٧٠)

كرّم (عروق الصباغين)

الإسم الإنجليزي : Turmeric



(كرم)

- الاسم اللاتيني : *Curcuma longa* L.
الفصيلة : الزنجبارية *Zingiberaceae*
موطن النبات : الهند وجزر الهند الشرقية ، ويزرع في معظم البلاد العربية .
الوصف النباتي : نبات معمر يحمل أوراقا في مجموعات ، وأزهارا صفراء في سنابل غزيرة ، وللنبات ريزومات غليظة هي مصدر العقار ، ويجمع هذا العقار بين الصفات الطبية والتأبيلية .
الجزء الطبي : الريزومات ، وتعطى بعد تجفيفها وسحقها الكرم .
الجوهر الفعال : زيت ثابت يعرف بالتيرميرون *Termerol* ، ومادة ملونة تعرف بالكرمين (ك١٤ يد١٤ أ١٤) *Curcumin* .
الكرم كتابل : يستخدم في إعطاء نكهة للطعام ولتلوين الزيت والجبن والمخللات والمستردة وغيرها من المواد الغذائية ، وهو أحد العناصر الأساسية في الكاري .
يحضر من الكرم ورق يعرف بورق الكرم *Turmeric paper* وهو ورق مسامي غمر في صبغة الكرم ثم جفف ، ويستخدم في بعض الاختبارات الكيميائية .
يقول داود في الكرم إنه الزعفران ، وذكر فيه جميع ما ذكر عنه ، وجاء في كتاب الأدوية المفردة « إنه عروق صفري يؤتى بها من بلاد الهند ، يدخل في المراهم النافعة في الجرب وينشف القروح ويحد البصر ويذهب البياض من العين » .

(١٧١)

جزر (سفناري)

- الاسم الإنجليزي : Carrot
الاسم اللاتيني : *Daucus carota* L.
الفصيلة : الخيمية *Umbelliferae*
موطن النبات : لا يعرف موطنه الأصلي ولكنه يزرع في معظم البلاد العربية .
الوصف النباتي : نبات له جذر وتدى درني لونه برتقالي ، وهو ثنائي الحول ، وله أوراق مركبة ريشية وأزهار صغيرة بيضاء محمولة على نورات خيمية كبيرة .

كما تنتشر أصناف أخرى تتميز بألوان جذورها المختلفة ، مثل اللون الأحمر
D. C. var. *sativa* واللون الأصفر D. C. var. *Boissieri*



الجوهر الفعال : زيت طيار ، وفيتامينات ، ومادة البكتين ، وزيت قابضة . وهو غني
جدا بفيتامين (A) ومعتدل بفيتامين (B) .

الأثر الطبى : العلاج من الخارج :

— يعالج التسلخات الجلدية عند الأطفال ، بتليخها بالجزر المبشور
الطازج .

— لعلاج القروح التنتنة والتقيحات السرطانية ، بمزيج من عصارة الجزر

- ومسحوق الفحم الخشن .
العلاج من الداخل :
— معالجة السعال عند الأطفال بشراب الجزر ويعمل الشراب بطبخ
العصير مع السكر .
— قتل الديدان المعوية الشعرية عند الأطفال .
— يعالج الإسهال عند الأطفال ويقوى العظام .
— إدرار البول .
— الرشح وإصابات البرد والأنفلونزا والصداع .
— يخفض نسبة السكر في الدم .
وفي مصر يستعملون ثمار الجزر البلدى من قديم الزمان علاجاً لإدرار
البول وطاردا للغازات ، ولإزالة الحصى من الكلية والحالب ، كما تستعمل
الثمار لعلاج التهابات الكلى .
ومن الصنف الأحمر استخلصت مادة مرة من أجزاء النبات ، وخاصة
الثمار ، وهى مادة جلو كوسيدية (ك^{١٧} يد^{٢٥} أ^١) تسمى دو كوسين
Daucusin ويستعملها الصينيون ضد الإسهال وكطاردة للديدان .
ومن الصنف الأحمر البلدى استخلصت من الثمار كذلك مادة
جازارين Gazarin وهى مادة متبلورة لالون لها ، وهى غير موجودة فى
الصنف الأصفر .

(١٧٢)

قرنفل بستانى

- الاسم الإنجليزى : Carnation
الاسم اللاتينى : *Dianthus caryophyllus* L.
الفصيلة : القرنفلية *Caryophyllaceae*
موطن النبات : يزرع فى معظم البلاد العربية من أجل رائحته وجماله .
الوصف النباتى : عشب معمر (٣٠ — ٩٠ سم) يحمل أوراقا بسيطة متقابلة على عقد
متفتحة ، وأزهارا مفردة جميلة زكية الرائحة ، تختلف ألوانها حسب

الصف ، فهي حمراء ، وردية ، أو بيضاء .

الجزء الطبى : الأزهار .

الجوهر الفعال : زيت عطرى .

الأثر الطبى : تعتبر أزهار القرنفل مقوية للقلب ومعركة . وفى الصين يستخدم النبات

كله كطاردة للديدان . ومن الأنواع المنتشرة فى الحدائق فى البلاد العربية

Dianthus barbatus L. ويعرف بقرنفل الشعر ، و *D. Chinensis* ويعرف

بالقرنفل الصينى . كما تنمو بعض الأنواع برىا مثل :

D. strictus , *D. zonatus* , *D. sinaicus* فى بعض البلاد العربية

كالسعودية ، ولا يعرف تركيبها الكيمىائى وتحتاج إلى مزيد من الدراسة .

(١٧٣)

حشيشة الجبل (نشاش الذبان)

الاسم الإنجليزى : Fleabane

الاسم اللاتينى : *Erigeron canadensis* L. (*Conyza canadensis* L.)

الفصيلة : المركبة *Compositae*

موطن النبات : حوض البحر المتوسط ، غير أنه ينتشر إلى مناطق أبعد من ذلك ليشمل كل الدول العربية وأنحاء أخرى من العالم .

الوصف النباتى : عشب حولى ، يصل ارتفاعه إلى ١٥٠ سم ، سريع الانتشار ، ساقه قائمة ، وله أوراق جذرية وأخرى على الساق ، يحمل النبات الكثير من الأزهار التى تتجمع فى نورات هامية بيضاء إلى وردية اللون . وتنتشر البذور بواسطة الرياح لوجود خصلات شعرية عليها .

الجزء الطبى : الجذور والأوراق والأزهار .

الجوهر الفعال : فلافونات flavones وتانينات ، وزيت طيارة مثل الليمونين Limonine ، والديبينتين dipentine والتيربينول terpenol .

الأثر الطبى : تستخدم الأوراق والأزهار لعلاج أمراض الجهاز البولى والتناسلى ، ويحضر من الأوراق منقوع يستخدم للفرغرة لمعالجة التهابات الحلق ، ويستخرج من جذور النبات خلاصة لعلاج اضطرابات الدورة الشهرية

عند السيدات ، كما يقال إن للنبات تأثيرا ملحوظا في خفض نسبة السكر في الدم ، كذلك يقال إنه يقضى على بعض الآفات التي تصيب خلايا النحل .

كما يستخدم مسحوق البذور لطرد الحشرات ومادة لوقف النزيف ولوقف الإسهال . ويستخدم الزيت الذي يعرف باسم Erigeron oil ، المستخلص من النبات ، لعلاج الإسهال والنزيف الداخلى والالتهابات الصدرية والحراريج .

(١٧٤)

كافور (سرول — يوكالبتوس)

الاسم الإنجليزي : Blue gum (or) red gum

الاسم اللاتيني : *Eucalyptus camaldulensis* L.

E. rostrata L.

E. citreodora L.

الفصيلة : المرسينية *Myrtaceae*

موطن النبات : موطن الشجرة أستراليا ، وتزرع أشجار الكافور بكثرة في جميع البلاد العربية في الحدائق والطرق .

الوصف النباتي : شجرة عالية تحمل أوراقا بسيطة متبادلة دائمة الخضرة ، وأزهارا متجمعة فيما يشبه الخيمة ولكنها في الحقيقة نورة محدودة ، والثمرة علبة تفتح تفتح مسكنيا .

الجزء الطبي : الأوراق العطرية التي يستخلص منها الزيت .

الجوهر الفعال : الزيت الطيار الذي يحتوى على كيتون اليوكالبتول .

الأثر الطبي : يستعمل زيت الكافور المستخلص من الأوراق الجافة ، في علاج اضطرابات الأنف والحنجرة ، وفي علاج الملاريا وبعض الحميات الأخرى ، وزيت اليوكالبتول مادة مطهرة وتستخدم في علاج النزلات الشعبية .

يخلط الزيت بنسبة (١ : ١) مع زيت الزيتون لعلاج الآلام



(كافور)

الروماتزمية وكمهمم للحروق .
ويستخدم الزيت أحيانا لعلاج أمراض الجهاز الهضمي المزمنة
كالدوستاريا .
يدخل الزيت في صناعة أجود أنواع الصابون .

(١٧٥)

شمر (شمار)

الاسم الإنجليزى : Fennel

الاسم اللاتينى : *Foeniculum vulgare* Miller

الفصيلة : الخيمية *Umbelliferae*

موطن النبات : حوض البحر المتوسط ، وانتشر اليوم فى جميع أنحاء العالم . وقد استخدمه الصينيون والهندوس وقدماء المصريين ، وزرعه الرومان لثماره العطرية .
الوصف النباتى : الشمر نبات حولى طويل ذو أوراق مركبة ، مجزأة تجزئاً دقيقاً ، الأزهار صفراء محمولة على نورات خيمية مركبة . وسوقه وأوراقه هى التى تؤكل ، وثماره بيضوية يميل لونها للاصفرار أو البنى المصفر .
الجزء الطبى : الثمار والجذور والأوراق .

الجوهر الفعّال : زيت طيار يحتوى على حوالى ٦٠٪ أنيثول (ك. ١٠٠ يد ١٢٠) Anethol
وعلى حوالى ١٧٪ كيتون آخر يعرف بالفنشون (ك. ١٠٠ يد ١٢٠)
Fenchone ، وعلى بعض الصنوبريين ————— (ك. ١٠٠ يد ١٢٠) Pinene
والأبين Apiin .

الأثر الطبى : من الخارج :

- (١) مغلى مسحوق الجذور للفرغرة فى حالات التهاب الفم .
- (٢) غسيل للعيون عند التهابها .
- (٣) أوراق الشمر الغضة لمعالجة التسلخات فى الأعضاء التناسلية والثدين .
- من الداخل :
- يستخدم مغلى الشمر كشراب ، لما ثبت له من فوائد عديدة ، منها :
- (١) يذر اللبن عند المرضعات .
- (٢) لمعالجة التهابات الجلدية .
- (٣) لمعالجة النزلات الشعبية والسعال والربو .
- (٤) فى حالات سوء الهضم فى المعدة ، حيث إنه شراب مدق طارد .
- (٥) لعلاج التهابات الجهاز البولى والكلى والمثانة .

- (٦) يفيد كثيرا كمسكن معوى .
(٧) يضاف إلى المركبات المسهلة ، لمنع المغص ولتحسين رائحتها وطعمها .
الشمر كتابل : يستعمل زيت الشمر فى صناعة الحلوى وعمل العطور والصابون .
ويضاف أحيانا إلى بعض المحاليل العطرية والمشروبات الروحية .
جاء فى تذكرة داود ما يأتى :

« الشمر عطرى الرائحة ينفع فى الخفقان وفى السعال والربو وعسر النفس ويحلل الأرياح ويصلح المعدة ويدبر البول والحيض وينقى المثانة والأخلاط اللزجة ويفتت الحصى ويزيل الحميات والفواق والصداع وغرقه يمنع انتشار القروح » .

(١٧٦)

ياسمين

الاسم الإنجليزى : Jasmine

الاسم اللاتينى : *Jasminum grandiflorum* L.

الفصيلة : الزيتونية *Oleaceae*

موطن النبات : يزرع الياسمين فى كل الأقطار العربية . عرفه الفراعنة باسم (أسمين) ، ثم حرفت إلى ياسمين . وقد وجدت أكاليل من زهور الياسمين على رؤوس وحول أعناق بعض ملوك وملكات الفراعنة فى معبدى الدير البحرى وهواره .

الوصف النباتى : نبات متسلق ، له أوراق مركبة ريشية متقابلة ، وأزهار بيضاء عطرة ، محمولة على نورات محدودة ذات شعبتين .

الجزء الطبى والتابلى : الأزهار .

الجوهر الفعال : زيت طيار يستخلص من الأزهار ، تختلف نسبته فى الأزهار تبعا لدرجة تفتحها وتبعا لساعات النهار ، فيقل كلما زادت درجة حرارة الجو ، ولذلك تجمع الأزهار قبل شروق الشمس .

الياسمين كتابل : تدخل منتجات الياسمين (دهنه وزيته) فى تحضير كثير من المركبات



(ياسمين)

العطرية والروائح الفاخرة . ويستخلص دهن الياسمين عادة بإحدى
طريقتين ؛ الأولى طريقة الدهن ، بأن تنثر الأزهار على صفائح تحمل طبقة
من الدهن فيمتص الدهن ما بها من زيت طيار ، وتكرر العملية حتى
يتشبع الدهن بالزيت ثم يستخلص الزيت بالكحول . أما الطريقة الثانية ،
فهى الاستخلاص بالمذيبات العضوية مثل إيثر البترول .
يتكاثر الياسمين بالعقل وبالترقيد ، والعقلة أفضل وأوفر محصولا .

(١٧٧)

عرعر (سرو جبلى — عرعار)

الاسم الإنجليزى : Juniper

الاسم اللاتينى : *Juniperus communis* L.

الفصيلة : السروية Cupressaceae



(عرعر)

موطن النبات : آسيا وغرب أوروبا . ويوجد في السعودية والسودان وشمال أفريقيا وبلاد الشام .

الوصف النباتي : العرعر شجرة صغيرة ذات أوراق إبرية دائمة الخضرة ، ولها ثمرة شبه لبية تتكون من الحراشيف اللحمية المتناسكة ، والثمرة ذات لب حلو ورائحة مميزة وهي قرمزية اللون ذات عنق يميل للخضرة .

الجزء الطبي : الأوراق والثمار .

الجوهر الفعال : تحتوى الثمار على زيت طيار هو زيت السدر أو العرعر ويستخلص عادة من النوع *Juniperus virginiana* وأنواع أخرى .

الأثر الطبي : مغلى الأوراق يستعمل ضد الإسهال عند الأطفال . أما مسحوق الأوراق الجاف فيستعمل لعلاج التهابات الجلدية عند الأطفال ، كما يستعمل لتوسيع القنوات البولية . وفي أمريكا تستخدم ثمار العرعر لعلاج الدوستاريا . ويحضر من خشب نبات العرعر ، بواسطة التقطير الإتلافي ، الزيت المعروف باسم زيت الكاد Cade oil ، ويستعمل بكثرة في الطب البيطري في علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وجرب المواشي .

العرعر كتابلي : تستعمل الثمار اللبية للعرعر كمادة معطرة وفي تطيب الطيور واللحوم المختلفة عند طهيها ، ويستخدم الزيت الطيار في إعطاء الجبن نكهة لطيفة . ويتركب زيت العرعر من مواد تربينية Terpenes وعند تبريد الزيت ترسب مادة بلورية تسمى كافور العرعر *Juniper camphor* .

(١٧٨)

غار

الاسم الإنجليزي : Laurel

الاسم اللاتيني : *Laurus nobilis* L.

الفصيلة : الغارية *Lauraceae*

موطن النبات : شمال أفريقيا من ليبيا حتى المغرب .



(غار)

الوصف النباتي : شجرة دائمة الخضرة ، أوراقها بسيطة يضاوية عطرة ، وأزهارها بيضاء ، والثمار داكنة اللون .

الجزء الطبى : الأوراق .

الجوهر الفعال : زيت الغار الطيار ، وزيت آخر غير طيار .

الأثر الطبى : كان النبات يستخدم فى الطب لعلاج الهستيريا ، وكدهان لعلاج

الروماتيزم من مسحوق الأوراق . وزيت الغار طارد للحشرات ، وفى الطب البيطرى تستخدم الأوراق لعلاج الطفيليات التى تصيب الجلد .

الغار كتابل : تستعمل الأوراق فى عمل الحساء ومنتجات الطبى الأخرى . وتستعمل

أوراق الغار بكثرة في الطهي لتحسين طعم المأكولات . كما يستعمل الزيت في صناعة الصابون أو كطارد للحشرات ، إذ يضاف إلى عبوات العرقسوس فيمنع إصابته بالحشرات ، كما يضاف إلى اللحوم والأسماك المحفوظة أو المطبوخة فيحسن من طعمها .

(١٧٩)

خزامى (خزام — لوندة)



(خزامى)

الاسم الإنجليزي : Lavander

الاسم اللاتيني : *Lavandula multifida* L.

الفصيلة : الشفوية *Labiatae*

موطن النبات : جزر المحيط الأطلسي ، و ينتشر الآن في جميع مناطق حوض البحر المتوسط والسودان والصومال وشبه الجزيرة العربية .

الوصف النباتي : شجيرة قصيرة ، معمرة ، يصل ارتفاعها إلى متر تقريبا ، ساقها صلبة ومضلعة ، كثيرة التفرع . الأوراق عميقة التفصص ، وتغطيتها شعيرات . أزهارها زرقاء بنفسجية اللون ، تتجمع في نورات سنبلية تحملها سوق طويلة . البذور ملساء ، بنية اللون .

الجزء الطبي : السنبال الزهرية .

الجوهر الفعال : الزيت العطري ، الذي يحتوى على اللينالول *Linalol* والجيرانيلول *Geraniol* ، والكاريوفيلين *Caryophyllene* وغيرها من المركبات .

الأثر الطبي : تستخدم الأزهار كمدررة للبول ولإزالة الانقباض ، كما أنها مسكنة وتستعمل لعلاج آلام المعدة .

وتوجد تحت جنس الخزامى عدة أنواع في العالم العربي ، منها : *L. angustefolia* ، *L. officinale* ومن هذه الأنواع كلها وغيرها يستخلص ماء اللوندة ، أو اللاونطة ، كما يسمى في بعض البلاد العربية ، وهو خليط من الزيت والماء والكحول ، وهو أحد المستحضرات المعروفة باستعمالها في الزينة . وقد استخدم العرب النبات — إلى جانب ما ذكر سابقا — في طرد الحشرات . لذلك فإنه يعبا في أكياس صغيرة ويوضع في خزائن الملابس .

(١٨٠)

حارة (رشاد — حب رشاد — حرا)

الاسم الإنجليزي : Pepper cress

الاسم اللاتيني : *Lepidium sativum* L.

الفصيلة : الصليبية *Cruciferae*

- موطن النبات : ليبيا ، مصر ، السودان والسعودية .
الوصف النباتي : عشب حولي يحمل أوراقا متغيرة ، فهي إما كاملة أو مفصصة أو مركبة ،
والأزهار صغيرة بيضاء ، والثمرة خردلة مستديرة صغيرة . والبذور
بيضاوية مبطة حمراء اللون .
الجزء الطبي : النبات والبذور .
الجوهر الفعال : زيت طيار يعرف باسم Cress oil وجلوكوسيد Glycotropeolin ،
وتحتوي البذور على يود وحديد وفوسفات .
الأثر الطبي : البذور (حب الرشاد) تستخدم لعلاج الأزمة Asthma الربوية والكحة
وطارد للبلغم ، والأوراق كملين خفيف .

(١٨١)

الروية

- الاسم اللاتيني : *Marrubium vulgare* L.
الفصيلة : الشفوية Lamiaceae
موطن النبات : ينتشر النبات في أغلب مناطق شمال أفريقيا والشام والعراق .
الوصف النباتي : نبات معمر ، ينمو في الأماكن المهجورة والتي تكثر فيها المواد الدبالية ،
يصل ارتفاعه إلى ٦٠ سم تقريبا . الساق متفرعة تغطيها طبقة وبرية
كثيفة ، الأوراق مستديرة إلى بيضية مستديرة معنقة ، سطحها كثير
التجاعيد وتغطيها طبقة وبرية تكون أكثر كثافة على السطح السفلي ،
الأزهار صغيرة بيضاء ، تتجمع في نورات هامية ، ويتميز الكأس بوجود
عشرة أشواك على حافته .
الجزء الطبي : كل الأجزاء الخضرية من النبات .
الجوهر الفعال : يحتوي النبات على مادة المرويين Marrubiin والتانين Tannin والريسين
resin وزيت طيار وفيتامين (C) .
الأثر الطبي : يستعمل النبات في خفض نسبة السكر في الدم ، وعلاج آلام المفاصل ،
والسعال ، غير أن زيادة الجرعة الدوائية من هذا النبات قد تسبب
الإسهال .



(روية)

(١٨٢)

نعناع (فلفلي)

الاسم الإنجليزي : Peppermint

الاسم اللاتيني : *Mentha piperita* L.

الفصيلة : الشفوية Labiatae

موطن النبات : ينمو في كل البلاد العربية ، إما برياً أو منزرعاً . وينمو برياً في الأماكن المعتدلة بأوروبا ، وكان أحد المحاصيل الهامة في أمريكا .

(النباتات الطبية والعطرية)

الوصف النباتي : عشب معمر عطري ، يحمل أوراقا بسيطة ، متقابلة ، وأزهارا صغيرة في نورات هامية لونها بنفسجي خفيف .

الجزء الطبي والتأبلي : الأوراق قبل ظهور الأزهار ، والقمم الزهرية الجافة .

الجوهر الفعال : زيت طيار (زيت النعناع) يقطر من الأوراق والأغصان الرفيعة ، والرؤوس المزهرة ، وأهم المركبات التي يحتويها هي المثنول (ك. ١٠ يد. ١٢)
Menthol وقليل من الليمونين (ك. ١٠ يد. ١٤) ، والصنوبرين (ك. ١٠ يد. ١٦) ، واليوكاليبتول (ك. ١٠ يد. ١٨) ، وحامض التانيك (ك. ١٤ يد. ١٠) والمركب الأخير هو المصدر الفعال القابض للنعناع .
ومستحضرات النعناع في التجارة على ثلاثة أنواع :

١ — ماء النعناع ، ويحضر بتقطير النعناع في الماء .

٢ — زيت النعناع ، ويحضر بتقطير الرؤوس الزهرية .

٣ — روح النعناع ، ويحضر بإضافة جزء من الزيت إلى تسعة أجزاء من الكحول (٩٠ ٪) .

الأثر الطبي : من الداخل :

يعتبر مستحلب النعناع من أنجع الأدوية لعلاج الاضطرابات المرارية والمعوية ، وطررد الغازات ، وهو مدر للصفرء ، ومضاد للالتهابات .
من الخارج :

— يعالج التهاب الثدي بوضع لبخة من أوراق النعناع ولباب الخبز والخل .

— تسكين الآلام العضلية بوضع كيس من الشاش مملوء بأوراق النعناع بعد تسخينه ووضعه على موضع الألم .

— يعالج الزكام عند الأطفال باستنشاق بخار الأوراق الموضوعة فوق الموقد .

أما النعناع البلدي وهو *Mentha viridis* L. فهو معروف في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم ، ويختلف عن النعناع الفلفلي بساقه الأخضر وأوراقه الجالسة غير المعنقة ، وأزهاره الزرقاء ، ويستخرج منه أيضا زيت طيار « زيت النعناع » ويحتوى على كارفون Carvone الليمونين ، ويستخدم إلى جانب استخدامه كالتشاي في علاج الانتفاخ والمغص ، وفي

تحسين طعم المأكولات والحلوى .
النعناع كتابل : يضاف النعناع إلى الكثير من أنواع الحلوى لإكسابها تلك النكهة



(نعناع)

المميزة ، وتنبيه الجهاز الهضمي . ولزيت النعناع بعض الخواص المطهرة ،
ولذلك يدخل في تحضير معاجين الأسنان وصناعة الصابون .

وقد ذكر داود عن النعناع ما يلي :

« النعناع الحاد الرائحة عطري يمنع الغثيان وأوجاع المعدة والمغص والرياح
الغليظة ، ويذهب الحميات والنقرس والنسا والحكة والجرب طلاء وشربا ،

وينفع من الجذام وأوجاع المفاصل والطحال شرباً ، والديدان بالعسل والخل ،
وشربه بالسكر قاطع لأنواع الصداع وضعف الدماغ وينقى الصدر من جميع
الأمراض .

(١٨٣)

منها (فلية ، فوتنج)

الاسم الإنجليزي : Spearmint

الاسم اللاتيني : *Mentha spicata* L.

الفصيلة : الشفوية Labiatae

موطن النبات : موطنه أوروبا ، وهو منتشر في الولايات المتحدة ، ويزرع اليوم في كثير
من البلاد العربية .

الوصف النباتي : عشب صغير عطري قائم ، يصل ارتفاعه إلى ٦٠ سم أو أكثر ، تنشأ
الأفرع الهوائية عن ساق زاحفة ممتدة في التربة . الأوراق جالسة أو شبه
جالسة ، بيضية إلى مستطيلة وحافتها مسننة ، الأزهار في نورة سنبلية
نخيلة ، وهي صغيرة زرقاء إلى بنفسجية اللون وامتلكها بارزة .



(منها)

- الجزء الطبي : الأوراق الخضراء المجففة .
الجوهر الفعال : زيت طيار يوجد في الأوراق Carvone
المنتها كتابلي : تستخدم الأوراق في صلصة المنتها وفي الهلام ولتطيب الحساء ، والأطعمة
المطبوخة والمشروبات ، وتستخدم أيضا في عطر العلك ومعجون
الأسنان والحلوى .
الأثر الطبي : للزيت فوائد طبية ، حيث يدخل ضمن مكونات الدهانات الطبية ، لأنه
مضاد للالتهابات ، ولكن فائدته الرئيسية تكمن في كونه طاردا
للحشرات ، ويشبه النبات النعناع ولكن أوراقه أطول وأكثر تدبيا .
ويوجد كثير من الأنواع التابعة للجنس *Mentha* تنمو بسواحل البحر
المتوسط ، منها : *M. pulgium*, *M. aquatica*, *Mentha longifolia*
وكلها عطرية . والنوع الأول ويسمونه الحبق ، وفي الريف يستخدمون
مغلي أوراقه كطارد للديدان واسمه الطبي *Herba equal* ، والنوع الثاني
ويسمونه حبق الماء ، أو حبق التمساح ، ويوجد عادة بجوار الماء وفي
الأراضي الرطبة ، ويستخدم أيضا ضد المغص ومدرا للصفراء . أما
الزيت فيستخدم لإزالة الحصى من المثانة والكلى ويوضع الزيت في
الكحول لتنبيه القلب والجهاز العصبي .

(١٨٤)

مرسين (شجرة السكر)

- الاسم الإنجليزي : Myrtle
الاسم اللاتيني : *Myrtus communis* L
الفصيلة : المرسينية *Myrtaceae*
موطن النبات : حوض البحر المتوسط .
الوصف النباتي : شجيرة دائمة الخضرة ، لها أوراق لامعة خضراء وأزهار بيضاء عطرية ،
والثمار لبية زرقاء .
الجزء الطبي والتأبلي : الأوراق والأزهار والقلف .
الجوهر الفعال : زيت طيار .

الأثر الطبى : استعمال الزيت فى الطب قديما ضد الإسهال والصداع ويقال إنه يساعد على خفض نسبة السكر فى الدم .
المرسين كتابل : تستعمل الأوراق والأزهار فى تحضير غسيل للشعر وعمل مستحضرات الزينة .
قدس الرومان الزهرة وهى عند اليونان رمز النصر ويسمى فى الجزائر



(مرسين)

ح داود) . ويضاف زيت المرسين إلى الماء ويسمى Eau d'ange

(١٨٥)

ريحان (حبق)

الاسم الإنجليزي : Basil

الاسم اللاتيني : *Ocimum basilicum* L.

(*Ocimum killimandsc haricum* الريحان الكافورى)

الفصيلة : الشفوية *Labiatae*

موطن النبات : الهند ، ويزرع فى جميع البلاد العربية .

الوصف النباتى : نبات الريحان شجيرى صغير ، يزرع فى الحدائق كنبات زينة ، والنبات مغطى بزغب ناعم ، والأوراق بسيطة معنقة يضاوية ، حافتها كاملة ، وأزهارها متجمعة فى نورات مكتظة ، والأزهار بيضاء أو محمرة قليلا . وقد عرفه الفراعنة باسم (ست) ، واليمنيون باسم (الحالى) ، أو شجرة الرعاف ، وفى الجزيرة العربية باسم (حوك) .



(ريحان)

الجزء الطبى : الأوراق ، الأزهار والبذور .
الجوهر الفعال : يحتوى زيت الريحان الحلو على الأوسيميسن Ocimene ، كما يحتوى زيت الريحان الكافورى على مادة الكافور Camphor ، وزيت الريحان الحلو سائل أبيض اللون له رائحة زكية مميزة . أما زيت الريحان الكافورى فهو سائل أصفر اللون له رائحة الكافور .

الأثر الطبى : يستعمل الزيت الطيار الذهبى الحلو فى العطور ، وفى المشروبات المختلفة وفى الأطعمة المطبوخة والصلصات ، كما يستعمل منقوع الأزهار والأوراق كطارد للغازات فيزيل المغص المعوى ، كما أنه مدر للبول . أما مغلى البذور فى الماء فيستعمل فى علاج الدوسنتاريا . وفى الهند يستعمل لعلاج الإسهال المزمن .

أما الريحان الكافورى فتستعمل عجينة أوراقه فى علاج بعض الأمراض الجلدية . أما الزيت المميز بوجود مادة الكافور ، فهو الذى يستعمل طبيا ، حيث يدخل فى التركيبات الخاصة بالروماتزم ، ونزلات البرد ، وفى علاج الكدمات ، والتهاب المفاصل ، حيث يحتوى الزيت بجانب مادة الكافور على اللينالول ، واليوجينول ، وسينامات الميثيل . وقد أثبت التجارب أن تخفيف العشب ، ثم استخلاص الزيت منه ، يعطى زيتا به مكونات أخرى كثيرة مثل البورنيول Borneol .

(١٨٦)

مردقوش (بردقوش — بردقوشة)

الاسم الإنجليزى : Majoram (Origanum)

الاسم اللاتينى : Origanum vulgare L. (Majorana hortensis)

الفصيلة : الشفوية Labiatae

موطن النبات : حوض البحر المتوسط من مصر حتى المغرب .

الوصف النباتى : عشب عطري ، ساقه مربع ، وأوراقه بسيطة متقابلة خضراء داكنة ، والأزهار صغيرة بيضاء أو حمراء . والاسم مشتق من الكلمة الفارسية « مرزنجوش » ومعناها « أذن الفار » نسبة لشكل الورقة .



(بردقوش)

- الجزء الطبى : الأوراق والأزهار والسوق الدقيقة .
الجوهر الفعال : زيت طيار .
المردقوش كتابل : يستعمل لتطيب الحساء والأطعمة المطبوخة والصلصات ، ويستخدم الزيت الطيار فى صناعة الصابون ، وفى صناعة بعض أنواع الجبن ، وتستخدم أوراقه الجافة كبديل للشاى .
الأثر الطبى : يستعمل الزيت الناتج من تقطير البردقوش بالبخار فى علاج المفاصل وأورام الروماتزم ، أما منقوعه فيستعمل كدواء مهدئ ومصلح للمعدة وطارد للأرياح والغازات .

وأهم فوائد البردقوش استعمال نقيعه المغلى لتنظيم الدورة الشهرية لدى النساء اللاتي يعانين من عدم انتظامها .
وفي مصر الآن تجارة ناشئة لتصدير أوراق المردقوش إلى أوروبا وخاصة ألمانيا وإنجلترا ، حيث ثبت أن البردقوش المصرى يمتاز عن الفرنسى فى ارتفاع نسبة الزيت ونقاوته .
ولقد عرف البردقوش المصريون القدماء ، وعثر عليه فى إحدى المقابر المصرية بهوارة .

(١٨٧)

العطر (العطر العربى)

الاسم الإنجليزى : Rose Geranium

الاسم اللاتينى : *Pelargonium odoratissimum* (L.) soland

الفصيلة : العنبرية Geraniaceae

موطن النبات : شمال أفريقيا وجنوب أوروبا ، ويزرع الآن فى أغلب البلاد العربية .
الوصف النباتى : يسمى بالعطر العربى تميزا له عن الأنواع الأخرى منه ، مثل العطر الإيطالى .

والعطر العربى له أوراق راحية مفصصة وخشنة الملمس ، تغطى بشعيرات دقيقة ، الأوراق والسيقان الخضراء لها رائحة مميزة . يزهر النبات فى فصل الربيع أزهارا صغيرة الحجم ، تتجمع فى نورة خيمية الشكل . ويتكاثر النبات تكاثرا خضرىا عن طريق عقل الساق .

الجزء الطبى : الأوراق والأفرع الغضة .

الجوهر الفعال : يحتوى ماء العطر المكثف على كحول الجيرانيول Geraniol وكحول السترونيلول Citronellol .

الأثر الطبى : يستعمل ماء العطر كملطف لدرجة حرارة الجسم ، عند الإصابة بالحميات ، أو عند الشعور بالعطش ، وذلك بشربه مخففا أو رشه على فروة الرأس والجبين .

ويستعمل الزيت فى تحضير العطور وصناعة الصابون ومساحيق الزينة .



(عطر)

(١٨٨)


بقدونس (مقدونس — معدنوس)

الاسم الإنجليزي : Parsley

الاسم اللاتيني : *Petroselinum sativum* Hoffm (*P. crispum*)

الفصيلة : Umbelliferae

موطن النبات : ينتشر في معظم البلاد العربية كنبات منزرع .



(بقدونس)

الوصف النباتي : عشب ثنائي الحول أو معمّر قليلا ، ويتّجّ في أول سنة حزمة غزيرة من الأوراق الداكنة ، المركبة والمجزأة تجزيئاً دقيقاً ؛ والأزهار صغيرة متجمعة في نورات خيمية وهي صفراء أو خضراء ، والثمار بيضاوية عريضة .
الجزء الطبّي : الجذور والأوراق والبذور .

الجوهر الفعّال : زيت طيار مع مادة الأنثول ، وزيت البذور الذي يحتوى على الأبيول Apiole . والنبات غني جداً بفيتامين (A) و (C) ، وكذلك عنصر الحديد .

الأثر الطبى : من الخارج :

يعالج التمش وما شابه ذلك . يغسل الوجه بمغلى الأوراق والجذور ، أو يدلك الجلد بأوراق البقدونس المهروسة ، كما يعالج التواء المفاصل بوضع أوراق البقدونس المهروسة حول المفصل المصاب . ويساعد على الشفاء من بعض أمراض الكبد . كما يساعد على انتظام عملية الهضم ويعادل الحموضة في المعدة .

من الداخلى :

شراب البقدونس يعالج المغص ، ويساعد على إدرار البول ، ويفضل استعمال مغلى البذور فى حالات احتباسه .
البقدونس كتابل : تستعمل الأوراق لتزيين الطعام وتطيب الحساء . وفى بعض أنحاء أوروبا تطبخ أطراف النباتات وتسلق جذورها .

(١٨٩)

ينسون (أنيسون)

الاسم الإنجليزى : Aniseed

الاسم اللاتينى : Pimpinella anisum L.

الفصيلة : الخيمية Umbelliferae

موطن النبات : موطنه حوض البحر المتوسط ، وحاليا يزرع اليوم فى معظم البلاد العربية .

الوصف النباتى : نبات عشبي حولى ، يحمل أوراقا مركبة مفصصة ، وللورقة غمد عند القاعدة يغلف الساق . ومن الصفات التشريحية وجود قنوات تحوى زيتا طيارا بجميع أعضاء النبات .

والأزهار صغيرة تحمل فى نورات خيمية ، والثمرة منشقة تنقسم إلى ثمرتين ، وعلى كل ثمرة توجد بروزات أو أضلاع ظاهرة ، وعلى هذه الأضلاع توجد أشواك .

الجزء الطبى : الثمار ومنها يستخرج الزيت .

الجوهر الفعال : كيتون يعرف بالأنيثول (ك . يد ١٠٠) Anethol ، والصنوبرين



(ينسون)

(ك. ١٠ يد ١٦) Pinene ، والليمونين (ك. ١٠ يد ١٤) Limonine

والزعفرول (ك. ١٠ يد ٢١) Safrol

الأثر الطبى : من الخارج :

يستعمل زيت الينسون فى صناعة السوائل ومعاجين الأسنان .

من الداخل :

١ — مغلى الثار فى الماء (المشروب) لمداداة المغص وإزالة الانتفاخ لأنه يساعد على الهضم .

٢ — يدخل الينسون فى تركيب كثير من أدوية السعال ، والأقراص التى تستخدم لتخفيف آلام الحلق والتهاب اللوز .

٣ — يفيد الينسون فى معالجة نوبات البرد ، كما أنه يزيل الصداع .

٤ — يدر الطمث (الحيض) ، ويقوى الطلق أثناء الولادة ويسهلها ، وكذلك يزيد من إدرار اللبن عند المرضعات .

جاء في رسالة داود ما يأتي :

« الأنيسون نبات عطري يحل النفخ والرياح ويزيل الصداع وأوجاع الصدر وضيق النفس والسعال والحصى وضعف الكلى والطحال ويدبر الفضلات ، ومضغه يذهب الخفقان ، إذا طبخ بالخل حلل الأورام طلاء ، وطبخه بالسكر يزيل الصفار العارض في الوجه » .

الينسون كتابل : يستعمل في إعطاء نكهة للفظائر والكاري والحلوى ، كما يستعمل في صناعة الصابون والعطور وأغراض الزينة والمشروبات .

وقد عرفه قدماء المصريين وكانوا يطلقون عليه اسم « نيكون » ويستعمل الينسون لعلاج الأرق .

ومن الجنس *Pimpinella* ينمو برياً بعض الأنواع مثل *P. Schweinfurthii* ، *P. cretica* في مصر والسعودية ، وهي تحتاج إلى مزيد من البحث لمعرفة مكوناتها .

(١٩٠)

مستكى (البطوم)



(مستكى)

- الاسم اللاتيني : *Pistacia atlantica* Desf.
الفصيلة : *Anacardiaceae* الأنكاردية
موطن النبات : شمال غرب أفريقيا ، وتزرع أو تنمو برياً في بعض البلاد العربية .
الوصف النباتي : أشجار يصل ارتفاعها إلى ١٥ متراً ، لها ساق خشبية سميكة لونها بني فاتح ، الأوراق متساقطة ، مركبة . والأزهار صغيرة وفي مجموعات .
الثمار كروية الشكل ألوانها تتراوح بين الأحمر والأخضر .
الجزء الطبي : الأفرع والأوراق الغضة (حديثة التكوين) .
الجوهر الفعال : يحتوي النبات على مادة التانين Tanin الدابغة ، كما يحتوي على مادة صمغية تشبه مادة اللبان Mastic ، وتوجد في الأوراق مواد بلسمية مسكنة وملطفة Balsamic .
الأثر الطبي : تستعمل الأوراق في حالة الإصابات البكتيرية المعدية التي تكون مصحوبة بإسهال حاد .
كما أن منقوع الأوراق يفيد في حالة المغص الكلوي .

(١٩١)

ياسمين هندي

- الاسم الإنجليزي : Indian Jasmine
الاسم اللاتيني : *Plumeria acutifolia* L.
الفصيلة : *Apocynaceae* الدفلية
موطن النبات : يزرع في معظم البلاد العربية .
الوصف النباتي : شجرة صغيرة ، نصف متساقطة الأوراق ، تحمل أزهاراً صفراء أو بيضاء أو وردية إلى أرجوانية ، رائحتها عطرية جذابة ، لها ثمار جرابية ، والبذور مجنحة . انتشرت زراعتها في البلاد العربية من أجل الزينة وتسمى في الهند (شجرة الحياة) أو (شجرة المعبد) .
الجزء الطبي : الأزهار واللبن النباتي وقلف الجذور .
الجوهر الفعال : زيت يستخلص من الأزهار وكذلك اللبن النباتي ، وقد اكتشف أهميته العالم الإنجليزي Henery Bates .



(ياسمين هندي)

الأثر الطبى : يفيد الزيت فى تفريغ الصديد من الدمامل ، وفى التخلص من الحشرات الماصة للدماء .
أما قلف الجذور فيستخدم كمسهل قوى ، ويستخدم اللبن النباتى فى علاج آلام الأسنان ، كما يستخدم الزيت الطيار فى صناعة العطور .

(١٩٢)

ورد

الاسم الإنجليزي : Roses

الاسم اللاتيني : Rosa sp L.

الفصيلة : الوردية Rosaceae

موطن النبات : يوجد في كل البلاد العربية .



الوصف النباتي : شجيرة متساقطة الأوراق ، تغطي سوقها أشواك حادة صلبة ، وأوراق الورد مركبة ريشية أحادية ، فردية الطرف ، ولها أذينات ظاهرة تلتحم بعنق الورقة ، والأزهار مفردة كبيرة الحجم تختلف ألوانها حسب نوع النبات فمنها الأحمر والأصفر والأبيض والوردي والبنفسجي ، وجميع درجات هذه الألوان ، والثمار فقيرة .

الجزء الطبي : البتلات .

الجوهر الفعال : زيت طيار يحتوي على هيدروكربون متبلور يعرف Rose camphor .
والزيت عديم اللون ولكنه يتدرج مع الوقت إلى اللون الأصفر أو الأخضر .

الأثر الطبي : يستخرج بالتقطير من بتلاته ماء الورد وعطر الورد الذي يدخل في صناعة العطور ومستحضرات التجميل وإعطاء نكهة لكثير من المأكولات .
والزيت والماء مهدئ للأعصاب .

ومن أزهار الورد يصنع شراب الورد ومرى الورد .
ولقد عرف المصريون القدماء الورد باسم « ورتو » ، وكان النوع المعروف لديهم هو *Rosa sancta* ، أما العرب فعرفوه باسم (الجبل) وعرفوا الأحمر منه باسم (الحوجم) ، والأبيض باسم (الوتيرة) .

(١٩٣)

حصابان (كليل أو إكليل)

الاسم العلمي : *Rosmarinus officinalis* L.

الفصيلة : الشفوية *Labiatae*

موطن النبات : منطقة البحر المتوسط .

الوصف النباتي : نبات شجيري ، معمر دائم الخضرة ، يبلغ ارتفاعه من ١ إلى ٢ متر ، أوراقه صغيرة إبرية الشكل تقريبا وتشبه الأشواك ، سطحها العلوي أخضر غامق ، والسطح السفلي مكسو بشعيرات بيضاء دقيقة ، وتخرج الأوراق من الساق في مجموعات ، تتكون كل مجموعة من ثلاث



(حمصا لبان)

ورقات ، وهذه المجاميع متقابلة على السيقان ، والأوراق تخرج منها رائحة عطرية عند فركها أو حرقها ، الأزهار لونها بنفسجي يميل إلى الزرقة ، أو البنفسجي الخفيف .

الجزء الطبى : الأوراق والأزهار .

الجوهر الفعال : يحتوى النبات على زيت طيار يتركب من المواد التالية :

الترينينات Terpenes ، بورنيول Borneol ، سينول Cineol .

الأثر الطبى : يستعمل مستحلب أوراق النبات لتنظيف بشرة الوجه ومعالجة العيون

المصابة بالرمد الربيعى ، وذلك بوضع كمادات دافئة منه على العين .

كما يستعمل مغلى الأوراق لشفاء الكحة ، وعند خلطه بزيت الزيتون

يستعمل لالتئام الجروح ، كما أن المستحلب يستخدم للغرغرة وكمطهر

للفم ، وزيت النبات طارد للغازات ومسكن للمغص . ويعتبر النبات من

التوابل التى تضاف إلى كثير من المأكولات لتحسين طعمها وفتح

للشهية ، إلى جانب ذلك فإن الزيت يستعمل ضمن مستحضرات الزينة

وصناعة الصابون .

(١٩٤)

رعلة (بشارى ، شجرة الغزال)

الاسم الإنجليزى : Egyptian Sage

الاسم اللاتينى : *Salvia aegyptiaca* L.

الفصيلة : الشفوية *Labiatae*

موطن النبات : مصر — ليبيا — فلسطين — السعودية — قطر — الكويت — الأردن — العراق — البحرين والسودان .

الوصف النباتى : شجيرة صغيرة مغطاة بوبر أبيض ، والأوراق بسيطة مسننة ، والأزهار إبطية شفوية بيضاء بنفسجية اللون أو زرقاء .

الجزء المستعمل : البذور والزيت الطيار المستخرج .

الجوهر الفعال : زيت طيار وجلوكوسيد ومادة مرة .

الأثر الطبى : يستخدم النبات لعلاج الإسهال والبواسير والزهرى ، وبعض أمراض العيون .



(رعلة)

مريمية (شاي الجبل — شاي درنة — تفاح الشاهي)

الاسم الإنجليزي : Sage

الاسم اللاتيني : *Salvia officinalis* L.

الفصيلة : الشفوية Labiatae

موطن النبات : شمال أفريقيا والشام .

الوصف النباتي : شجيرة صغيرة تنمو تحت الأشجار والأماكن الظليلة ، تحمل أوراقا بسيطة ، متقابلة تغطيها طبقة وهرية . الأزهار بنفسجية تحمل في نورات طرفية مركبة . وللنبات رائحة زكية عطرية مميزة .

الجزء الطبي : النبات كله .

الجوهر الفعال : يحتوي زيت المريمية على كثير من المواد مثل هيدروكسيد الترئين Terpene hydroxide ، ومرسين وسيمين . كما يحتوي النبات على التانين



(مريمية)

ومواد مرة Picrosalvin .

الأثر الطبى : مغلى النبات يستخدم لعلاج اضطراب الأعصاب والدوخة ولوقف العرق .

ويستعمل النبات كتابل نافع فى حشو الدواجن واللحوم والسجق ، وفى شمال شرق ليبيا يضاف إلى مغلى أوراق الشاى ويعمل منه شراب .

(١٩٦)

جعدة (جعيدة)

الاسم الإنجليزى : Mountain germander

الاسم اللاتينى : *Teucrium polium* L.

الفصيلة الشفوية : Labiatae

موطن النبات : حوض البحر المتوسط وكذلك الإمارات وقطر وفلسطين والعراق والسعودية والبحرين والكويت والسودان .



(جعدة)

الوصف النباتي : عشب معمر له أوراق جالسة ، بيضاء ، مغطاة بزغب أبيض كالقطن ، لها حواف متموجة ويحمل أزهارا صغيرة في نوريات مكتظة والأزهار بيضاء مخضرة .

الجزء الطبى : الأوراق .

الجوهر الفعال : زيت طيار .

الأثر الطبى : مغلى الأوراق يشفى المعدة والأمعاء كما يستنشق البخار الذى يتصاعد من حمام الماء الذى يحوى الأوراق لشفاء نزلات البرد والحمى ، كما يقال إنه يشفى الجدرى .

وهناك نوع آخر يسمى (cat thyme) *T. maritimum* ويسمونه « صعتر الهر » وهو نافع للأعصاب ومضاد للتشنج .

وكذلك نوع آخر يسمى *Teucrium scordium* ويستخدم فى الطب الشعبى كمقو ومعرق وقاتل للديدان .

(١٩٧)

زعتر (صعر)

الاسم الإنجليزى : Thyme

الاسم اللاتينى : *Thymus capitatus* (L.) Link

الفصيلة : الشفوية *Labiatae*

موطن النبات : منطقة البحر المتوسط ليصل انتشاره إلى الشام والعراق .

الوصف النباتي : نبات عشبي ، يصل ارتفاعه إلى ٤٠ سم تقريبا ، ساقه خشبية بيضاء اللون ، تتفرع عدة تفرعات عند قاعدتها لتجعل النبات ينتشر أفقيا في شكل ساحات دائرية ، أوراقه صغيرة جالسة ، لها رائحة نفاذة ، تتجمع في هامات قمية صغيرة ، بنفسجية إلى بيضاء اللون تحول إلى اللون الأسود عند نضجها .

ينمو النبات فى الأراضى البور والمناطق الجبلية ذات الغطاء النباتي

الخفيف ، ويعد من أجود أنواع مراعى النحل .

الجزء الطبى : الأوراق والهامات الزهرية .



(زعتر)

الجوهر الفعال : زيت الزعتر ويحتوى على ٥٥٪ فينولات phenols ، أهمها الزعترول (الثيمول) Thymol ، ومادة الكارفكرول Carvacrol ، ومواد راتنجية مثل الراسين Rasine ، والتانين Tannin .

الأثر الطبى : يستعمل مغلى الأوراق فى الغرغرة لتطهير الفم ومعالجة الالتهابات الحلقية . وللنبات أثر مضاد لدودة الأنكلستوما ، كما يستعمل لمعالجة الأمراض الجرثومية فى المعدة والأمعاء ، ويدخل ضمن الكثير من الخلطات الطبية لمعالجة أمراض البرد والزكام والتهاب الشعب الهوائية . كما يقال إنه يعالج بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما .

وللزعر استعمالات أخرى ، فهو يستعمل كتابل ، حيث يضاف إلى كثير من أنواع الفطائر وبعض المشويات وغيرها لإكسابها نكهة خاصة .

جاء في قانون ابن سينا عن الزعر ما يأتي :

« أقواه البرى ، وهو محلل ملطف ينفع من أوجاع الوركين ويزيل وجع الأسنان ويشفى اللثة المترهلة ، ودهنه ينفع الكبد والمعدة ويخرج الديدان » .
والزعر العادى هو الذى يزرع كمحصول ويشبه فى حرافته النعناع ، أما النوع البرى *Thymus serpyllum* فأوراقه دقيقة قائمة تميل إلى اللون الأسود ، وطعمه أكثر حرافة من المنزوع ، وله زهرة زرقاء ، وهو أكثر تأثيرا من الناحية الطبية ، ويحتوى على كمية زيت طيار أكثر من النوع المنزوع .

(١٩٨)

زيزفون (تيليا)

الاسم الإنجليزى : Large leaved lime

الاسم اللاتينى : *Tilia sp. L.*

الفصيلة : الزيزفونية *Tiliaceae*

موطن النبات : حوض البحر المتوسط من مصر حتى المغرب وكذلك الشام .
الوصف النباتى : شجرة عالية أوراقها كبيرة بسيطة متبادلة ، وتقوم بحماية البرعم الزهرى أو النورة التى تتكون من ثلاثة أزهار بيضاء . ويوجد من الزيزفون أنواع كثيرة منتشرة أهمها : *T. vulgaris, T. platyphyllos*

الجزء المستعمل : النورة والبراعم والقلق .
الجزء الطبى : زيت طيار يحتوى على فarnesol وجلوكوسيد flavonoid ومواد مخاطية .

الأثر الطبى : الأزهار معرقة ، وطاردة للبلغم ، ومرطبة ، ومزيلة للمغص .
تستعمل التيليا بدل الشاى ، فهى مفيدة للجهاز التنفسى ، أما منقوع القلق فهو يعالج الروماتزم .

ومن الخارج يستعمل مسحوق فحم خشب الأغصان لمعالجة الجروح



(زيزفون)

والقروح المتقيحة بنثر المسحوق فوقها ، كما يستخدم لتنظيف الأسنان
واللثة ، وإزالة الروائح الكريهة من الفم .
أما مستحلب الأزهار فيستعمل لمعالجة الزكام والتزلات الشعبية .

الفصل الثاني

نباتات عطرية تحتوى على زيوت ثابتة أو دهنية

الزيوت الدهنية (الزيوت الثابتة) :

وتتميز هذه الزيوت بأنها لا تتبخر ولا تتطاير ولا يمكن تقطيرها دون أن تتحلل خلافا للزيوت الطيارة . وهذه الزيوت الدهنية النباتية قريبة الصلة بالدهن الحيوانى فى تركيبها الكيماوى ، وتتكون من الجليسرين متحدا بحامض دهنى ، وتحتوى هذه الزيوت على حامض الأوليك عادة ، وهى غير قابلة للذوبان فى الماء ولكنها تذوب فى مذيئات عضوية مختلفة . وتنتج الزيوت الدهنية فى فصائل نباتية كثيرة ، وتحتزن بكميات كبيرة فى البذور وبكميات أقل فى الثمار والدرنات والسيقان والأوراق . والزيوت الدهنية حلوة وينقصها الرائحة القوية والطعم . وقد تزايدت الحاجة إلى الزيوت الصالحة للأكل وكتوابل وعقاقير فى السنوات الأخيرة . وللزيوت الدهنية ، بجانب أهميتها الغذائية والصناعية ، فوائد طبية كثيرة . وتقسم الزيوت الدهنية النباتية إلى أربع مجموعات :

(١) الزيوت المجففة

(٢) الزيوت نصف المجففة

(٣) الزيوت غير المجففة

(٤) الدهون

والزيوت المجففة هى التى لها القدرة على امتصاص الأكسجين وتجف عند تعرضها للجو لتعطى طبقة رقيقة مطاطة ، ومن أمثلتها زيت الكتان وزيت العصفور وزيت الخشخاش . والزيوت نصف المجففة تمتص الأكسجين ببطء ، ولكن بكميات محددة ، ومن أمثلتها زيت بذرة القطن وزيت الذرة وزيت السمسم وزيت عباد الشمس . أما الزيوت غير المجففة فهى التى تظل بحالة سائلة فى درجات الحرارة العادية ومن أمثلتها : زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الفول السودانى وزيت البان .

(١٩٩)

أبو طيلون (لواق — أبو طالون)

الاسم اللاتيني : *Abutilon* sp.

الفصيلة : *Malvaceae* الحبازية

موطن النبات : مصر ، فلسطين ، السعودية ، قطر ، سوريا ، العراق .



(أبو طيلون)

الوصف النباتي : شجيرة دائمة الخضرة (١ — ٢ متر) ، والسوق والأوراق مغطاة بشعر كثيف يميل لونه إلى الأصفر الناصع المشوب بالخضرة . والأوراق كبيرة بسيطة قلبية حافتها مسننة ، والأزهار لونها أصفر ، وأسديتها عديدة ملتحمة مكونة أنبوبة سدائية ؛ والثمرة منشقة إلى عدد من الثمرات . والأبوتيلون نبات ينتشر في المجتمعات النباتية الصحراوية ، وينتشر في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية ، ويزرع الآن على نطاق كبير في البلاد العربية كمصر والعراق .

الجزء الطبي : الأوراق والسيقان والجذور .
الجوهر الفعال : يستخلص من بعض أنواع الأبوتيلون ، مثل :

A. Pannosum, A. muticum, A. glaucum

زيوت دهنية جافة يبلغ قدرها حوالي ١٩ ٪ من الوزن الجاف . كما تحتوي أوراق النبات وكذلك الجذور والسيقان على كمية كبيرة من المواد المخاطية .

الأثر الطبي : تستخدم المواد المخاطية كملطف للأغشية المخاطية ومضطرب ولإدرار البول ، كما يستخدم الزيت كملين ويذخل في تركيب المراهم المهدئة .

(٢٠٠)

البصل

الاسم الإنجليزي : **Onion**

الاسم اللاتيني : **Allium cepa L.**

الفصيلة : **Liliaceae** الزنبقية

موطن النبات : مصر ويزرع في كل البلاد العربية .

الوصف النباتي : نبات معمر يتركب من ساق قرصية تحمل من سطحها السفلى جذورا عرضية ليفية ، ومن أعلى الأوراق المتشعبة ، وتتركب الورقة من نصل شبه أسطوانى أخضر اللون وقاعدة شحمية بيضاء ، ويوجد في آباط الأوراق براعم لبظية ، وتلتف الأوراق حول البرعم الطرفي .

الجزء الطبي : البصلة التامة النضج .



(البصل)

الجوهر الفعال : عديد من المواد ، منها زيت يحوى فى تركيبه الكثير من مركبات الكبريت ، وفيتامين (C) ومادة تعادل الأنسولين فى مفعولها فى تحديد نسبة السكر فى الدم ، وسلفيد الأليل الذى تعطيه نكهته المعروفة .

الاستعمالات الطبية من الخارج :

يقطع البصل شرائح مستديرة أو يفرم ويسخن تسخيناً خفيفاً ويستعمل ككمادات فى الحالات التالية :

— فوق الصدر لمعالجة السعال الديكى .


— فوق الصدر والظهر لمعالجة التهاب الرئة .

- فوق موضع الكلى والمثانة لمعالجة انحباس البول .
- حول الرقبة وفوق الحنجرة لمعالجة التهاب اللوزتين وحشرجة الصوت (البحة) .
- وراء الأذن لاستدرار القيح من داخلها .
- فوق أصابع القدمين وأسفلها لمعالجة الاحتقان .
- من الداخل :
- تحسين الهضم وطررد الغازات المعوية .
- معالجة الإسهال مع صفار البيض وحبوب الكراوية .
- طرد الديدان المعوية عند الأطفال .
- معالجة السعال عند الأطفال .
- إدرار البول .
- معالجة نوبات السعال الديكى .
- تخفيض كمية السكر فى الدم .
- طرد الديدان المعوية الشعرية ومعالجة البواسير باستعمال حقنة البصل الشرجية .
- البصل كتابل : مشهور فى التسيل والتخليل .

(٢٠١)

الكرات

- الاسم الإنجليزى : Porrum - leek
- الاسم اللاتينى : **Allium Porrum L.**
- الفصيلة : الزنبقية **Liliaceae**
- موطن النبات : الشرق الأوسط ويزرع فى جميع البلاد العربية .
- الوصف النباتى : عشب حولى يحمل أوراقا جذرية غريضة طويلة ، وأزهارا بيضاء بنفسجية تتجمع فى نورة شبة كروية .
- الجزء الطبى : قواعد الأوراق المنتفخة والمتشحمة .



(الكرات)

الجوهر الفعال : أملاح الحديد والكالسيوم وفيتامين (C) وزيت يحتوى على سلفيد ومثيل الين .

الأثر الطبى : يشبه البصل فى تأثيره الطبى ، فهو مهضم وطارد للبلغم ، وملين ومدر للبول ، وطارد للديدان ، وله تأثير مضاد للجراثيم Antibiotic . كما أنه يقوى العظام ويساعد على نمو الأطفال لاحتوائه على الكلسيوم ، كما أن الكرات فاتح للشهية .

فول سوداني (فستق أبيض — فستق الأرض)

الاسم الإنجليزي : Peanut

الاسم اللاتيني : *Arachis hypogaea* L.

الفصيلة : البقولية Leguminosae



(فول سوداني)

- موطن النبات : مصر والسودان وليبيا والعراق .
الوصف النباتي : نبات حولي يحمل أوراقا مركبة تتكون من أربع وريقات ، وأزهارا صفراء
في مجموعات . أما الثمار فتندفن تحت سطح الأرض ، وذلك لاستطالة
حامل المتاع واندفاعه إلى أسفل .
الجزء الطبي : البذور ويستخرج منها زيت الفول السوداني .
الجوهر الفعال : خليط من الجليسيريدات Glycerides ، والبروتينات ، وأحماض أمينية .
الأثر الطبي : البذور مغذية جدا ، ويستخدم زيتيه في عمل السمن الصناعي ،
ويستخدم بديلا عن زيت الزيتون ، وكمذيب للحقن تحت الجلد .
والثمار الغير ناضجة مدرة للبن . كما يستخدم الفول السوداني في تغذية
الأطفال على هيئة مستحلب ، أو معجون ، وكذلك يدخل في صناعات
غذائية كثيرة .

(٢٠٣)

(حارة)

- الاسم الإنجليزي : Field mustard
الاسم اللاتيني : *Brassica rapa* L.
(*Brassica campestris* L.)
الفصيلة : الصليبية Cruciferae
موطن النبات : مصر ، ليبيا ، قطر السعودية ، الإمارات ومناطق شرق البحر المتوسط .
الوصف النباتي : عشب حولي له جذر وتد ، يحمل أوراقا تلتف قاعدتها حول الساق ،
والأزهار صغيرة محمولة على نورة راسيمية ، صفراء اللون ، والثمرة
خردلة .
الجزء الطبي : البذور
الجوهر الفعال : تحتوي البذور على زيت دهني هو جلو كوسيد السنجرين Sinigrin
glucoside colza ، وزيت طيار هو زيت الراب Rape oil .
الأثر الطبي : يستخدم الزيت الدهني ضد لدغ الثعابين . وفي بعض البلاد العربية يزرع
النوع *Brassica napus* L. ويستخرج من بذوره زيت الراب Rape oil .

وبذور الأنواع *B. juncea* L.، *B. alba* L. *B. nigra* (L) koch تستخدم لتساعد على الهضم ، حيث تنبه النسيج المبطن للمعدة ، كما تساعد على إفراز عصارة البنكرياس . ونبات الخردل الأسود *B. nigra* نبات طبي قديم يستخلص من بذوره الزيت Rape oil الذى يدخل فى كثير من الصناعات ، كما يحتوى على جليكوسيد Sinigrin وإنزيم Myrosin ، ومنه تستخرج المستردة . والمستردة تسبب القيئ إذا أخذت بكمية كبيرة ، لذلك يجب أن تؤخذ بكمية صغيرة لفتح الشهية .

(٢٠٤)

عصفر (قرطم — جوزر)

الاسم الإنجليزي : Safflower

الاسم اللاتينى : *Carthamus tinctorius* L.

الفصيلة : المركبة *Compositae*

موطن النبات : يعتقد أنه الهند فهى مصدر تصديره ، ويزرع فى كثير من البلاد العربية .

الوصف النباتى : عشب له أوراق شوكية ونورات صفراء أو حمراء .

الجزء التابلى والطبى : الأزهار .

الجوهر الفعال : زيت العصفر ، وله بعض الخواص المجففة .

الأثر الطبى : يستعمل العصفر كغرغرة لعلاج التهابات الحلق واللوزتين وكمسكن ومدر للطمث . أما البذور فتستخدم لإدرار البول وكمقو ،

ويستخدم الزيت لعلاج الروماتزم .

الأثر الطبى : يدخل العصفر فى صناعة تلوين الأغذية ، والزيت صالح للأكل ،

وتستعمل أوراقه فى السلاطة الخضراء ، ومن أزهاره تستخرج صبغتان ،

إحدهما حمراء والأخرى صفراء وتعرف هذه المادة بالعصفورين

.Carthamine

ولقد ذكر داود عن العصفر ما يلى :

« العصفر هو القرطم يجلو سائر الآثار كالكيف والتمش والحكة خصوصا بالخل ، ويزيل كل جامد فى الدم ويقوى الكبد ويطيب الرائحة والأطعمة »

(٢٠٥)

خروب

الاسم الإنجليزي : Carob tree

الاسم اللاتيني : *Cratonia siliqua* L.

الفصيلة : البقولية (القرنية) Leguminosae

موطن النبات : حوض البحر المتوسط والسودان ، ويزرع في كثير من البلاد العربية .
الوصف النباتي : شجيرة صغيرة ، تحمل أوراقا مركبة لامعة ، وثمارا منضغطة نوعا ما ، سوداء وبها حواجز عرضية .

الجزء الطبي : الثمار والقلف .

الجوهر الفعال : تحتوى الثمار على صمغ Tragacanth ، كما تحتوى القلف على زيت دهني وتانين .

الأثر الطبي : تستخدم الثمار أو البذور لعلاج الإمساك عند الأطفال ، والثمار عادة مدرة للبول وملينة . وصمغ الخروب يعادل الحموضة في الأمعاء ، كما يمتص بعض السموم والإفرازات الضارة ويعالج الإسهال .
وتحتوى القرون الجافة على ٥٠ ٪ سكر ، وتنتج البذور الجافة المطحونة دقيقا ذا قيمة غذائية كبيرة ، فهي تحتوى على ٤٠ ٪ سكر قصب ، ١٧ ٪ سكر مختزل ، ١٠ ٪ بروتين . ولفوائد الخروب المجتمعة يضاف إلى لبن الأطفال الرضع ، فينظم عملية الإخراج ويقلل من حالات الإسهال عندهم .

(٢٠٦)

زريح (رمرام — ننتة — منتنة)

الاسم الإنجليزى : Wormseed

الاسم اللاتينى : *Chenopodium ambrosoides* L.

الفصيلة : الرمرامية *Chenopodiaceae*

موطن النبات : موطنه الأصلى أمريكا الوسطى والجنوبية ، ولكنه اليوم ينمو برياً فى كثير من الدول العربية .



(زريح)

الوصف النباتي : عشب حولي يعيش في الأماكن المتروكة والبيئة الملحية ، يحمل أوراقا بسيطة متبادلة ، والأزهار صغيرة خضراء .

الجزء الطبي : الأوراق والثمار

الجوهر الفعال : زيت المنتنة ، أو الرمرام ، يحتوي على ٧٠ ٪ أسكاريدول Ascaridole ، وهو المادة الفعالة في الزيت .

الأثر الطبي : له أثر فعال في تخدير الديدان الخطافية ، والمساعدة على تخليص الجسم

منها . ويرجع استعمال الزربيح في العلاج إلى عهد الهنود الحمر بالقارة الأمريكية ، حيث كانت بذوره وأوراقه تستعمل في علاج الديدان المعوية . واستعمل الزيت المستخرج منه في أندونيسيا عام ١٩١٣ ، مخلوطا مع الكلوروفورم وزيت الخروع . وهناك بعض أنواع الرمرام ، مثل *C. Vulgaris* ، و *C. Monacantha* ، و *C. murale* ، تنمو على سواحل البحر المتوسط ، وتستعمل طبيا كمسكن وضد الروماتيزم وعلاج الديدان ومدره للطمث . ويستعمل مغلى النوع الثاني لعلاج الصفراء .

(٢٠٧)

الحمص

الاسم الإنجليزي : Chick - pea

الاسم اللاتيني : *Cicer arietinum* L.

الفصيلة : البقولية (القرنية) Leguminosae

موطن النبات : جنوب أوروبا ، وينزرع اليوم في كثير من البلاد العربية من أجل ثماره ..

الوصف النباتي : نبات حولي يشبه الشجيرة ، له أوراق مركبة ، وأزهار مفردة بنفسجية

اللون أو بيضاء . وثمرته بقلء صغيرة تحتوى على بذرة أو بذرتين ، ويوجد

منه صنفان ، الصنف البلدى وبذوره صغيرة ، والصنف الشامى وبذوره كبيرة .

الجزء الطبي : البذور .

الجوهر الفعال : تحتوى البذور على زيت Allantoin وبروتين وأحماض أمينية ونشا .



(حمص)

الأثر الطبى : يستعمل مغلى البذور ضد مرض البرص والجدرى ، أما الثمار فتستخدم كمقوية للجنس .

والحمص من أحسن البقول للاستهلاك الآدمى ، إذ أن بذوره مغذية جدا ، وتؤكل قرونه الخضراء ، كما تستعمل بذوره كبديل لبذور البن ، وتدخل فى عديد من الصناعات الغذائية والحلوى .

مجموعة الموالح (الحمضيات — القوارص)

الاسم الإنجليزي : Citrus

الاسم اللاتيني : Citrus sp. L.

الفصيلة : السبزية Rutaceae

موطن النباتات : تعتبر المناطق الحارة من العالم القديم موطناً لنباتات الموالح ، وتزرع الآن في معظم الدول العربية ، وزرعت بعض أنواع الموالح من أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، فمنها ما زرع للحصول على ثماره كفاكهة ، ومنها ما زرع لأغراض أخرى . فالنارج مثلاً كان يزرع في الحدائق المعلقة المشهورة في بابل لاستعماله في ماء الاستحمام والدهونات ، ثم أدخلت هذه الفاكهة قديماً إلى منطقة البحر المتوسط حيث أصبحت من المحاصيل الهامة . وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة ونتيجة لعمليات التهجين المستمرة ، فقد وصل عدد الأنواع التي تندرج تحت الجنس Citrus إلى حوالي مائة نوع ، غير أن أكثرها ليس له أهمية اقتصادية تذكر .

الوصف النباتي : الموالح شجيرات أو أشجار صغيرة ذات أشواك ، ولها رائحة عطرة وذلك لوجود الغدد الزيتية في أنسجتها ، والورقة من جنس Citrus تبدو بسيطة ، إلا أنها في الواقع مركبة ولم يبق من وريقاتها إلا وريقة واحدة ، ويظهر العنق مجنحاً . والأزهار بيضاء إلى أرجوانية اللون ، ولها رائحة عطرة . والثمرة لبية تتميز بوجود غلاف جلدي عليه كثير من الغدد الزيتية ، والللب عصيري لوجود أكياس عصارية . ومن أخص ما تتميز به هذه النباتات أن جذورها لا تكون شعيرات جذرية ولكنها تعتمد على فطريات الجذر التي تلازم الجذور ملازمة تامة وتعيش معها معيشة متكاملة . وبالرغم من أنها من نباتات المناطق الحارة ، إلا أنها توجد في المناطق شبه الحارة ، وتنضج الثمار على مدار السنة .
وبلى الولايات المتحدة في الأهمية من حيث زراعة الموالح بلدان البحر المتوسط .

الجوهر الفعال : تحتوى ثمار الموالح على كميات كبيرة من فيتامين (C) وهو المضاد لمرض الأسقربوط ، مع بعض الأحماض العضوية والأملاح المعدنية ، مثل الحديد والبوتاس والفسفور والزنك والنحاس والنيكل والمنجنيز . كما يستخلص من الثمار والقشور الزيوت العطرية ، ويحصل منها على حامض الستريك والبكتين وكذلك البروتين . وأزهار الموالح تعد مصدرا للزيوت الطيارة التى تستخدم فى تحضير العطور . أما قشور ثمار النارج ، فتحتوى على مادة البسبريدين **Pesperidin** والأورانتيامارين **auruntiamarin** ، وعصير الثمار عنصر غذائى للسليم والمريض لما تحويه من عناصر فعالة . وفيما يلى نسرد بعض الأنواع التى لها أهمية اقتصادية :

(٢٠٨)

ليمون بنزهير

- الاسم الإنجليزى : **Lemon (Sour Orange)**
الاسم اللاتينى : **Citrus aurntifolia (L.) Swingle**
الوصف النباتى : شجرة متوسطة الحجم ، تمتاز بوجود أشواك صلبة وحادة جدا ، والثمرة مستديرة لونها أخضر مصفر صغيرة الحجم شديدة الحموضة .
الجزء الطبى : الثمار .
الجوهر الفعال : يحتوى لب القشرة على نسبة كبيرة من حامض الستريك ، وزيوت طيارة مثل الليمونين **Limonene** ولينالول **Linalol** وخلات اللنالىل **Linalyl** **Acetate** وتربينول **Turpinol** وسمين **Cymen** .
الأثر الطبى : يعتبر الليمون البنزهير مقويا للمعدة وضد مرض الإسقربوط . وزيت الليمون البنزهير ، الذى يقطر من القشرة ، يستخدم أساسا فى إعطاء نكهة وطعم للأطعمة ، كما يستخدم فى مستحضرات التجميل والعطور .

(٢٠٩)

نارينج (ليم — نفاش)

الاسم الإنجليزي : Saville Orange

الاسم اللاتيني : *Citrus aurantium* L.

موطن النبات : جنوب شرق آسيا ، والعرب هم الذين أدخلوه إلى أسبانيا ومن هناك انتشر في معظم البلاد العربية .

الوصف النباتي : شجرة متوسطة الحجم والأشواك طويلة وقوية ، وتعتبر أكبر وأقوى أشواك في الجنس *Citrus* ، وثمره النارج لونها برتقالى أو أحمر ، خشنة الملمس ، والقلب أجوف عند تمام النضج ، والعصير حمضى ومر المذاق . والقشرة ليست ملتصقة باللب التصاقا شديدا كما في البرتقال والليمون .

الجزء الطبى : الثمار والأوراق .



الجوهر الفعال : تحتوى الأوراق على حامض الأسكوربيك Ascorbic acid ، وزيت طيار ، وقلويد Stachydrine ، كما تحتوى الثمار على سكر ومواد مخاطية وحامض الستريك وأملاح معدنية وجلوكوسيدات وهسبردين Hisperidin ، وإيسوهسبردين Isohisperdin وتانين ، وصبغات فلافونية . Flavinoid pigments

وتحتوى قشرة الثمرة على زيت طيار . ومن ضمن مكوناتها أيضا الليمونين Limonine ، والمارنجين Marngin وفيتامين (C) .

وتحتوى الأزهار على زيت طيار يتركب من نيرول Nirole ومواد مرة .

الأثر الطبى : تستخدم الثمار كملين وفي بعض أمراض المعدة . وتستخدم الأوراق كمصدر للزيوت الطيارة التى تستخدم فى أغراض كثيرة منها الطبى ، وعمليات التجميل للبشرة ، وفى صناعة العطور . والنارج هو مصدر المواد التالية :

Auranti cortex siccates Auranti cortices recens Agua auranti floris



(نارنج)


(٢١٠)

ليمون حلو

الاسم الإنجليزي : Sweet lemon

الاسم اللاتيني : *Citrus limetta* L.

الوصف النباتي : تتميز شجرة الليمون الحلو بأوراقها غير المجنحة والزكية الرائحة ، ولا توجد أشواك إبطية ، والثمرة صفراء اللون ورائحتها زكية ، واللبن



(ليمون حلو)

حلو مصحوب بمرارة خفيفة .

الجزء الطبي : الثمار والأوراق .

الجوهر الفعال : يستخرج من الأوراق زيت خاص يسمى Petitgrain oil .

الأثر الطبي : يستخدم الزيت في أغراض الطهي ، كما يستعمل في صناعة العطور وتجميل البشرة .


(٢١١)

ليمون أضاليا

الاسم الإنجليزي : Limon

الاسم اللاتيني : Citrus limonia (L.) Risso

الوصف النباتي : شجرة ملساء بها أشواك كبيرة ، والأوراق بيضية أو إهليجية ، والثمرة كبيرة بيضية بها حلمة كبيرة عند طرفها ، والقشرة ملساء ، والللب أصفر



(ليمون أصاليا)

وطعمه حمضى قوى .

الجزء الطبى : الثمار .

الجوهر الفعال : الزيت الذى يحصل عليه من قشرة الثمرة ، وعصير الثمرة الناضجة .

الأثر الطبى : المادة المستخرجة من قشرة الثمرة تمتص الغازات من المعدة والأمعاء ، كما

أن عصير الثمرة الناضجة يستعمل لعلاج الإسهال والدوسنتاريا .

أما الزيت فيستخدم فى صناعة العطور والصابون .

(٢١٢)

ترنج (نفاش)


الاسم الإنجليزى : Turonj

الاسم اللاتينى : Citrus medica L.

الوصف النباتى : شجرة متوسطة الحجم ، دائمة الخضرة ، والثمرة كبيرة أسطوانية

وغلافها جلدى سميك أملس أو خشن واللّب أصفر وطعمه حمضى .
الجزء الطبى : الثمار والأزهار والبراعم .

الجوهر الفعال : يستخرج من القشرة نوع من الزيوت الطيارة ، هو زيت Citron oil ،
وتستخرج من الأزهار والبراعم مادة منشطة وقابضة . والترنج المعروف
فى التجارة عبارة عن القشر المسكر .



(ترنج)

الأثر الطبى : يفيد فى امتصاص الغازات من المعدة والأمعاء ويساعد فى علاج
الإسهال ، كما أنه منشط بصورة عامة . ويستخدم الزيت فى صناعات
العطور ومواد التجميل .

(٢١٣)

ليمون هندي (ريمبوعى)

الاسم الإنجليزى : Grape fruit

الاسم اللاتينى : *Citrus paradisi* L. Macf.

موطن النبات : موطنه الأصلي الهند ، ويزرع اليوم فى كثير من البلاد العربية .
الوصف النباتى : شجرة كبيرة دائمة الخضرة ، والأشواك نخيلة قابلة للانثناء ، والثمرة كبيرة مستديرة مبططة بين القطرين ، ملساء ، لونها أصفر ليمونى أو وردى ، واللحم حمضى له عدة أصناف .
الجوهر الفعال : ثمرة الليمون الهندي غنية جدا بفيتامين (B) و (C) ، كما أن قشور الثمار غنية بمادة البكتين Pectin ولذلك يعتبر الليمون الهندي عنصرا من عناصر المناعة ضد البرد .

(٢١٤)

كروتون (حب الملوك أو حب السلاطين)

الاسم الإنجليزى : Purging Croton

الاسم اللاتينى : *Croton tiglium* L.

الفصيلة : السوسية Euphorbiaceae

موطن النبات : يزرع فى معظم البلاد العربية وموطنه جنوب آسيا والصين .
الوصف النباتى : شجيرة تحوى فى أنسجتها اللبن النباتى ، وتحمل أوراقا بسيطة راحية ، وأزهارا وحيدة الجنس والنبات أحادى المسكن والثمرة منشقة إلى ثلاث ثمرات .
الجزء الطبى : البذور .
الجوهر الفعال : زيت الكروتون ويتركب من جليسريدات لعدد كبير من الأحماض الدهنية منها الحامض الطبى والحامض الدهنى والحامض الزبدى والحامض الزيتى .



(كروتون)

الأثر الطبى : زيت الكروتون من أقوى المسهلات المعروفة ، وتستعمل أزهاره وأوراقه فى تسميم الأسماك فى الهند .

جاء فى رسالة داود ما يأتى :

« حب الملوك أو حب السلاطين حار يابس يخرج البلغم الغليظ ويقىء ويلهب الفم وإذا طبخت أوراقه فى مرق ديك هرم وشرب حلل وجع المفاصل والظهر والنسا والنقرس » .

وجاء فى قانون ابن سينا ما يأتى :

« حب الملوك نافع بإسهال من أوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا يقىء بقوة ويسهل » .

(٢١٥)

زريقة (غثوم — سريجة — عينون)

الاسم الإنجليزى : Zoreka

الاسم اللاتينى : *Globularia alypum* L.

الفصيلة : الجلوبولارية *Globulariaceae*

موطن النبات : حوض البحر المتوسط .

الوصف النباتى : عشب معمر ينمو على الأرض الصخرية ، على سواحل البحر المتوسط ، له



(زريقة)

ساق خشبية ، وأزهار زرقاء متجمعة في رعوس هامية طرفية .

الجزء الطبى : النبات كله .

الجوهر الفعال : زيت دهنى .

الأثر الطبى : يستعمل النبات كمسهل بدلا من السنامكى . أما مغلى الأوراق

والأغصان الصغيرة ، فيستعمل لعلاج الحمى المتقطعة بجانب استعماله

كمسهل أيضا . ويستعمل النبات كمقو . ولا زالت المواد التى يعزى إليها

هذه التأثيرات تحتاج لمزيد من الدراسات .

(٢١٦)

فول الصويا

الاسم الإنجليزى : Soy bean


الاسم اللاتينى : Glycine hispida L. (G. max)

الفصيلة : البقولية Leguminosae

موطن النبات : يزرع النبات في معظم البلاد العربية .

الوصف النباتي : عشب حولي يتراوح ارتفاعه من ١ - ٢ متر ، ويحمل أوراقا مركبة ريشية تتكون من ثلاث وريقات ، أزهاره بيضاء أو حمراء ، الثمار قرنية مغطاة بطبقة وبرية ، تتدلى إلى أسفل ، وبها بذور مستديرة .

الجزء الطبي : البذور والأغلفة الثمرية والقلف .



(فول صويا)

الجوهر الفعال : تحتوى بذور الصويا على نسبة عالية من الزيت (١٩ - ٢٢٪)، كما تحتوى على نسبة عالية أيضا من البروتين تصل إلى ٤٠٪، أيضا تحتوى على فلافونيات Isoflavones ، أهمها الجينستين Genistein ، والديادزيين Daidzein ، وهذان لهما تأثير على الهرمون الأنثوى . كما تحتوى البذور على الليسيثين Lecithin ، والصابونيات Saponins وفيتامينات (E & B) ، وكاروتينات .

الأثر الطبى : يعتبر نبات الصويا من أهم محاصيل العالم ، وهو اليوم بديل عن اللحم وغذاء لمرضى السكر ، حيث إن السكر الذى تحويه البذور صعب هضمه وتمثيله . وتحتوى البذور من السعرات الحرارية أربعة أمثال ما فى اللحم ، أما مغلى القلف فهو قابض .
ومن خصائص البذور أنها تقلل كمية السكر فى الدم كما تقلل كمية الكولسترول فى الشرايين .

وقد استخلص منها لبن يستخدم فى تغذية الأطفال .
ويستعمل زيت فول الصويا ، بجانب استعماله للمائدة أو المطبخ ، فيما يربو على الثمانين نوعا من المنتجات الغذائية ، أهمها الدهن الصناعى .
ومن بين الصناعات التى يستخدم فيها زيت فول الصويا صناعة الشموع والصابون والورنيشات وبديلات المطاط والمبيدات الحشرية والمطهرات .

ويحتوى الكسب على ٤٠ - ٤٨٪ ، ويعتبر غذاء قيما للماشية ومصدرا لدقيق الصويا . كما يستعمل فى صناعة مواد اللصق والبلاستيك وغيرها من الصناعات .

(٢١٧)

القطن

الاسم الإنجليزى : Cotton

الاسم اللاتينى : *Gossypium barbadense* L.

الفصيلة

الخبازية Malvaceae :

موطن النبات : أمريكا ويزرع حالياً في عدد من الأقطار العربية ؛ منها مصر والسودان وسوريا والعراق . ويعتقد أن الهندود الحمر هم أول من نسج القطن منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة .



(القطن)

الوصف النباتي : القطن نبات عشبي أو شجيري معمر ، وجذوره وتدية تتعمق في التربة ، والأوراق راحية بسيطة مفصصة إلى ثلاثة فصوص ، ويوجد في إبط كل ورقة برعمان . وتحاط الأزهار بثلاث وريقات (الكم) . والثمرة علبة تفتتح تفتحا مسكينياً (اللوزة) .

- الجزء الطبى : البذور .
- الجوهر الفعال : زيت بذرة القطن .
- الأثر الطبى : لزيت بذرة القطن (الزيت الفرنساوى) قيمة غذائية كبيرة . والكسب يستعمل علقا للماشية ، حيث إنه يحتوى على نسبة لا بأس بها من البروتين ونسبة صغيرة من الزيوت والجوسيبول . كما تستخدم البقايا المتخلفة فى صناعات كثيرة مثل الصابون ومساحيق الغسيل والمشمع والجلد الصناعى والمواد العازلة والجليسرين ونترات الجليسرين .
- ومن الناحية الطبية يستعمل زيت بذرة القطن كمذيب لكثير من المواد التى تحقن عضليا ، كما يستعمل كملين .
- ومن الدراسات الحديثة ، تم استخراج دقيق جديد من بذرة القطن ثبت أنه يفوق فى قيمته الغذائية اللحوم والبيض ، ويعوض نقص البروتين فى الغذاء ، حيث يحتوى على ٥٧٪ من وزنه من البروتين ، وهى فى دقيق القمح ١٠٪ ، وفى اللحوم ١٧٪ .
- وهذا الدقيق يكفى أن نضيف حوالى ١٠٪ منه إلى الدقيق العادى ليتحول إلى غذاء مفيد يحوى كل ما يلزم الإنسان . وقد لاقى هذا الخبز الجديد المخلوط قبولا جديدا من ناحية الطعم ، وبعد إجراء التجارب على الفلاحين وفحصهم طبيا ، ثبت تحسن صحتهم وزيادة أوزانهم ، واختفاء مرض البلاجرا الذى كان ناتجا عن سوء التغذية ، وازداد نمو الأطفال بدرجة ملحوظة ، وارتفعت نسبة لبن الأمهات . هذا بالإضافة إلى أن تكلفة هذا الدقيق الجديد قليلة للغاية .
- وقد بلغ من اهتمام الهيئات العلمية بهذا البحث أن قاموا بتصميم مصنع خاص لإنتاج الدقيق من بذور القطن فى مصر ، ونجح المصنع وبتج الآن أنواعا فاخرة من البسكويت والبيتى فور لتغذية الأطفال .
- السمية : وجد أن الكسب الناتج بعد عصر بذور القطن قد يكون ساما للحيوانات لوجود ال Sesquiterpene phenol و Gossypol .

(٢١٨)

عباد الشمس

الاسم الإنجليزي : Sunflower

الاسم اللاتيني : *Helianthus annuus* L.

الفصيلة : Compositae المركبة

موطن النبات : أمريكا ، ولكنه يزرع في معظم البلاد العربية .



(عباد الشمس)

الوصف النباتي : عشب أو شجيرة صغيرة تحوى أنسجتها عصارة لبنية ، تحمل أوراقا بسيطة متبادلة ، ونورات هامية صفراء اللون ، والثمرة سبسلاء .

الجزء الطبى أو التابلى : البنور .

الجوهر الفعال : الزيت المستخلص من البنور ، ولونه أصفر ذهبى باصع .
الأثر الطبى : وجد أن زيت عباد الشمس يعمل على خفض نسبة السكر فى الدم .

وهو زيت ممتاز للمائدة ، ويستعمل فى الزبد الصناعى ولا يقل عن زيت الزيتون فى قيمته الغذائية والطبية . وفى أمريكا تم إنتاج نوع من المبيدات الحشرية والنباتية من زيت عباد الشمس ، ويستعمل الزيت فى صناعة الصابون أيضا . أما الكسب فيستعمل كعلف ممتاز . وللزيت خواص تجعله صالحا لصناعة البويات والورنيشات .

(٢١٩)

عرق الطيب (سوسن)

الاسم الإنجليزى : Orris Root

الاسم اللاتينى : *Iris florentina* L. :

الفصيلة : السوسنية *Iridaceae*

موطن النبات : إيطاليا وبعض بلاد البحر المتوسط ، ويزرع اليوم فى بعض البلاد العربية كنبات زينة .

الوصف النباتى : عشب معمر له ريزومة أرضية .

الجزء الطبى : الريزومات .

الجوهر الفعال : زيت عطرى يستخلص من الريزومات ، ومادة دهنية تعرف بدهن الطيب ،

يتركب من ٨٥٪ حامض طيبسى (ك١ يد٢٨ أ٢) Myristic ،

والباقي عدة أحماض أخرى منها حامض الكبريك (ك١ يد١١ أ٢) ،

Capric acid ، والحامض الجاوى (ك٧ يد٦ أ٢) Benzoic acid .

: يستخدم عرق الطيب لإدازار اللبن ، وله تأثير مسهل ومقىء ،

ويستنشق بعض العامة مسحوقه لإحداث العطاس وصرف المخاط

الأثر الطبى

والزكام من الأنف ، ومسحوق الجذور أساس بودرة البنفسج
. Orris root



(عرق الطيب)

واليوم يستعمل عرق الطيب كمادة مطيبة تدخل في تركيب بعض
الروائح العطرية ، ولإزالة رائحة الفم الكريهة ، كما تدخل في تركيب كثير
من معاجين الأسنان .

وفي تونس والمغرب ينمو النوع *Iris foetidissima* L. ويسمونه سيف
الديب ، كما ينمو النوع *Iris germanica* L. ويسمونه سوسن أزرق ،
وتستخدم ريزوماتهما كمسهل ولإدرار البول . ويستخدم مغلي
الريزومات لعلاج الروماتيزم وعرق النساء ، كما يستخدم داخليا ضد
التسمم . وتستخدم الريزومات أيضا في صناعة العطور والروائح
العطرية .

ويقول داود في عرق الطيب :

« السوسن طيب الرائحة وقد جرب لضيق النفس والربو وأوجاع الصدر وتنقية

القصبة ، وينفع الكبد والطحال ، والاستسقاء ، والبواسير ، وعرق النساء ،
والقروح الغائرة ، ويخرج الديدان ، ويدبر الحيض ويفتح السدد » .
وجاء في كتاب الأدوية المفردة للسلطان الأشرف يوسف بن علي عن السوسن ما يأتي :
« السوسن ضرب من الرياحين وإذا سحق أصله وجفف فهو دواء ينجح في
إدخال جميع القروح ، ويزيل الكلف والتمش ، ويغسل به الوجه فيصقله ، وزهر
السوسن إذا شرب نفع من نهش الهوام ، ويصلح السعال ورطوبة الصدر .

(٢٢٠)

الكتان

الاسم الإنجليزي : Flax

الاسم اللاتيني : *Linum usitatissimum* L.

الفصيلة : الكتانية *Linaceae*

موطن النبات : بلدان البحر المتوسط .



(كتان)

الوصف النباتي : عشب حولي يحمل أوراقا بسيطة جالسة ، وينتهى الفرع بزهرة زرقاء أو حمراء ، والثمرة علبة تتفتح تفتحاً حاجزياً ، ويزرع بمصر من أيام الفراعنة من أجل أليافه المستعملة في صناعة المنسوجات الكتانية ، ومن أجل بذوره الزيتية الصغيرة البيضاء الشكل المدببة الأطراف .

الجزء الطبي : البذور .

الجوهر الفعال : زيت بذور الكتان ، وهو زيت ثابت ، يتكون من جليسيريدات لعدة أحماض دهنية ، منها الحامض الكتاني (ك_{١٨} يد_{٢٢} أ_٢) Linoleic acid ، والحامض الزيتي (ك_{١٨} يد_{٢٤} أ_٢) Oleic acid ، والحامض الدهني (ك_{١٨} يد_{٢٦} أ_٢) Stearic acid .

الأثر الطبي : تستخدم بذور الكتان لعمل اللبغ والضمادات ، كما يستخدم في تحضير نقيع يشرب لمداواة نزلات البرد في الحلق والشعب الهوائية ، ويفيد المعدة والتهاب الكلى والمثانة ، ويساعد قليلاً على إدرار البول .

ويؤخذ زيت بذرة الكتان من الباطن لتلطيف التهابات الغشاء المخاطي وتسكين آلامه ، كما يزيل آلام السعال ويزيل الإمساك ، كما يسكن المغص الناتج عن وجود حصوات في المرارة ، وكذلك في حالات التهاب الجهاز البولي .

وقد جاء في رسالة داود ما يأتي :

« الساق أزرق الزهر ، والبذر كثير الدهن ، حار يابس يفلح الكلف ويسكن الصداع المزمن ويصلح الشعر ، وإذا شرب أنضج أورام الرئة والصدر والكبد والطحال ، وهو بالعسل يقوى العضلات ويسكن المفاصل والنقرس وعرق النساء » .

السمية : الأوراق والثمار سامة لاحتوائها على جليكوسيد سيانوجينيك Cyanogenic glycoside ، ولينامارين Linamarin ، ومنه يخرج أنزيم لينامارين Linamarase الذي يعطي السيانيد Cyanide السام .

(٢٢١)

بان — بسار (مورنجة)

الاسم الإنجليزي : Ben

الاسم اللاتيني : *Moringa Sp.*

الفصيلة : المورنجية *Moringaceae*

موطن النبات : المناطق الاستوائية ، ويوجد بمصر والسودان والسعودية نوع من المورنجة

هو *Moringa peregrina (Moringa aptera)* .

الوصف النباتي : أنواع هذا الجنس أشجار ذات أوراق مركبة عديمة الأذينات ، تحمل أزهارا خنثى ، وحيدة التناظر ، محمولة على نورات عنقودية . والثمرة عليية تشبه الخردلة وتفتح بثلاثة صمامات .

الجزء الطبي : البذور (حب البان ، أو حب البسار) .

الجوهر الفعال : زيت البان Ben oil ، أو زيت البسار ، ويحتوى على جلسريدات



(بان)

Glycerides لزيت Stearic ، Palmitic ، Oleic .

الأثر الطبى : الزيت ليس له لون ولا رائحة ولا طعم ، ولذلك يستخدم فى الطهى والإنارة ، إلى جانب استخدام القلف لعلاج البشرة كملهب خفيف . ويقال إن الجذور إذا مضغت ووضعت على لدغة الثعبان تمنع انتشار السم ، وأن مغلى الجذور يشفى من مرض الأسقربوط . ولقد ثبت أن زيت البذور يدر إفراز الصفراء ، وله تأثير على منع الحمل . وفى الشرق الأقصى نوع يسمى *Moringa oleifera* يزرع من أجل استخدام أوراقه كخضار شعبى ، وكذلك الأزهار التى تطبخ كخضار ، وكذلك الثمار الغير الناضجة ، فهى غنية فى البروتين والكلسيوم والحديد والفسفور .

(٢٢٢)

الزيتون

الاسم الإنجليزى : Olive

الاسم اللاتينى : *Olea europaea* L.

الفصيلة : الزيتونية *Oleaceae*

موطن النبات : حوض البحر المتوسط ، ويزرع فى منطقة شمال أفريقيا والشام .

الوصف النباتى : شجرة صغيرة دائمة الخضرة ، تحمل أوراقا بسيطة متقابلة ومتعامدة ،

طويلة سوية الحافة ، جلدية ، وأزهارا صغيرة بيضاء فى نوريات غير

محدودة ، والثمرة حسلية . ويزرع الزيتون فى حوض البحر المتوسط ،

وعرف الزيتون فى مصر منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد .

الجزء الطبى : الثمار والزيت .

الجوهر الفعال : الزيت وهو من أهم الزيوت ، ويحتوى على جلو كوسيد يكسب الزيت

مرارة ، ويقال إنه ناتج عن طحن البذور .

الأثر الطبى : أثبتت البحوث الحديثة أن زيت الزيتون لا يزيد من كمية الكولسترول فى

الدم ، كما أنه يقاوم شيخوخة الأعضاء . ومن مميزات هذا الزيت أيضا ؛ أنه

يحمى الأمعاء والمعدة وينشط إفرازات المرارة ، ويقلل من أخطار تكوين



(زيتون)

الحصوة فيها .

وزيت الزيتون مسهل خفيف . وللمحافظة على جمال ونضارة -جواء ،
ينصح الخبراء باستخدام زيت الزيتون في طهي الأطعمة وإضافته إلى
الخضروات الطازجة ، كما أنه يخفف نسبة السكر في الدم .
ويستخدم زيت الزيتون لتغذية فروة الرأس ، وذلك عن طريق تدليك
الجذور الشعرية .

وجاء في كتاب كنوز الصحة : « أن معجون زيت الزيتون الجيد
وعصارة الليمون مع العسل يطرد الديدان عند الأطفال » .

(٢٢٣)


الفجل

الاسم الإنجليزي : Garden radish

الاسم اللاتيني : *Raphanus sativus* L.

الفصيلة : الصليبية *Cruciferae*

موطن النبات : زرع الفجل منذ أكثر من ألفى عام ، ويزرع اليوم في جميع أنحاء العالم ، ولا يعرف موطنه الأصلي .



(فجل)

الوصف النباتي : نبات حولي ، له جذور وتدية درنية مغزلية أو كروية الشكل حسب الأصناف ، وتكون بيضاء أو صفراء أو حمراء أو بنفسجية اللون أو سوداء وللنبات أوراق خضراء ، وأزهار بيضاء ، وثمار خردلية . وهناك أنواع كثيرة من الفجل ؛ منها فجل الحصان *Armoracia lapathifolia* والنوع البري *Raphanus raphanistrum* .

الجزء الطبي : الجذور والأوراق والبذور .
الجوهر الفعال : تحتوى الجذور على رافايول *Raphaiol* ، وريتيكول *Rettichol* وسينابين *Sinapine* ، رافانين *Rhaphanin* . والأخير له تأثير إبادة للبكتريا . أما البذور فتحتوى على زيت دهني وآخر طيار يشبه زيت الماسترد ، وجذور الفجل غنية بالكالسيوم والحديد والفسفور .

الأثر الطبي : للجذور تأثير على إصابات الكبد والأعصاب ، وعصير الأوراق مدر للبول ، ملين ، وغنى بالفيتامينات . وجاء في التقارير الطبية أن الفجل يساعد الإنسان على الوقاية من إصابته بمرض السرطان وأن فيتامين (C) الذى يحتوى عليه الفجل يعد مادة ضرورية ، تحافظ على النسيج الخلوى وتقوم بدور مانع لنمو الخلايا السرطانية ، كما أن الألياف الخشنة التى يحتوى عليها الفجل تمنع انقباض الأمعاء ، مما يساعد على امتصاص الطعام ، ويساعد الفجل على خفض نسبة الكولسترول فى الدم ، ويقلل من احتمال الإصابة بأمراض ضغط الدم العالى .

(٢٢٤)

خزامى (دية أو بقم)

الاسم الإنجليزى : Deyer's weed
الاسم اللاتينى : *Reseda lateola* L.
الفصيلة : الريزيدية *Resedaceae*
موطن النبات : منطقة شمال أفريقيا .
الوصف النباتي : عشب حولي أو معمر ، والأوراق كاملة أو مجزأة ، ويحمل أزهارا لها رائحة لطيفة صفراء اللون فى نورات طرفية راسيمية والثمار علبية .



(خزامى)

- الجزء الطبى : النبات كله .
الجوهر الفعال : فلافون وليوتبولين Luteolen وصبغات Pigments ، والبذور تحوى زيت دهنى .
الأثر الطبى : يستخدم النبات معرقا ، ومدررا للبول ، وطاردا للديدان . كما يستخدم كمقو ، ويستخرج من النبات صبغة حمراء لصبغ الأنسجة .

(٢٢٥)

الخروع

الاسم الإنجليزي : Castor oil

الاسم اللاتيني : *Ricinus communis* L.

الفصيلة : اللبئية (السوسبية) *Euphorbiaceae*

موطن النبات : موطنه الأصلي المناطق الاستوائية في أفريقيا وآسيا ، وينمو برياً في حوض البحر المتوسط ، ويزرع في معظم البلاد العربية .



(الخروع)

الوصف النباتي : شجيرة دائمة الخضرة ، تحمل أوراقا كبيرة الحجم مفصصة راحية لها أعناق طويلة وحواف مسننة ، وتوجد الأزهار في نورات قمية عنقودية ، وتحمل الأزهار المذكرة من أسفل أما الأزهار المؤنثة فتحمل عند قمة محور النورة ، والثمرة خضراء عليها زوائد كثيرة ، والبذور ذات قصرة صدفية بنية اللون مزركشة ولها بسباسة .

الجزء الطبي : البذور الناضجة .

الجوهر الفعال : زيت الخروع يتركب من جلسريدات لعدة أحماض دهنية أهمها الحامض الخروعي Ricinoleic acid (ك ١٨ يد ٣٤ م) والحامضين الزيتي والنخلي ، ويحتوى الزيت أيضا على قلويد الرسنين Ricinine .

الأثر الطبي : مسهل غير عنيف ، ولكنه سريع التأثير ، ويستعمل من الخارج في معالجة تقرحات الجلد والنزلات الصدرية والبواسير ، ويساعد على نمو الشعر عند الأطفال ، كما يساعد على علاج التهاب العيون .

جاء في تذكرة داود عن الخروع :

« الخروع يابس يحل الرياح والأخلاط الباردة وإذا طبخ في الزيت أزال الصداع والفالج والنقرس وعرق النسا » .

السمية : تحتوى البذور على المادة الشديدة السمية وهي Phytotoxin resin والتي تسبب تقلصات في العضلات والإسهال والفشل الكلوى (urenia) وقد ثبت أن مضغ بذرتين إلى أربعة تسبب تسمم الإنسان .

(٢٢٦)

السسم


الاسم الإنجليزي : Sesame

الاسم اللاتيني : Sesamum indicum L.

الفصيلة : السسمية Pedaliaceae

موطن النبات : السودان ومصر والعراق والصومال وبعض البلاد العربية الأخرى .

الوصف النباتي : عشب حولي يحمل أوراقا بسيطة متقابلة ، والأوراق العليا متبادلة



(السمس)

مستطيلة كاملة الحافة ؛ وأزهارا مفردة تخرج من آباط الأوراق ، وثمارا
علية تتفتح مسكنيا عند الفواصل الكاذبة ، والبذور ملساء .

الجزء الطبى والتابلى : البذور .

الجوهر الفعال : زيت يعرف بزيت السيرج ، ويتركب من ٧٥٪ جليسيريدات لعدة

أحماض دهنية منها الحامض الزيتى والكتانى والنخلى والطبى Myristic

. acid

الأثر الطبى والتابلى : يدخل فى صناعة الصابون والزبدة الصناعى (المارجرين) ، ويستخدم

بدىلا عن زيت الزيتون فى الطبخ والأغراض الطبية ، وفى عمل الطحينية ،

ويستعمل لإزالة خشونة الصوت . كما أن مسحوق البذور والزيت

يستخدمان فى صناعة الحلاوة الطحينية .

يقول داود في السمسسم ما يأتي :

« السمسسم نبت فوق ذراع وبذره حار رطب يخضب البدن ويصلح الصوت
ويزيل الخشونة ، وزيت السيرج مفيد في التسمين وإصلاح الكلى ويزيل السعال
وخشونة الرئة والصدر والكحة والجرب . » .

(٢٢٧)

الذرة الشامية

الاسم الإنجليزي : Maize

الاسم اللاتيني : Zea mays L.

الفصيلة : النجيلية Gramineae

موطن النبات : أمريكا ، وتزرع في معظم البلاد العربية .

الوصف النباتي : الذرة نبات حولي صيفي له ثلاثة أنواع من الجذور : جذور جنينية
وعرضية ودعامية ، وساق الذرة من أكثر السيقان بين نباتات الغلال
طولا ، والساق صماء مقسمة ، والسلاميات ممتلئة بنخاع لين ،
والأوراق متبادلة على الساق ومرتبة في صفين متقابلين ، يوجد في إبط كل
ورقة برعم ولا ينشط منها إلا برعمان أو ثلاثة في منتصف النبات لتكوين
الكيزان . أما البراعم العليا والسفلى فتظل ساكنة ، والذرة نبات وحيد
الجنس ووحيد المسكن . والنورة المذكرة طرفية تنتهي بها آخر سلاميات
الساق ، أما النورة المؤنثة (الكوز) فتنشأ في نهاية فرع جانبي في وسط
النبات .

الجزء الطبي : زيت بذرة الذرة والشواشي وهي الأقلام ومياسم الأزهار المؤنثة .

الأثر الطبي : من الداخل :

— مغلى شواشي الذرة لإدرار البول وعلاج الجهاز البولي والتناسلي من
الالتهابات .

— زيت البذرة يستخدم في معالجة التشنجات .

— خفض نسبة السكر في الدم .

من الخارج :



(الذرة الشامية)

— إزالة القشور من أطراف جفون العيون .
— في علاج الشعر الحشن فيجعله لامعا ناعما ، كما تختفى القشور من الرأس .
ويجب ملاحظة أنه قد ثبت أن الذرة تجمع التترات التي تسبب التسمم للأغنام ، وكذلك ، وتحت ظروف جوية معينة ، يتكون الجلو كوسيد السيانيدي Cynogenic glycoside السام .

الباب الرابع

النباتات السامة

للنباتات عامة دورها الفعال في حياتنا اليومية ، سواء كان ذلك في الغذاء ، أو الكساء ، أو الدواء أو الزينة . إلا أنه كثيرا ما ينمو وسط هذه النباتات نباتات أخرى سامة تضر بصحة الإنسان أو تسبب له الوفاة ، إذا لامسها أو أكلها . والنباتات السامة توجد في المنازل والحدائق العامة ، ووسط المزروعات والمراعى ، ودون أن يدرك الكثيرون شيئا عن خطر خصائصها السمية .

وقد عرفت كثير من النباتات السامة ببعض خصائصها الطبية ، وهي توجد بين الأعشاب الطبية ، وعند كل العطارين والعشابين مما يزيد من خطورتها على حياة الإنسان . كل هذا جعل معرفة النباتات السامة شيئا واجبا وضروريا ، لذلك رؤى تخصيص جزء من هذا الكتاب للنباتات السامة الشائعة في الوطن العربي تمهيدا لمعرفتها ودراستها وتجنب أضرارها .

وأهم المواد السامة الموجودة في النباتات مواد عضوية مثل القلويدات ، كما في الإبيديرا والبلادونا والحنشخاش والذاتورة ، أو جليكوسيدات سيانوجينية ، مثل حشيشة الفرس والسنمكة ، أو Cardioactive glycosides ، مثل الدفلة والعشار وبصل الحنش ، أو Saponin glycosides ، مثل الهيدرا والبرسيم الحجازى والديورانتا ، أو Coumarin glycosides ، مثل الخندنوق والشيخ .

وهناك بعض الفصائل كل نباتاتها سامة في أوقات معينة من حياتها ، مثل نباتات الفصيلة الدفلية Apocynaceae والعشارية Asclepiadaceae والسوسية Euphorbiaceae والسابوتية Sapotaceae . وجميع نباتات هذه الفصائل تحتوى على لبن نباتى .

وهناك بعض النباتات تعتبر سامة ولكن القليل منها قد يشفى الكثير من الأمراض ، ومن أمثلة ذلك البلادونا ، فجرعات صغيرة منها ترخى تشنجات المعدة العصبية ، والأثروبين الذى يستعمله الأطباء لتوسيع حدقة العين وهو مركب مستخلص من نبات ست الحسن السام ، وكذلك الذاتورة فهي مفيدة في علاج دوار البحر بالرغم من سميتها . ولأهمية هذه النباتات ذكرت في باب النباتات الطبية .

ناب الجمل (زغليل — عين البومة)

الاسم الإنجليزي : Summer adonis

الاسم اللاتيني : *Adonis macrocarpa* DC .

الفصيلة : الشقية *Ranunculaceae*

موطن النبات : ينتشر النبات في شمال أفريقيا وشبه جزيرة العرب والشام ، وتعد أوروبا موطنها أصليا له .



(ناب الجمل)

الوصف النباتي : نبات حولي عشبي ، أوراقه ريشية دقيقة التفصص ، الأزهار وحيدة قمية صفراء إلى برتقالية محمرة قدحية الشكل ، الثمار توجد مجمعة على هيئة مخروط .

السمية : أحد النباتات السامة للخيول والأغنام . وأهم أعراضه آلام حادة في القناة الهضمية ثم الموت ، ويمكن أن يكون ذلك بسبب احتواء هذا النبات على جليكوسيد الادونيدين والأدونيتوكسين .

وهناك في الشام نوع آخر هو *Adonis vernalis* ، ويسمونه أدونس ربيعي ، وهي عشبة تنمو برياً على المنحدرات الصخرية وبين الصنوبريات ويتميز بأزهاره الصفراء . كما يوجد نوع آخر يسمى عين الديك *Adonis aestivalis* ، ويسمونه أدونس صيفي ، ويتميز بأزهاره الحمراء .

(٢٢٩)

أنا جالس (عين الفطوس ، عين القط ، عوينة الحية)



(أناجلس)

- الاسم الإنجليزي : Searlet Primpernel
الاسم اللاتيني : *Anagallis arvensis* L.
الفصيلة : *Primulaceae* الربيعية
موطن النبات : ينتشر النبات في أغلب مناطق العالم العربي .
الوصف النباتي : نبات عشبي حولي إلى شبه معمر ، زاحف إلى شبه قائم ، أوراقه متقابلة وجالسة وبيضية الشكل ، أزهاره معنقة زرقاء أو حمراء اللون وحيدة وجانبية ، الثمار علبة كروية الشكل تفتح بصمام دائري ، بها عدة بذور سوداء اللون .
السمية : تعد الجذور الغضة سامة للماشية ، وذلك لاحتوائها على جليكوسيد السيكلامين السام . كما أن أوراقه تسبب التهاب الجلد عند الإنسان ، ويمكن أن يعزى ذلك إلى وجود صابونيات ضمن محتوياتها .
وبالرغم من سمية النبات ، فإنه يستخدم أحيانا في الطب الشعبي الليبي كمدر للبول ، ومعرق ، وطارد للبلغم ، وفي علاج الروماتزم .

(٢٣٠)

جيتاجو (أجروستيما)

- الاسم الإنجليزي : Corn - Cockle
الاسم اللاتيني : *Agrostemma githago* L.
الفصيلة : *Caryophyllaceae* القرنفلية
موطن النبات : من نباتات أوروبا ، غير أنه ينتشر في أغلب دول العالم العربي ضمن نباتات المحاصيل ، مثل القمح .
الوصف النباتي : نبات عشبي حولي له تفرعات ثنائية ، وأوراقه جالسة ، شبه شريطية ، الأزهار وحيدة وردية إلى حمراء أو بيضاء اللون ، الثمار علبة جالسة يضاوية الشكل ، والبذور كلوية لها سطح متدرن أسود اللون .
السمية : من النباتات التي تعد سامة بالنسبة للإنسان والحيوان على حد سواء .
ويكمن مصدر سمية النبات في البذور ، وذلك لاحتوائها على مركب الجيتاجين . والبذرة عادة ما تكون ضمن بعض المحاصيل الهامة ، مثل

القمح والشعير ، ولذلك تعد نسبة هذه البذور فى أى محصول مهمة فى تقدير ثمنه ، وعند طحن هذه البذور مع بذور الشعير والقمح وتناولها فى الخبز ، أو فى أى شكل آخر من أشكال الغذاء ، تظهر أعراض التسمم ، وهى الاضطرابات المعدية والمعوية والتقيؤ والإسهال والدوار .

وإذا ما تعاطى الإنسان هذه البذور — فى الأشكال المذكورة — بكميات قليلة ومتكررة ، فإنها تسبب له تسمما مزمنًا يسمى (الجيتاجيزم) ، بينما إذا كانت الكميات كبيرة ، فإن التسمم يكون أكثر حدة ، وأهم أعراضه الدوار ، وهبوط فى الجهاز التنفسى ، والتقيؤ ، والإسهال ، وإفراز اللعاب بغزارة ، والشلل ، كما يمكن أن تكون هذه الأعراض مصحوبة بآلام حادة فى العضلات والإغماء .

(٢٣١)

أنيمون (زغليل أو شقائق النعمان)

الاسم الإنجليزى : Wind flower

الاسم اللاتينى : *Anemone coronarium* L.

الفصيلة : الشقيقية *Ranunculaceae*

موطن النبات : مصر ، ليبيا ، العراق ، سوريا وفلسطين .

الوصف النباتى : عشب صغير له أوراق مجزأة تجزأ دقيقا ، وله ريزومة أرضية ، والفرع

المزهر ينتهى بزهرة كبيرة يختلف لونها من الكرم إلى الأزرق ، وللزهرة

ثلاثة قنابات تحت الزهرة أشبه بالسبلات ، وينمو النبات ويزهر فى أول

موسم التزهير على الكثبان الرملية ويظهر فى مجموعات بهيجة متجانسة .

يحتوى النبات على Protoanemonin السام ، وهو سام للأغنام وبعض

الحيوانات التى تقتات عليه .

وفى الأساطير يرمز شقائق النعمان إلى الأسى والموت ، ويعتمد هذا الرمز

إلى أسطورة أدونس Adonis الذى يعتقد أنه مات على فراش مفروش

بالأنيمون .



(أنيمون)

(٢٣٢)

أرجيمون

الاسم الإنجليزي : Prickly poppy

الاسم اللاتيني : *Argemone mexicana* L .

الفصيلة : الخشخاشية *Papaveraceae*

موطن النبات : مصر وليبيا وشبه الجزيرة العربية .

الوصف النباتي : نبات عشبي حولي ، له عصارة صفراء اللون ، ويصل ارتفاعه إلى ٩٠ سم تقريباً ، أوراقه شائكة الحواف ، قواعدھا تحيط بالساق ، الأزهار مفردة طرفية لونها أصفر ، والثمرة علبة شوكية تفتح عند قمتھا ، وتحتوي عدداً من البذور الصغيرة .

السمية : يحتوي النبات على قلويدات بربرين *berberine* وسانجيناين *Sanginarine* وبروتوبين *protopine* ، وغيرها . ويكون تركيزها عالياً في البذور .

وهو من النباتات السامة وطعمه غير مستساغ ، ولذلك فإن حالات التسمم به قليلة .

غير أن الخطر يكمن في اختلاط بذور هذا النبات مع بذور أخرى كالقمح ، وعند أكلها فإنها تسبب الصرع .

وبالرغم من سميته الشديدة ، إلا أنه يستخدم في ليبيا كمدر للبول ومنوم ، أما البذور فتستخدم كملين ومقيء ، وتستخدم عصارة النبات لعلاج الصفراء .

(٢٣٣)

شوكران

الاسم الإنجليزي : Hemlock

الاسم اللاتيني : *Conium maculatum* L.

الفصيلة : الخيمية *Umbelliferae*

موطن النبات : السعودية ، ليبيا ، تونس ، الجزائر والمغرب .

الوصف النباتي : عشب معمر له جذور وتدية ، وأوراق مركبة ريشية تشبه السرخس ، ويحمل أزهارا صغيرة بيضاء في نورات خيمية مركبة ، والثمر في أزواج وجهها الداخلي مسطح ، ويسمونه بسبس برى في الجزائر .

الجزء الطبي : الثمار الغير الناضجة الجافة .

الجوهر الفعال : عدة قلويدات أهمها الكونين *Conine* والكونسين *Coniceine* وهي سامة .

السمية : تسبب المادة السامة شللا في العضلات ، فتشل السيقان والأذرع أولا ثم عضلات الصدر فتجعل التنفس أمرا صعبا ، وقد سقاه الإغريق القدماء لسقراط حينما حكموا عليه بالموت عام ٣٩٩ ق . م . ويقال إن سكان الجزيرة اليونانية كانوا يشربون كأسا من الشوكران السام حينما تتقدم بهم العمر ، وقد عرفه المصريون القدماء ، كما تسجل ذلك لفائف البردى القديمة سنة ٦٠٠ ق . م . وكان الرومان على علم تام بالشوكران السام . كانت الثمار تستعمل في الماضي كمادة مسكنة ومخدرة ، أما اليوم فيستعملها



(شوكران)

البعض من الظاهر ، وخصوصا ملح الكونين ، كمرهم لعلاج الدوالي
وبعض الأمراض الجلدية كالحشر وذلك لصفاته المسكنة .

(٢٣٤)

نجيل (نجم)

الاسم الإنجليزي : Burmuda grass

الاسم اللاتيني : *Cynodon dactylon* (L.) Pers.

الفصيلة : النجيلية Gramineae

موطن النبات : ينتشر النبات في أغلب البلدان العربية .

الوصف النباتي : عشب معمر ساقه زاحفة ، تخرج منها أفرع هوائية تحمل أوراقا رفيعة ،

ونورات سنبلية متفرعة تفرعا نجميا ، يميل لونها إلى الأحمر أو البنفسجي .

الجوهر الفعال : يحتوي النبات على بروتينات وألياف ودهون ونشويات وأملاح معدنية

متعددة وتتراثيرين Triterpines ووجد بالأوراق فلافونات flavons

وتريسينات triciens .



(نجيل)

الأثر الطبي : النبات يستعمل في الطب الشعبي بالعراق لإدرار العرق والبول ، ويستعمل لإيقاف النزيف ، وقابض . كما أن ريزوماته تستعمل لعلاج اضطراب الجهاز البولي والتناسلي .
يحتوى النبات في منطقة أمريكا على حامض الهيدروسيانيك hydrocyanic ، كما يحتوى على صابونيات ، ولذلك يعد ساما . غير أنه في العالم العربي لم تكشف التحاليل عن وجود أى سمية .

(٢٣٥)

دافنى

الاسم اللاتيني : *Daphne argustifolia*
الفصيلة : الشيميلية Thymelaeaceae
موطن النبات : حوض البحر المتوسط .
الوصف النباتي : شجرة تحمل أوراقا صغيرة ضيقة ، وأزهارا في نورات مشطية وثمارا لينة

برتقالية اللون .

الأثر الطبي

: يستخدم الأشوريون مغلى الأفرع لعلاج الروماتزم ، وفي الهند يستخدمون قلف الجذور والأوراق لعلاج بعض الأمراض . وفي بلوخستان يستخدمون مسحوق الأوراق مع الزيت والدقيق كلبخة لعلاج الحروق ، وفي أفغانستان يستخدمون الجذور كمسهل .

السمية

: النبات سام ، ولا تقربه الحيوانات .

وفي بلاد الشام نوع آخر يسمى **Daphne mezereum** وهو سام لاحتواء ثماره الحمراء ولحاءه على مادة **Mezerli cortex** السامة . وملامسة المحاء الرطب للجلد تحدث فيه قروحا وحروقا .

كما ينمو برياً بالسعودية النوعان **D. macronata** و **Daphne linearifolia** . وتحتاج إلى مزيد من الدراسة لمعرفة مكوناتها .

(٢٣٦)

العائق

الاسم الإنجليزي : Larkspur

الاسم اللاتيني : **Delphinium sp.**

الفصيلة : **Run unculaceae** الشقيقية

موطن النبات : من نباتات حوض البحر المتوسط ، وينتشر في أغلب دول شمال أفريقيا

والشام ، ويزرع بعض منها كنبات للزينة في أغلب دول العالم العربى .

الوصف النباتى : يشمل جنس العائق نباتات حولية وأخرى معمرة ، أوراقها راحية التعرق

مجزأة ، أزهارها تتجمع في نورات راسيمية طرفية ، ألوانها تتراوح بين الأبيض والوردى والبنفسجى ، أو مزيج من هذه الألوان .

وتتميز الزهرة في هذا الجنس بوجود مهماز في طرفها الخلفى ، والثمرة جرابية بها عدة بذور .

وأشهر الأنواع المنزرعة هو **D. ajacis L.** حيث إن أزهاره جميلة جدا ، مما يجعله نباتا مناسباً للزينة .



(عائق)

: أغلب أنواع العائق سامة ، خاصة البذور والبادرات والنباتات الحديثة
العمر . وتحتوى على قلويد الأجاسين Ajacine ، وقلويد الدلفينين
delephenine ، ومن أعراض التسمم بها اضطرابات في المعدة ،
واضطراب في الجهاز العصبي قد يؤدي إلى الموت ، خاصة في حالات
الأطفال . أما بالنسبة للماشية فإن تناول النبات يسبب لها إسهالا شديدا .

السمية

كحلة (حنة الفولة — تويد أمي)

الاسم الإنجليزي : Viper's buglass

الاسم اللاتيني : *Echium sp. L.*

الفصيلة : البوراجينية *Boraginaceae*

موطن النبات : تنتشر نباتات هذا الجنس في أغلب أقطار شمال أفريقيا ، وشبه جزيرة العرب ، وأقطار الخليج العربي والعراق .

الوصف النباتي : أعشاب خشنة الملمس ، تغطيها شعيرات كثيرة ، أوراقها بسيطة متبادلة على الساق ، أزهارها في نورات عقريية ، والثمار بندقة .

السمية : تحتوي أغلب نباتات هذا الجنس على قلويدات تعزى إليها سمية النباتات ، كما أن شعيرات الشائكة المنتشرة بكثرة على أغلب أجزاء النبات تعد عائقا ميكانيكيا أمام رعى الحيوانات .

غير أن النوع *E. vulgare* الذي ينمو بأوروبا يعتبر نباتا طبيا ، لذلك وجب دراسة أنواع هذا الجنس لمعرفة محتواها الكيميائي .



(كحلة)

(٢٣٨)

لبينة (لين)

الاسم الإنجليزي : Spurge .

الاسم اللاتيني : *Euphorbia* sp. L .

الفصيلة : اللبينية *Euphorbiaceae*

موطن النبات : ينتشر النبات في كافة الدول العربية .

الوصف النباتي : يشمل هذا الجنس عدة أنواع منها الحولى والمعمّر ، ومنها العشبي والشجيري ، وأحيانا تتحول بعض الأنواع فتصبح متشجحة في شكل نباتات الصبار ، غير أنها جميعا تتميز باحتوائها على عصارة لبنية بيضاء . كما أنها تتميز بوجود النورة اللبينية *Cyathium* والتي تحتوى على زهرة مؤنثة واحدة وعدد من الأزهار المذكرة التى تمثل كل واحدة منها سداة واحدة . وتعيش أنواع هذا الجنس فى بيئات متباينة حتى أن بعضها يصل إلى شواطئ البحر مثل *E. Paralias* .

السمية

: تعد معظم نباتات جنس اللبينية سامة ، لاحتوائها على مركبات الفوربول *Phorbol* والدايتربين والتي تكون ضمن العصارة اللبينية . وهى تحدث اضطرابات فى الجهاز الهضمي والتهابات فى الفم وإسهالا . وبالرغم من سمية أنواع هذا الجنس ، فإن بعض الأنواع تستخدم ضمن وصفات الطب الشعبى مثل *E. echinus* التى تسمى أفرنان بالمغرب والتى يستعمل لبنها كعقار يطرى . ويدخل اللبن أيضا ضمن وصفات العقاقير التى تستخدم لعلاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما . كما أن لبن نوع *E. helioscopia* يستعمل كملين نباتي . أما لبن *E. peplus* فيستعمل كمدر للبول ، وفى علاج الأزمات الصدرية ، مما يوجب دراسة هذه الأنواع وبحثها لاستخلاص مواد فعالة جديدة .



(لينة)

(٢٣٩)

بنت القنصل

الاسم الإنجليزي : Easter flower

الاسم اللاتيني : *Euphorbia Pulcherrima* Willd.

الفصيلة : Euphorbiaceae اللبينية

موطن النبات : يزرع في معظم البلاد العربية للزينة .

الوصف النباتي : عشب دائم الخضرة ، يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار ، ويحمل النبات نوريات لبينية ، وهى نوريات محدودة اختزلت كثيرا بحيث تتركب النورة من زهرة واحدة مؤنثة تشغل طرف النورة ، يحيط بها خمس مجموعات من الأزهار المذكرة ، تحاط النورات بقنايات كبيرة حمراء تشبه الزهرة فى شكلها . وللنبات أوراق بسيطة مفصصة .



(بت الفصل)

السمية : وتحتوى الأوراق على flavonoids kaempferol وروتين ومواد استيرودية .

ويحتوى النبات ، ككل نباتات الفصيلة اللبينية ، على اللبن النباتى السام والذي يسبب آلاما شديدة عند لمسه ، وهو مسهل شديد ومقيء أيضا .

(٢٤٠)

غبرة

الاسم الإنجليزى : Heliotrope



(غبرة)

- الاسم اللاتيني : *Heliotropium* sp. L.
الفصيلة : البوراجينية Boraginaceae
موطن النبات : معظم الدول العربية .
الوصف النباتي : شجيرات خشنة الملمس تحمل أزهارا بيضاء أو صفراء ، محمولة في نوريات عقربية ؛ والثمار أربع بندقات كما في الكحلة .
ويوجد بمصر ١٤ نوعا من الغبرة تنمو برياً بين المزارع وفي الصحارى ، منها الشجيرة ومنها العشبية ، ويوجد بالسعودية ١١ نوعا .

السمية : تقتات بعض الحيوانات على بعض الأنواع ، ولكن البعض الآخر يحتوى على قلويدات تسبب تسمما كبديا يؤدي إلى الوفاة . ومن الأنواع التى تقتات عليها الحيوانات *H. ramosissimum*, *H. bassiferum* .

(٢٤١)

بوقراد

الاسم اللاتينى : *Hypericum triquetrifolium* Turra :
الفصيلة : *Hypericaceae* الهيريكية :
موطن النبات : يوجد النبات فى منطقة شمال أفريقيا ، كما ينتشر فى أغلب دول البحر المتوسط .
الوصف النباتى : نبات عشبي معمر ، قائم أو شبه قائم ، له عدة أفرع تنتشر عليها عدة غدد ، أوراقه رمحية مثلثة حوافها متموجة ، أزهاره صفراء ، والثمار علبة بيضاوية الشكل .
السمية : تدل التقارير على أن النبات سام للماشية ، خاصة الماعز ، حيث يسبب لها انتفاخ البطن . ويسبب الحساسية للإنسان عند لمس الأوراق والأزهار أثناء الفترات المضيفة . والمركب الفعال هو الهيريسين *Hypericin* .

(٢٤٢)

لانتانا

الاسم الإنجليزى : *Lantana* :
الاسم اللاتينى : *Lantana camara* L. :
الفصيلة : *Verbenaceae* الفربيونية :
موطن النبات : أمريكا الاستوائية ، وأدخلت زراعته إلى أغلب دول العالم العربى كنبات للزينة ، خاصة على أسبجة الحدائق .



(لانتانا)

الوصف النباتي : نبات شجيري شائك ، أوراقه بيضيه خشنة الملمس ، حوافها مسننة ، أزهاره وردية صفراء في بداية تفتحها ، يتغير لونها إلى الأحمر أو البرتقالي تدريجيا ، لها رائحة طيبة ، توجد في نورات شبه خيمية ، الثمار حسلية سوداء كروية ، وبها بذرتان .

يعد النبات ساما للإنسان والحيوان ، وهو الذى يسبب مرض « الأنف البنفسجي » فى الماشية . وأهم أعراض التسمم هى الحساسية الضوئية ، واضطراب القناة الهضمية . وأهم المركبات التى وجدت فى ثمار هذا النبات هو أحد مشتقات الترايتربين (اللنتادين) Triterpines ومظاهر

السمية

التسمم به تشبه أعراض التسمم بالأترويين .
: تفيد الأجزاء النباتية المغلية فى علاج التيتانوس Tetanus والروماتزم
والمالاريا ، كما تستعمل أوراق النبات فى عمليات الإسعاف الأولية ضد
لدغة العقرب .

ومؤخرا اكتشف نوعان ينموان برياً فى السعودية ، هما : *L. salvifolia* ،
L. viburnoides ولا زالا فى حاجة إلى معرفة مكوناتهما .

(٢٤٣)

قرن الغزال (رجل العصفور)



(قرن الغزال)

- الاسم الإنجليزي : Babies' slippers (Bird foot)
الاسم اللاتيني : *Lotus corniculatus* L.
الفصيلة : البقولية (القرنية) Leguminosae
موطن النبات : مصر ، ليبيا ، السعودية ، العراق .
الوصف النباتي : عشب معمر ، يحمل أوراقا مركبة من ٣ وريقات مؤذنة ، وأزهارا صفراء
أو حمراء ، وثمارا قرنية ضيقة طويلة .
الجزء الطبي : النبات كله .
الجوهر الفعال : يحتوي النبات على جلو كوسيد سيانوجيني Cyanogene glycosides
الأثر الطبي : يستخدم النبات كقابض ويعمل على التام الجروح ، وهو في نفس الوقت
نبات سام ، ولكن سميته خفيفة لا تضر الإنسان .
وهناك نوع آخر هو *L. arabicus* ينتشر على ضفاف النيل ، وهو سام جدا
عندما يكون في أطوار نموه الأولى ، وخاصة قبل نضج البذور ، لاحتوائه
— وهو في هذا الطور — على كميات وافرة من حمض الهيدروسيانيك
Hydrocyanic acid ، ولكن متى تم نضج النبات يفقد سميته .

(٢٤٤)

هليوب (مريقة)

- الاسم الإنجليزي : Annual Merlury
الاسم اللاتيني : *Mercurialis annus* L.
الفصيلة : اللبينية Euphorbiaceae
موطن النبات : حوض البحر المتوسط ، ومنتشر في أغلب دول شمال أفريقيا من العالم
العربي .
الوصف النباتي : نبات عشبي حولي ، غالبا ما يكون ثنائي المسكن ، أوراقه بسيطة بيضوية
إلى رمحية الشكل ، مسننة الحافة ، الأزهار المذكرة تتجمع في نورات
سنبلية خضراء سائبة ، أما المؤنثة فهي وحيدة إبطية لونها أخضر ، والثمرة
علبة بيضاوية الشكل تحتوي على بذرتين .
السمية : ترجع سمية النبات إلى وجود عصارة وزيت طيارة به ، تسبب



(هليوب)

اضطرابات شديدة في الجهاز العصبي والهضمي للإنسان والحيوان ، كما
تسبب حبوب القاع بعض أنواع الحساسية .

(٢٤٥)

بصل الخنش

الاسم الإنجليزي : Star of Bethlehem

الاسم اللاتيني : *Ornithogalum* sp. L.

الفصيلة : Liliaceae الزنبقية

موطن النبات : مناطق شمال أفريقيا .

الوصف النباتي : عشب معمر له بصلة وأوراق شريطية ، ويحمل الأزهار في سورات
راسيمية ، والأوراق الزهرية مرتبة فيما يشبه النجمة ، والأزهار بيضاء أو
مخضرة .



(بصل الحنش)

يوجد بمصر ثلاثة أنواع من الجنس *Ornithogalum* أكثرها انتشارا *O. trichophyllum* ويوجد بكثرة في حقل الشعير .
: كل أجزاء النبات سامة لاحتوائها على Cardiac glycosides ، وهذا الجليكوسيد بسبب اضطرابا معويا وغثيان .
في ميرلاند Maryland بأمریکا حدث تسمم لألف من الخراف في سنة واحدة ، وكان السبب تناولها بصل الحنش *O. umbellatum* .
وفي شرق أفريقيا حدث نفس التسمم لعدد كبير من الماشية كنتيجة لأكلها نبات *O. Longibracteatum* .
وفي العراق يوجد النوعان *O. lentiufolium* , *O. narbonense* ولقد ثبت أنهما سامان للحيوانات .

السمية

قضب (برسيم حجازى ، صفصفا)

الاسم الإنجليزى : Alfalfa

الاسم اللاتينى : *Medicago sativa* L.

الفصيلة : البقولية (القرنية) *Leguminosae*

موطن النبات : يزرع لغرض العلف فى أغلب الدول العربية .

الوصف النباتى : عشب معمر ، يصل ارتفاعه إلى ٨٠ سم ، له أوراق مركبة وتتركب كل ورقة من ثلاث وريقات ، ويحمل الساق أزهارا زرقاء أو بنفسجية ، والقرون صغيرة ملتفة على نفسها .



(قضب)

السمية

: وجود صابونيات التريتربين triterpene saponines في الأوراق ، ولذلك فهو سام للحيوانات في بعض البلاد ، وعليه يجب قطع النبات وتركه في الشمس لفترة قبل أن يقدم للماشية ، حيث ثبت أن ذلك يقضى على السمية .
وفي الطب تستخدم البذور لإدرار الطمث وعمل لبخات في حالات الحروق .



(حندقوق)

(٢٤٧)

حندقوق (تيفال ، حندقوقه)

الاسم الإنجليزي : Yellow sweet clover

الاسم اللاتيني : *Melilotus indica* L.

الفصيلة : البقولية (القرنية) *Leguminosae*

موطن النبات : كل دول العالم العربى .

الوصف النباتى : أعشاب صغيرة حولية ، تحمل أوراقا مركبة خيطية أو عريضة ، وتتركب

الورقة من ثلاث وريقات ، والأزهار صغيرة بيضاء أو صفراء محمولة فى

نورات راسيمية طويلة ، والثمار قرنية صغيرة بيضاوية الشكل .

السمية : بعض أنواع الحندقوق سامة لوجود فطر يتطفل على بعض أنواع هذا

الجنس . ويفرز مادة الكومارين coumarine التى تسبب نزيفا داخليا

يسبب الوفاة . وبالرغم من أن بعض الأنواع سامة ، إلا أنها تستخدم فى

العراق كملين وكمليخة لعلاج الأورام ، أما البذور فتستخدم لعلاج

التبول عند الاطفال .

(٢٤٨)

حمد (عرق الليمون — حميض)

الاسم الإنجليزي : Indian Sorrel

الاسم اللاتيني : *Oxalis corniculata* L.

الفصيلة : الأكساليديية *Oxalidaceae*

موطن النبات : شمال أفريقيا والعراق .

الوصف النباتى : عشب له أوراق مركبة ثلاثية الوريقات ، والأزهار محمولة على نورات

محدودة ، وهى صفراء اللون والثمرة علبة تفتح تفتح مسكينا .

وللنباتات عصير حريف لاحتوائه على أو كسالات الكلسيوم ، والأوراق

تؤكل كسلطة أو خضار أو تطبخ . غنية بفيتامين (C) والكاروتين ، وكذلك

غنية بالكلسيوم .



(حمد)

وقد ثبت أن خلاصة النبات لها القدرة على القضاء على البكتريا (gram +)
: للنبات خاصية قابضة وطاردة للديدان ومدررة للطمث ، ومطهرة ،
والعصارة الطازجة للنبات تعالج فقر الدم والبواسير وحموضة المعدة .
وفي الهند يستخدم النبات كمنفّس ومصلح للمعدة وفتح للشهية .
ويعطى في حالات الحمى والدستاريا وإصابة الكبد أما منقوع النبات
فيستخدم لعلاج العيون . كما أن العصارة تستخدم لعلاج التسمم
بالداتورة .

الأثر الطبي

وقد استخلصت من النبات مادة متبلورة تسبب التسمم عند الحيوانات ،
كما أنه قد لوحظ أن بعض الوفيات قد حدثت لأشخاص بعد تناولهم لهذا
النبات .

علقة

- الاسم اللاتيني : *Pergularia tomentosa* L.
الفصيلة : *Asclepiadaceae* العشارية
موطن النبات : يوجد هذا النبات في أغلب المناطق الصحراوية في شمال أفريقيا والسعودية .
الوصف النباتي : نبات معمر ، أغصانه ملتفة على بعضها ، له عصارة لبنية ، وأوراقه قلبية الشكل ، أزهاره بيضاء مخضرة إلى ترابية اللون وبها بقع بنفسجية غامقة و تتجمع في نورات ، الثمار جرابية مستدقة الأطراف ، غالبا ما تكون مزدوجة ، عليها نتوءات شائكة ، تحوى عدة بذور .
السمية : يتميز نبات العلقه برائحته الكريهة ، الأمر الذى ينفر الأغنام والماشية من رعيه . كما أن عصارتها تستعمل لغسل الشعر من الجلود قبل دباغها .



(علقه)

ويستعمل في وسط أفريقيا لتسميم الأسماك . وعلى الرغم من أن نبات
العلاقة لم يدرس من الناحية الكيميائية ، غير أن أنواعا أخرى من نفس
الجنس مثل (*P. daemia* Chiov.) وجد أنها تحتوى على قلويد الدامين
وجلو كوسيد مر . كما أن *P. garipensis* N.E.Br. يعد من النباتات السامة
للأغنام سواء كان غضا أم جافا .

(٢٥٠)

عقيق (زعلته — زغليل)

الاسم الإنجليزي : Marsh crowfoot

الاسم اللاتيني : *Ranunculus sceleratus* L.

الفصيلة : الشقيقية *Ranunculaceae*

موطن النبات : سواحل البحر المتوسط من مصر حتى المغرب .




(عقيق)

الوصف النباتي : عشب حولي أملس يحمل أزهارا صغيرة صفراء أو حمراء ، وأوراقا مفصصة راحية ، لها أعناق طويلة جدا ، والثمار أكينية منضغطة لها مناقير قصيرة .

الجوهر الفعال : Drotoamemonin وهو سام للأغنام .

الأثر الطبي : في الطب الشعبي تستخدم الصبغة الناتجة من الأوراق والسيقان لعلاج بعض الأمراض الجلدية كالبثور والإكزيما ، كما يستخدم النبات كمقو ونافع لعلاج السيلان .

وفي الجزائر والمغرب يوجد نوع آخر اسمه كف الجرفة أو كف الهر ، واسمه العلمي *Ranunculus macrophyllus* L. وتستخدم جذوره المطحونة والمخلوطة كعقار مسهل مشهور ، كما يستعمل كمقيئ ضد السموم .



(زهر إيطالي)

(٢٥١)

الزهر الإيطالي

- الاسم اللاتيني : *Robinia Pseudoacacia L.*
الفصيلة : البقولية (القرنية) *Leguminosae*
موطن النبات : يوجد النبات في كثير من المدن الرئيسية في دول شمال أفريقيا ، غير أن موطنه الأصلي أمريكا الشمالية .
الوصف النباتي : شجرة متوسطة الحجم ، شائكة ، أوراقها مركبة ، أزهارها بيضاء أو وردية ذات رائحة طيبة ، تتجمع في نورات ، تتدلى إلى أسفل ، الثمار قرنية .
السمية : يعد من النباتات السامة لوجود مركب الروبين وقلويد الروبيتين ، وهما يوجدان في القشرة الداخلية لسوق وأفرع النبات والأوراق الغضة والبذور .
والنبات يعد ساما للإنسان خاصة للأطفال وعدد كبير من الأنواع الحيوانية الأخرى ، غير أن نسبة الوفيات التي يحدثها قليلة جدا ..

(٢٥٢)

حماض (حميض ، حمضة)

- الاسم الإنجليزي : *Sorrel Dock*
الاسم اللاتيني : *Rumex sp.*
الفصيلة : الحامضية *Polygonaceae*
موطن النبات : شمال أفريقيا ، الكويت ، قطر ، السعودية والسودان
الوصف النباتي : أعشاب هذا الجنس لها أوراق بسيطة متبادلة ، وتمتاز بأزهارها الصغيرة الخضراء المتجمعة في مجموعات لإبطية ، ومنها يتحول المحيط الزهري إلى غلاف مجنح أو شوكة يغلف الثمرة ، ويحمر لونه عند نضجه .



(حماض)

السمية

: تحتوى بعض الأنواع على أوكسالات كما في نبات **R. acetosa** السامة .
وفي قطر والإمارات تؤكل بعض الأنواع الغير السامة كنوع من الخضار .
وتحتوى هذه النباتات على تانينات ومواد قابضة مضادة للنزيف . كما
يستخدم النوع **R. crispus** كملين ومقو في بعض البلدان الأوروبية .
وتحتوى بعض الأنواع على مادة Rumicin التى تستخدم فى شكل
مسحوق لعلاج القرح والتقيحات .

عنب الديب

الاسم الإنجليزي : Black night shade

الاسم اللاتيني : *Solanum nigrum* L.

الفصيلة : الباذنجانية *Solanaceae*

موطن النبات : ينتشر النبات في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا والسودان والسعودية والخليج والشام .

الوصف النباتي : نبات عشبي حولي إلى معمر ، أوراقه بيضية إلى مثلبة ، أزهاره بيضاء في نورات راسيمية ، الثمار لبية ، غالبا ما يكون لونها أسود عند نضجها ، بها عدة بذور .

السمية : يحتوي النبات على glycoalkaloids أهمها solanine ، وإذا تحلل يعطى Trisaccharides أو Di - Alkamine glycones هو من ال Steroids وهو



(عنب الديب)

المستول عن الاضطرابات العصبية التي تحدث عند تناول الثمار الغير الناضجة ، حيث إنها هى الجزء السام فى النبات ، أما عند نضجها فتصبح غير سامة . كما أن أوراق النبات غير سامة ، وتؤكل كالجرير .

(٢٥٤)

حريق

الاسم الإنجليزي : Nettle



(حريق)

- الاسم اللاتيني : *Urtica pilulifera* L.
- الفصيلة : *Urticaceae* الحريقية
- موطن النبات : سواحل البحر المتوسط ، وشبه الجزيرة العربية والإمارات .
- الوصف النباتي : عشب حولي يحمل أوراقا بسيطة متقابلة ذات حواف مسننة ، والنبات كله مغطى بشعيرات لاسعة *Stinging hairs* وللنبات ثمار كروية تحمل على حوامل طويلة .
- وهناك نوع آخر من الجنس *urtica* ينمو برياً في البلاد العربية المطلة على البحر المتوسط والمملكة السعودية ويسمى أيضاً حريق *Urtica urens* L. كما يسمونه شعر العجوز .
- الأثر الطبي : يستخدم في الطب الشعبي لعلاج الروماتزم ، والإمساك والإدماء ، وأمراض الكبد ، ويستخدم منقوع ومغلى الأوراق لإدرار البول وأمراض كثيرة أخرى .
- والاسم اللاتيني مشتق من الكلمة اللاتينية *Uro* ومعناها يحرق أو يلذع ، وذلك لخاصيته اللاذعة إذا ما لامس أى جزء من الجسم ، نظراً لاحتوائه لحمض الفورميك *formic acid* الذى يفرز بواسطة الغدد التى تنتشر على كل أجزاء النبات . ونباتات هذا الجنس تعد من النباتات السامة لاحتوائها على الأستيكولين *acetocoline* ومواد أخرى تشبه الهستامين - *histamine-like* وهى التى تحدث الأثر الحارق للجلد .
- ولقد وصف ديوسكوريدس هذا النبات كعقار ضد ضعف المفاصل ، كما يوصف ضد النزيف . وقد قيل إن محتويات الشعيرات اللاسعة تشفى من الروماتيزم . وإذا أكل النبات يحدث آلاماً في البطن وقيئاً .


الفول (باقلاء)

الاسم الإنجليزي : Broad bean

الاسم اللاتيني : *Vicia faba* L.

الفصيلة : البقولية (القرنية) Leguminosae

موطن النبات : يزرع في معظم البلاد العربية .



(فول)

الوصف النباتي : نبات حولي متسلق وليس له محاليق . والأوراق مركبة وتتركب كل ورقة من زوجين أو ثلاثة أزواج من الوريقات ، أزهاره بيضاء عليها بقع سوداء ، والثمار قرنية ، والبذور ملونة باللون الأحمر أو الأسود أو الأخضر .

والفول من البقول المنتشرة والمحبوبة في الوطن العربي ، ويزرع من أيام قدماء المصريين ، وقد عرفوا التدميس وهي الطريقة التي تستخدم اليوم في مصر وبعض الأقطار العربية الأخرى . وقد يسبب أكل الفول لعدة أيام أنيميا حادة Hemolytic anemia لبعض الأشخاص ، وتعرف هذه الحالة بالـ Fabism وتكون نتيجة لنقص في أنزيم خاص يسمى Glucose - 6-phosphate dehydrogenases عند هؤلاء الأشخاص ، وخاصة بعض أهالي البحر المتوسط (إيطاليا واليونان) . وقد لوحظ أن هذه الظاهرة موجودة بنسبة ١ ٪ بين البيض ١٥ ٪ بين الملونين .

(٢٥٦)

سم الفراخ



(سم الفراخ)

- الاسم اللاتيني : *Withania somnifera* L .
الفصيلة : الباذنجانية *Solanaceae*
موطن النبات : دول شمال البحر المتوسط .
الوصف النباتي : عشب قائم يحمل أوراقا بيضاوية مستطيلة ، وأزهارا مفردة إبطية خضراء شاحبة اللون ، وثمارا لينة كروية مغلفة بالكأس الدائم ، وتحوى بذورا كلوية الشكل حمراء اللون .
السمية : وترجع سمية النبات إلى وجود بعض القلويدات في الثمار مثل السمنيفيرين *Somniferine* والواتانين *Wathanine* .
ومن أعراض التسمم حدوث آلام شديدة في القناة الهضمية .

فهارس النباتات الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربي

المصطلحات والرموز المستعملة في الفهارس

موطن النبات

نبات منزرع أو نبات برى ، والأرقام تشير إلى المناطق كما يلي :

١ — مجموعة شمال أفريقيا وتشمل :

مصر — ليبيا — تونس — الجزائر — المغرب — موريتانيا .

٢ — مجموعة شرق البحر المتوسط وتشمل :

سوريا — العراق — الأردن — لبنان — فلسطين .

٣ — مجموعة شرق البحر الأحمر وتشمل :

السعودية — عمان — الكويت — البحرين — قطر — الإمارات .

٤ — مجموعة غرب وجنوب البحر الأحمر وتشمل :

السودان — اليمن الشمالية — اليمن الجنوبية — الصومال — جيبوتي .

التركيب الكيميائي للنباتات

٣	نباتات تحتوى على قلويدات .	⊙	نباتات تحتوى على مواد مخاطية ولين وصمغ
△	نباتات تحتوى على جليكوسيدات	+	نباتات تحتوى على راتنجات وبلاسم وتانينات
■	نباتات تحتوى على زيوت طيارة .	×	نباتات سامة .
★	نباتات تحتوى على زيوت دهنية .	?	نباتات لا يعرف محتواها .

I فهرس النباتات الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربي مرتبة في مجموعات وحسب تركيبها الكيماوى

أولا : مجموعة النباتات الطبية التى تحتوى على قلويدات (•)

رقم النبات	الاسم العربى	الفصيلة	الاسم اللاتينى
١	قيصوم — إخيلىا — بعثران	Compositae	1. Achillea fragrantissima
٢	اندروسيميم — تيكوت	Liliaceae	2. Androcymbium gramineum
٣	عنصل — الجراى	Liliaceae	3. Asphodelus microcarpus
٤	بيلادوننا — ست الحسن	Solanaceae	4. Atropa belladonna
٥	عود ريح مغربى	Berberidaceae	5. Berberis vulgaris
٦	بقم	Leguminosae	6. Caesalpinia sappan
٧	فلفل شطة	Solanaceae	7. Capsicum annuum
٨	قات	Celastraceae	8. Catha edulis
٩	ونكا — فنكا	Apocynaceae	9. Catharanthus roseus
١٠	عروق صفر — ممران	Papaveraceae	10. Chelidonium majus
١١	بن — قهوة	Rubiaceae	11. Coffea arabica
١٢	عكنة — سورنجان	Liliaceae	12. Colchicum autumnale
١٣	داتورة	Solanaceae	13. Datura stramonium
١٤	ايفيدرا — عدام	Ephedraceae	14. Ephedra alata
١٥	كليلة — بقلة الملك	Fumariaceae	15. Fumaria officinalis
١٦	قرن الجديان	Papaveraceae	16. Glaucium flavum
١٧	سكران	Solanaceae	17. Hyocyamus muticus
١٨	جهيرة	Papaveraceae	18. Hypecoum procumbens
١٩	رقف	Berberidaceae	19. Leontice leontopetalum
٢٠	ترمس	Leguminosae	20. Lupinus termis
٢١	أزادرخت — تيم — زنزخت	Meliaceae	21. Melia azadirachta
٢٢	شب الليل	Nyctaginaceae	22. Mirabelis jalapa
٢٣	طبايق — دخان	Solanaceae	23. Nicotiana tabacum
٢٤	سوسن — بصيل	Amaryllidaceae	24. Pancratium maritimum

رقم النبات	الاسم العرفي	الفصيلة	الاسم اللاتيني
٢٥	خشخاش برى	Papaveraceae	25. <i>Papaver rhoeas</i>
٢٦	خشخاش — أبو النوم	Papaveraceae	26. <i>Papaver somniferum</i>
٢٧	حرمل	Zygophyllaceae	27. <i>Peganum harmala</i>
٢٨	فلفل أسود	Piperaceae	28. <i>Piper nigrum</i>
٢٩	رمان	Punicaceae	29. <i>Punica granatum</i>
٣٠	مسواك — أراك	Salvadoraceae	30. <i>Salvadora persica</i>
٣١	مرير — مرار	Compositae	31. <i>Senecio vulgaris</i>
٣٢	تيكوما	Bignoniaceae	32. <i>Tecoma stans</i>
٣٣	دقن الشيخ	Zygophyllaceae	33. <i>Tribulus terrestris</i>
٣٤	حلبة	Leguminosae	34. <i>Trigonella foenum graecum</i>

ثانيا : مجموعة النباتات الطبية التى تحتوى على جليكوسيدات وصابونيات (△)

٣٥	عين الديك — ناب الجمل	Ranunculaceae	35. <i>Adonis aestivalis</i>
٣٦	شجرة السماء	Simarubaceae	36. <i>Ailanthus glandulosa</i>
٣٧	دقن الباشا — لنج	Leguminosae	37. <i>Albizia lebbek</i>
٣٨	صبار — صبر	Liliaceae	38. <i>Aloe barbadensis</i>
٣٩	كف مريم	Cruciferae	39. <i>Anastatica heerochuntica</i>
٤٠	بابونج رومانى	Compositae	40. <i>Matricaria chamomilla</i>
٤١	شيخ	Compositae	41. <i>Artemisia herba-alba</i>
٤٢	قطف — إسفناخ	Chenopodiaceae	42. <i>Atriplex hortensis</i>
٤٣	بلح الصحراء	Zygophyllaceae	43. <i>Balanites aegyptiaca</i>
٤٤	خف الجمل	Leguminosae	44. <i>Bauhenia variegata</i>
٤٥	بتولا — تامول	Belutaceae	45. <i>Betula alba</i>
٤٦	خردل أبيض أو أسود	Cruciferae	46. <i>Brassica sp.</i>
٤٧	لعة مرة — عليق	Cucurbitaceae	47. <i>Bryonia cretica</i>
٤٨	كبار — لصف	Capparidaceae	48. <i>Capparis spinosa</i>
٤٩	كيس الراعى	Cruciferae	49. <i>Capsella bursa pastoris</i>
٥٠	خيار شنبر	Leguminosae	50. <i>Cassia fistula</i>
٥١	سنامكى — سنامكة — سنا	Leguminosae	51. <i>Cassia acutifolia</i>
٥٢	حنظل — علقم	Cucurbitaceae	52. <i>Citrullus colocynthis</i>

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الاسم العرفي	رقم النبات
53. Crataegus oxyacantha	Rosaceae	زعرور	٥٣
54. Crocus sativa	Iridaceae	زعفران	٥٤
55. Digitalis purpurea	Scrophulariaceae	ديجيتالس - صمغ العذراء	٥٥
56. Dodonaea viscosa	Sapindaceae	دودونيا	٥٦
57. Dolichos lablab	Leguminosae	لبلاب	٥٧
58. Duranta repens	Verbenaceae	ديورانتا	٥٨
59. Eriobotrya japonica	Rosaceae	بشملة	٥٩
60. Erodium cicutarium	Geraniaceae	دهية أبو بكر	٦٠
61. Eryngium campestre	Umbelliferae	شفاقيل	٦١
62. Fagonia bruguieri	Zygophyllaceae	خشيات - فاجونيا - طليحة	٦٢
63. Glycyrrhiza glabra	Leguminosae	عرق سوس	٦٣
64. Hedera helix	Araliaceae	حب المساكين	٦٤
65. Hibiscus rosa-sinensis	Malvaceae	حب المسك	٦٥
66. Hibiscus sabdariffa	Malvaceae	كر كديه	٦٦
67. Lippia nodiflora	Verbanaceae	بليحة - ليبيا	٦٧
68. Morus sp.	Moraceae	توت أبيض أو أسود	٦٨
69. Nasturtium officinalis	Cruciferae	رشاد	٦٩
70. Nerium oleander	Apocynaceae	دفلة	٧٠
71. Nicotiana glauca	Solanaceae	صاص	٧١
72. Nigella sativa	Ranunculaceae	ة البركة - الحبة السوداء	٧٢
73. Polygonum aviculare	Polygonaceae	اب	٧٣
74. Populus pyramidalis	Salicaceae		٧٤
75. Rheum officinalis	Polygonaceae		٧٥
76. Rubia tinctorum	Rubiaceae		٧٦
77. Ruscus aculeatus	Liliaceae		٧٧
78. Ruta graveolens	Rutaceae		٧٨
79. Salix sp.	Salicaceae		٧٩
80. Sambucus nigra	Caprifoliaceae		٨٠
81. Vaccaria pyramidata	Caryophyllaceae		٨١
82. Sida jamaicensis	Malvaceae		٨٢
83. Spinacea oleracea	Chenopodiaceae		٨٣

رقم النبات	الاسم العربى	الفصيلة	الاسم اللاتينى
٨٤	تمر هندى	Leguminosae	84. Tamarindus indica
٨٥	بصل فرعون	Liliaceae	85. Urginea maritima
٨٦	خرمة	Scrophulariaceae	86. Verbascum sinuatum
٨٧	رجل الحمام	Verbenaceae	87. Verbena officinalis
٨٨	بنفسج	Violaceae	88. Viola odorata

ثالثا : مجموعة النباتات الطبية التى تحتوى على مواد مخاطية وصموغ ولبن نباتى (٥)

٨٩	سنت — سيال	Leguminosae	89. Acacia sp.
٩٠	إنجيل — نجم	Gramineae	90. Agropyron repens
٩١	خطمية	Malvaceae	91. Althaea officinalis
٩٢	كثيرا	Leguminosae	92. Astragalus gummifer
٩٣	شوك القناد	Leguminosae	93. Astragalus spinosus
٩٤	عشار	Asclepiadaceae	94. Calotropis procera
٩٥	خرشيف	Compositae	95. Carduus benedictus
٩٦	باباظ	Caricaceae	96. Carica papaya
٩٧	شيكوريا	Compositae	97. Cichorium intybus
٩٨	كليرودندرون — الياسمين الزفر	Verbenaceae	98. Clerodendron inerme
٩٩	عليق	Convolvulaceae	99. Convolvulus arvensis
١٠٠	مخيط	Boraginaceae	100. Cordia myxa
١٠١	تين	Moraceae	101. Ficus carica
١٠٢	جميز	Moraceae	102. Ficus sycomorus
١٠٣	خبيزة	Malvaceae	103. Malva sp.
١٠٤	ودنة — أتم — مصيص	Plantaginaceae	104. Plantago sp.
١٠٥	لسان الحمل	Plantaginaceae	105. Plantago major
١٠٦	ثيفتيا — دفل أصفر	Apocynaceae	106. Thevetia nerifolia
١٠٧	حرجل	Asclepiadaceae	107. Solenostemma argel
١٠٨	جعضيض — جلوين	Compositae	108. Sonchus oleraceus

رابعاً : مجموعة النباتات الطبية التي تحتوى على راتنجات وبلاسم وتانينات (+)

رقم النبات	الاسم العربى	الفصيلة	الاسم اللاتينى
١٠٩	تنوب	Pinaceae	109. <i>Abies alba</i>
١١٠	كزبرة البئر	Polypodiaceae	110. <i>Adiantum capillus veneris</i>
١١١	حورة	Betulaceae	111. <i>Alnus glutinosa</i>
١١٢	كندر — لبان دكر	Burseraceae	112. <i>Boswellia carterii</i>
١١٣	حشيش — قنب هندى	Cannabinaceae	113. <i>Cannabis sativa</i>
١١٤	كازورينا	Casuarinaceae	114. <i>Casuarina equisetifolia</i>
١١٥	مر — عوجة	Burseraceae	115. <i>Commiphora myrrha</i>
١١٦	سرو	Cupressaceae	116. <i>Cupressus sempervirens</i>
١١٧	حلتيت	Umbelliferae	117. <i>Ferula assa-foetida</i>
١١٨	حشيشة الدينار	Moraceae	118. <i>Humulus lupulus</i>
١١٩	حناء	Lythraceae	119. <i>Lawsonia inermis</i>
١٢٠	تين شوكى	Cactaceae	120. <i>Opuntia ficus-indica</i>
١٢١	صنوبر	Pinaceae	121. <i>Pinus sylvestris</i>
١٢٢	مصطكى — فستق	Anacardiaceae	122. <i>Pistacia lentiscus</i>
١٢٣	توت شوكى	Rosaceae	123. <i>Rubus fruticosus</i>
١٢٤	أتل	Tamaricaceae	124. <i>Tamarix sp.</i>
١٢٥	غرغار	Ulmaceae	125. <i>Ulmus campestris</i>

خامساً : مجموعة نباتات طبية أخرى لا تدخل ضمن المجاميع الأربعة السابقة (?)

١٢٦	أدهاتودا	Acanthaceae	126. <i>Adhatoda vasica</i>
١٢٧	أجاف	Agavaceae	127. <i>Agave sisilana</i>
١٢٨	عقول — شوك الجمال	Leguminosae	128. <i>Alhagi maurorum</i>
١٢٩	دمسيية	Compositae	129. <i>Ambrosia maritima</i>
١٣٠	عود العطاس	Compositae	130. <i>Anacyclus pyrethrum</i>
١٣١	أناناس	Bromeliaceae	131. <i>Ananas comosus</i>
١٣٢	هليون — كشك ألماظ	Liliaceae	132. <i>Asparagus officinalis</i>
١٣٣	كرنب	Cruciferae	133. <i>Brassica oleracea v. capitata</i>
١٣٤	حشيشة العقرب	Gentianaceae	134. <i>Centaurium spicatum</i>
١٣٥	هندباء	Compositae	135. <i>Cichorium pumilum v. endivia</i>

رقم النبات	الاسم العربى	الفصيلة	الاسم اللاتينى
١٣٦	قاوون	Cucurbitaceae	136. Cucumis melo
١٣٧	خيار	Cucurbitaceae	137. Cucumis sativa
١٣٨	حب العزيز	Cyperaceae	138. Cyperus esculentus
١٣٩	سرسوع	Leguminosae	139. Dalbergia sisso
١٤٠	بزيط	Cucurbitaceae	140. Ecbalium elaterium
١٤١	علقة	Onagraceae	141. Epilobium hirsutum
١٤٢	جرجير	Cruciferae	142. Eruca sativa
١٤٣	خس	Compositae	143. Lactuca sativa
١٤٤	مانجو	Anacardiaceae	144. Mangifera indica
١٤٥	بصل الذئب	Liliaceae	145. Muscari comosum
١٤٦	حريقة — لسان الطير	Urticaceae	146. Parietaria officinalia
١٤٧	نخيل البلح	Palmae	147. Phoenix dactylifera
١٤٨	بسلة	Leguminosae	148. Pisum sativum
١٤٩	رجلة	Portulacaceae	149. Portulaca oleracea
١٥٠	خرشوف	Compositae	150. Cynara scolymus
١٥١	عناّب	Rhamnaceae	151. Zizyphus jujuba
١٥٢	سدر — نبق	Rhamnaceae	152. Zizyphus spina-christe

سادسا : مجموعة النباتات العطرية التى تحتوى على زيوت طيارة أو عطرية (■)

١٥٣	الفتنة	Leguminosae	153. Acacia farnesiana
١٥٤	سندقورة	Labiatae	154. Ajuga iva
١٥٥	ثوم	Liliaceae	155. Allium sativum
١٥٦	خلة	Umbelliferae	156. Ammi sp.
١٥٧	شيت	Umbelliferae	157. Anithum graveolens
١٥٨	حشيشة الملاك	Umbelliferae	158. Angelica archangelica
١٥٩	كرفس	Umbelliferae	159. Apium graviolens
١٦٠	أقحوان	Compositae	160. Calendula officinalis
١٦١	كراوية	Umbelliferae	161. Carum carvi
١٦٢	حسك	Compositae	162. Centaurea calcitrapa
١٦٣	غرديب	Compositae	163. Chrysanthemum cinirarifolium

رقم النبات	الاسم العربي	الفصيلة	الاسم اللاتيني
١٦٤	برتقال	Rutaceae	164. Citrus sinensis
١٦٥	كزبرة	Umbelliferae	165. Coriandrum sativum
١٦٦	كمون	Umbelliferae	166. Cuminum cyminum
١٦٧	حشيشة الليمون	Gramineae	167. Cymbopogon citratus
١٦٨	حلفاير — حشيشة الجمل	Gramineae	168. Cymbopogon proximus
١٦٩	سعد الخشن	Cyperaceae	169. Cyperus longus
١٧٠	كر كم	Zingiberaceae	170. Curcuma longa
١٧١	جزر	Umbelliferae	171. Daucus carota
١٧٢	قرنفل بستاني	Caryophyllaceae	172. Dianthus caryophyllus
١٧٣	حشيشة الجبل	Compositae	173. Erigeron canadensis
١٧٤	كافور — يوكاليتوس	Myrtaceae	174. Eucalyptus camaldulensis
١٧٥	شمر	Umbelliferae	175. Foeniculum vulgare
١٧٦	ياسمين	Oleaceae	176. Jasminum grandiflorum
١٧٧	عرعر	Cupressaceae	177. Juniperas communis
١٧٨	غار	Lauraceae	178. Laurus nobilis
١٧٩	خزامى	Labiatae	179. Lavandula multifida
١٨٠	حارة — رشاد	Cruciferae	180. Lepidium sativum
١٨١	روبية	Lamiaceae	181. Marrubium vulgare
١٨٢	نعناع	Labiatae	182. Mentha piperita
١٨٣	منتها — فلية	Labiatae	183. Mentha spicata
١٨٤	مرسين	Myrtaceae	184. Myrtus communis
١٨٥	ريحان	Labiatae	185. Ocimum basilicum
١٨٦	بردقوش	Labiatae	186. Origanum vulgare
١٨٧	عطر	Geraniaceae	187. Pelorogonium odoratissimum
١٨٨	بقدونس	Umbelliferae	188. Petroselinum sativum
١٨٩	ينسون	Umbelliferae	189. Pimpinella anisum
١٩٠	مستكى	Anacardiaceae	190. Pistacia atlantica
١٩١	ياسمين هندي	Apocynaceae	191. Plumeria acutifolia
١٩٢	ورد	Rosaceae	192. Rosa sp.
١٩٣	حصا لبنان	Labiatae	193. Rosmarinus officinalis
١٩٤	رعدة	Labiatae	194. Salvia aegyptiaca

رقم النبات	الاسم العربى	الفصيلة	الاسم اللاتينى
١٩٥	مرمية	Labiatae	195. <i>Salvia officinalis</i>
١٩٦	جعدة	Labiatae	196. <i>Teucrium polium</i>
١٩٧	زعرتر	Labiatae	197. <i>Thymus capitatus</i>
١٩٨	زيزفون	Tiliaceae	198. <i>Tilia</i> sp.
سابعاً : مجموعة النبات العطرية التى تحتوى على زيوت ثابتة أو دهنية (★)			
١٩٩	أبو طيلون	Malvaceae	199. <i>Abutilon</i> sp.
٢٠٠	البصل	Liliaceae	200. <i>Allium cepa</i>
٢٠١	الكرات	Liliaceae	201. <i>Allium porrum</i>
٢٠٢	فول سودانى	Leguminosae	202. <i>Arachis hypogaea</i>
٢٠٣	حارة	Cruciferae	203. <i>Brassica rapa</i>
٢٠٤	عصفر — قرطم	Compositae	204. <i>Carthamus tinctorius</i>
٢٠٥	خروب	Leguminosae	205. <i>Ceratonia siliqua</i>
٢٠٦	زربح — رمرام	Chenopodiaceae	206. <i>Chenopodium ambrosoides</i>
٢٠٧	حمص	Leguminosae	207. <i>Cicer arietinum</i>
٢٠٨	ليمون بنزهير	Rutaceae	208. <i>Citrus aurantifolia</i>
٢٠٩	نارنج	Rutaceae	209. <i>Citrus aurantium</i>
٢١٠	ليمون حلو	Rutaceae	210. <i>Citrus limetta</i>
٢١١	ليمون أضافيا	Rutaceae	211. <i>Citrus limonia</i>
٢١٢	ترنج	Rutaceae	212. <i>Citrus medica</i>
٢١٣	ليمون هندى	Rutaceae	213. <i>Citrus paradisi</i>
٢١٤	كروتون	Euphorbiaceae	214. <i>Croton tiglium</i>
٢١٥	زريقة	Globulariaceae	215. <i>Globularia alypum</i>
٢١٦	فول صويا	Leguminosae	216. <i>Glycine hispida</i>
٢١٧	القطن	Malvaceae	217. <i>Gossypium</i> sp.
٢١٨	عباد الشمس	Compositae	218. <i>Helianthus annuus</i>
٢١٩	عرق الطيب — سوسن	Iridaceae	219. <i>Iris florentina</i>
٢٢٠	كسان	Linaceae	220. <i>Linum usitatissimum</i>
٢٢١	بان — بسار	Moringaceae	221. <i>Moringa</i> sp.
٢٢٢	زيتون	Oleaceae	222. <i>Olea europaea</i>

رقم النبات	الاسم العربي	الفصيلة	الاسم اللاتيني
٢٢١	فجل	Cruciferae	223. <i>Raphanus sativus</i>
٢٢٢	خزامى — بكم	Resedaceae	224. <i>Reseda lateola</i>
٢٢٢	الخروع	Euphorbiaceae	225. <i>Ricinus communis</i>
٢٢٢	السهم	Pedaliaceae	226. <i>Sesamum indicum</i>
٢٢٢	الذرة الشامية	Gramineae	227. <i>Zea mays</i>

ثامنا : مجموعة النباتات السامة (×)

٢٢٢	ناب الجمل	Ranunculaceae	228. <i>Adonis macrocarpa</i>
٢٢٢	أناجلس — عين القط	Primulaceae	229. <i>Anagallis arvensis</i>
٢٢٣	جيتاجو	Caryophyllaceae	230. <i>Agrostemma githago</i>
٢٢٣	أنيمون — شقائق النعمان	Ranunculaceae	231. <i>Anemone coronarium</i>
٢٢٣	أرجيمون	Papaveraceae	232. <i>Argemone mexicana</i>
٢٢٣	شوكران	Umbelliferae	233. <i>Conium maculatum</i>
٢٢٣	نجيل	Gramineae	234. <i>Cynodon dactylon</i>
٢٢٣	دافنى	Thymeleaceae	235. <i>Daphne argustifolia</i>
٢٢٣	عائق	Ranunculaceae	236. <i>Delphinium sp.</i>
٢٢٣	كحلة	Boraginaceae	237. <i>Echium sp.</i>
٢٢٣	لبينة	Euphorbiaceae	238. <i>Euphorbia sp.</i>
٢٢٣	بنت القنصل	Euphorbiaceae	239. <i>Euphorbia pulcherrima</i>
٢٢٤	غبيرة	Boraginaceae	240. <i>Heliotropium sp.</i>
٢٢٤	بوقراد	Hypericaceae	241. <i>Hypericum triquetrifolium</i>
٢٢٤	لانتانا	Verbenaceae	242. <i>Lantana camara</i>
٢٢٤	قرن الغزال	Leguminosae	243. <i>Lotus corniculatus</i>
٢٢٤	هليوب — مريقة	Euphorbiaceae	244. <i>Mercurialis annua</i>
٢٢٤	بصل الحنش	Liliaceae	254. <i>Ornithogalum sp.</i>
٢٢٤	قضب — برسيم حجازى	Leguminosae	246. <i>Medicago sativa</i>
٢٢٤	حندقوق	Leguminosae	247. <i>Melilotus indica</i>
٢٢٤	حمد — حميض	Oxalidaceae	248. <i>Oxalis corniculata</i>
٢٢٤	علقة	Asclepeadaceae	249. <i>Pergularia tomentosa</i>
٢٢٤	عقيق — زعلنتة	Ranunculaceae	250. <i>Ranunculus socleratus</i>

رقم النبات	الاسم العربي	الفصيلة	الاسم اللاتيني
٢٥١	زهر إيطالي	Leguminosae	251. Robinia pseudoacacia
٢٥٢	حماض — حميضة	Polygonaceae	252. Rumex sp.
٢٥٣	عنب الديب	Solanaceae	253. Solanum nigrum
٢٥٤	حريق	Urticaceae	254. Urtica pilulifera
٢٥٥	فول	Leguminosae	255. Vicia faba
٢٥٦	سم الفراخ	Solanaceae	256. Withania somnifera

II فهرس النباتات الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربي

مرتبة حسب الأسماء اللاتينية

(A)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات منزوع	الاسم العربي	رقم النبات
			الموطن	١	٢	٣			
Abies alba Mill	Pinaceae	+						تنوب	١٠٩
Abutilon pannosum Schlecht	Malvaceae	★						أبو طيلون — لواق — قردان	١٩٩
Acacia arabica Wild.	Leguminosae	⊙						سنط عربي — سيال	٨٩
Acacia nilotica L.	Leguminosae	⊙						سنط	٨٩
Acacia farnesiana L.	Leguminosae	■						فتنة	١٥٣
Achillea fragrantissima Sch.	Compositae	●						أخيليا — حزنبل	١
Achillea millefolium L.	Compositae	●						قيصوم	١
Achillea santolina L.	Compositae	●						قيصوم — بعثران	١
Adhatoda vasica Nees	Aceanthaceae	?					✓	ادهاتودا	١٢٦
Adiantum capellus Veneres L.	Polypodiaceae	+						كزبرة البشر	١١٠
Adonis aestivalis L.	Ranunculaceae	△						ناب الجمل	٣٥

(A)

رقم النبات	الاسم العربي	نبات منزوع	التركيب	الفصيلة	الاسم اللاتيني	نبات برى				
						الموطن				
						٤	٣	٢	١	
٢٢٨	عين الديك	✓	×	Ranunculaceae	Adonis macrocarpa D. C.					
١٢٧	أجاف	✓	?	Agavaceae	Agave sisilana Perr.					
٩٠	أنجيل — نجم		⊙	Gramineae	Agropyron repens Beauv.					
٢٦	شجرة السماء — لسان الطير	✓	△	Simarubaceae	Ailanthus glandulosa Desf.					
١٥٤	سندوقة — مسبكة		■	Labiatae	Ajuga iva L.					
٢٧	لبخ — دقن الباشا	✓	△	Leguminosae	Albizia lebbek Benth.					
١٢٨	عقول — ترنجين		?	Leguminosae	Alhagi mauroorum Medik.					
٢٠٠	بصل	✓	★	Liliaceae	Allium cepa L.					
٢٠١	كرات	✓	★	Liliaceae	Allium porrum L.					
١٥٥	ثوم	✓	■	Liliaceae	Allium sativum L.					
١١١	حورة		+	Betulaceae	Alnus glutinosa Gaertner					
٢٨	صبار	✓	△	Liliaceae	Aloe barbadensis L.					
٩١	خطمية — نجم المرج		⊙	Malvaceae	Althaea officinalis L.					

(٢)

(٣)

(A)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات منزوع	الاسم العربي	رقم النبات
			٤	٣	٢	١			
<i>Ambrosia maritima</i> L.	Compositae	?						دمسيمة	١٢٩
<i>Ammi majus</i> L.	Umbelliferae	■						خلة شيطاني	١٥٦
<i>Ammi visnaga</i> L.	Umbelliferae	■						خلة بلدي	١٥٦
<i>Anacyclus pyrethrum</i> L.	Compositae	?						عود العطاس — سرة الكيش	١٣٠
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulaceae	×						عين القط — أناجلس	٢٢٩
<i>Ananas comosus</i> Merr.	Bromeliaceae	?					✓	أناناس	١٣١
<i>Anastatica heerochuntica</i> L.	Cruciferae	△						كف مريم — قبيد	٣٩
<i>Androcymbium gramineum</i> L.	Liliaceae	●						تيكوت — دفن الرجل	٢
<i>Anemone coronarium</i> L.	Ranunculaceae	×						أثيمون — شقائق النعمان	٢٣١
<i>Anethum graveolens</i> L.	Umbelliferae	■					✓	شبت	١٥٧
<i>Angelica archangelica</i> L.	Umbelliferae	■					✓	حشيشة الملاك	١٥٨
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Compositae	△						بابونج روماني	٤٠
<i>Apium graveolens</i> L.	Umbelliferae	■					✓	كرفس	١٥٩

(A)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات متزرع	الاسم العربى	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
Arachis hypogaea L.	Leguminosae	★	—	—	—	—	✓	فول سودانى	٢٠٢
Argemone mexicana L.	Papaveraceae	×	—	—	—	—		أرجيمون	٢٣٢
Artemisia herba-alba L.	Compositae	△	—	—	—	—		شبيح	٤١
Asparagus officinalis L.	Liliaceae	?	—	—	—	—	✓	كشك الأناظ — هليون	١٣٢
Asphodelus microcarpus Solzm	Liliaceae	●	—	—	—	—		عنصل — بصل — المنصل	٣
Astragalus gummifer Labill	Leguminosae	⊙	—	—	—	—		كثيراء	٩٢
Asstragalus spinosus L.	Leguminosae	⊙	—	—	—	—		شوك العقاد	٩٣
Atriplex hortensis L.	Chenopodiaceae	△	—	—	—	—		أسفاناخ	٤٢
Atropa belladonna L.	Solanaceae	●	—	—	—	—	✓	بلادونا — ست الحسن	٤

(B)

Balanites aegyptiaca Del.	Zygophyllaceae	△	—	—	—	—		بلح الصحرَاء — تمر العبيد	٤٣
Bauhenia variegata L.	Leguminosae	△	—	—	—	—	✓	خف الجمل	٤٤
Berberis vulgaris L.	Berberidaceae	●	—	—	—	—	✓	عود ريخ — بر بارس	٥

(٤)

(٥)

(B)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات منزوع	الاسم العربي	رقم النبات
			الموطن	١	٢	٣			
<i>Betula alba</i> L.	Betulaceae	△						بتولا — تامول	٤٥
<i>Boswellia carterii</i> L.	Burseraceae	+						كندر — لبنان ذكر	١١٢
<i>Brassica alba</i> L.	Cruciferae	△					✓	خردل أبيض	٤٦
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch.	Cruciferae	△						خردل أسود	٤٦
<i>Brassica rapa</i> L.	Cruciferae	■					✓	كبر — مسترد — حارة	٢٠٣
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cruciferae	?					✓	كرنب — بقلة الأنصار	٣٣
<i>Bryonia cretica</i> L.	Cucurbitaceae	△					✓	لعبة مرة — خيطة	٤٧

(C)

<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Leguminosae	●					✓	بقم	٦
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	■					✓	أقحوان	١٦٠
<i>Calotropis procera</i> Ait.	Asclepiadaceae	⊙						عشار	٩٤
<i>Cannabis sativa</i> L.	Cannabinaceae	+					✓	حشيش — قنب هندي	١١٣
<i>Capparis spinosa</i> L.	Capparidaceae	△						كبار — لصف — شفلح	٤٨

(C)

(٦).

الاسم اللاتينى	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات متزرع	الاسم العربى	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
Capsella bursa-pastoris L.	Cruciferae	△					✓	كيس الراعى فلفل — شطة	٤٩
Capsicum annuum L.	Solanaceae	●					✓		٧
Carduus benedictus Auct.	Compositae	⊙						خر شيف — شوكة مباركة	٩٥
Carica papaya L.	Caricaceae	⊙					✓	باباظ	٩٦
Carthamus tinctorius L.	Compositae	★					✓	عصفور — قرطم	٢٠٤
Carum carvi L.	Umbelliferae	■					✓	كراوية	١٦١
Cassia fistula L.	Leguminosae	△					✓	خييار شير	٥٠
Cassia acutifolia L.	Leguminosae	△						سنامكة — سنا	٥١
Cassia senna L.	Leguminosae	△						سنامكة — سنا	٥١
Casuarina equisetifolia L.	Casuarinaceae	+					✓	كازوارينا	١١٤
Catha edulis Forssk.	Celastraceae	●						قات	٨
Catharathus roseus G. Don.	Apocynaceae	●					✓	فككا	٩
Centaurea calcitrapa L.	Compositae	■						حسك	١٦٢.

(٧)

(C)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات منزوع	الاسم العربي	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
<i>Centaureum spicatum</i> Fritch.	Gentianaceae	?					حشيشة العقرب	١٣٤	
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Leguminosae	☉					خروب — خرنوب	٢٠٥	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Papaveraceae	●					عروق صفر — عمران	١٠	
<i>Chenopodium ambrosoides</i> L.	Chenopodiaceae	★					منتنة — زربيع	٢٠٦	
<i>Chrysanthemum cinirarifolium</i> L.	Compositae	■					أقحوان — غرديب	١٦٣	
<i>Cicer arietinum</i> L.	Leguminosae	★					حمص	٢٠٧	
<i>Cichorium endivia</i> L.	Compositae	☉					هندباء — سريس	٩٧	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae	☉					شيكوريا	٩٧	
<i>Citrullus colocynthis</i> Schrad.	Cucurbitaceae	△					حنظل — علقم	٥٢	
<i>Citrus aurantifolia</i> L.	Rutaceae	★					ليمون بنزهر	٢٠٨	
<i>Citrus aurantium</i> L.	Rutaceae	★					نارنج	٢٠٩	
<i>Citrus limetta</i> L.	Rutaceae	★					ليمون حلو	٢١٠	
<i>Citrus limonie</i> Risso.	Rutaceae	★					ليمون أضاليا	٢١١	

(C)

(٨)

رقم النبات	الاسم العرفي	نبات متزرع	نبات برى					التركيب	الفصيلة	الاسم اللاتيني
			الموطن							
			١	٢	٣	٤				
٢١٢	ترنج	✓					★	Rutaceae	Citrus medica L.	
٢١٣	ليمون هندي	✓					△	Rutaceae	Citrus paradisi Macf.	
١٦٤	برتقال	✓					■	Rutaceae	Citrus sinensis L.	
١١	بن						●	Rubiaceae	Coffea arabica L.	
١٢	عكنة — سرخان						●	Liliaceae	Colchicum autumnale L.	
٩٨	كليرودندرون	✓					⊙	Verbenaceae	Clerodendron inerme L.	
١١٥	بر — عوجة						+	Burseraceae	Commiphora myrrha Engl.	
٢٣٣	شوكران						×	Umbelliferae	Conium maculatum L.	
٩٩	عليق						⊙	Convolvulaceae	Convolvulus arvensis L.	
١٠٠	مخيط	✓					⊙	Baraginaceae	Cordia myxa L.	
١٦٥	كزبرة	✓					■	Umbelliferae	Coriandrum sativum L.	
٥٣	زعزور						△	Rosaceae	Crataegus oxyacantha L.	
٥٤	زعفران						△	Iridaceae	Crocus sativa L.	

(٩)

(C)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نباتات تبرى				نبات منزوع	الاسم العربى	رقم النبات
			٤	٣	٢	١			
<i>Croton tiglium</i> L.	Euphorbaceae	★					✓	كروتون	٢١٤
<i>Cucumis melo</i> L.	Cucurbitaceae	?					✓	قاوون	١٣٦
<i>Cucumis sativas</i> L.	Cucurbitaceae	?					✓	خيار	١٣٧
<i>Cuminum cyminum</i> L.	Umbelliferae	■					✓	كمون	١٦٦
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	+						بسر — شربين	١١٦
<i>Curcuma longa</i> L.	Zingiberaceae	■					✓	كركم	١٧٠
<i>Cymbopogon citratus</i> Stopf.	Gramineae	■					✓	حشيشة الليمون	١٦٧
<i>Cymbopogon proximus</i> L.	Gramineae	■						حلفاير — إذخر	١٦٨
<i>Cynara scolymus</i> L.	Compositae	△					✓	خرشوف	١٥٠
<i>Cynodon dactylon</i> Pers.	Gramineae	×						نجيل — نجم	٢٣٤
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Cyperaceae	?						حب العزيز	١٣٨
<i>Cyperus longus</i> L.	Cyperaceae	■						سعد خشن	١٦٩

(D)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات منزوع	الاسم العربى	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
Dalbergia sisso L.	Leguminosae	?					✓	سرسوخ — بسام	١٣٩
Daphne argusifolia C. Koch.	Thymeliaceae	×						دافنى — أزار	٢٣٥
Datura stramonium L.	Solanaceae	●						داتورة — بنج — طاطورة	١٣
Daucus carota L.	Umbelliferae	■					✓	جزر	١٧١
Delphinium ajacis L.	Ranunculaceae	×					✓	عائق	٢٣٦
Dianthus caryophyllus L.	Caryophyllaceae	■					✓	قرنفل بستانى	١٧٢
Digitalis purpurea L.	Scrophulariaceae	△					✓	أصبح العذراء — ديجيتالس	٥٥
Dodonaea viscosa L.	Sapindaceae	△					✓	دودينا	٥٦
Dolichos lablab L.	Leguminosae	△					✓	لبلاب	٥٧
Duranta repens L.	Verbenaceae	△					✓	ديورانتا	٥٨

(E)

Ecballium elaterium L.	Cucurbitaceae	?						بزيط	١٤٠
Echium sericeum Vahl.	Boraginaceae	×						كحلة — حنا الفول	٢٣٧

(١١)

(E)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات منزوع	الاسم العربي	رقم النبات
			الموطن	١	٢	٣			
<i>Echium vulgare</i> L.	Boraginaceae	×						كحيلة — ساق الحمام	٢٣٧
<i>Ephedra alata</i> Deene	Ephedraceae	●						إفيدرا — عدام	١٤
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Onagraceae	?						علقة — عقيض	١٤١
<i>Erigeron canadensis</i> L.	Compositae	■						حشيشة الجبل	١٧٣
<i>Eriobotrya japonica</i> L.	Rosaceae	△					✓	بشملة	٥٩
<i>Erodium cicutarium</i> L.	Geraniaceae	△						دهمية أبو بكر	٦٠
<i>Eruca sativa</i> Miller	Cruciferae	?					✓	جرجير	١٤٢
<i>Eryngium campestre</i> L.	Umbelliferae	△						شفاقيل — فجميع	٦١
<i>Eucalyptus rostrata</i> L.	Myrtaceae	■					✓	يوكالبتوس	١٧٤
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> L.	Myrtaceae	■					✓	يوكالبتوس	١٧٤
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbiaceae	×						لبينة	٢٣٨
<i>Euphorbia prunifolia</i> L.	Euphorbiaceae	×						لبن الحمار — لبينة	٢٣٨
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	Euphorbiaceae	×					✓	بنت القنصل	٢٣٩

(F)

(١٢)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات متزرع	الاسم العربى	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
<i>Fagonia bruguieri</i> Dc.	Zygophyllaceae	△						فاجونيا — كشيطا	٦٢
<i>Ferula assa-foetida</i> L.	Umbelliferae	+						حانثيت — أبو كبير	١١٧
<i>Ferula galbaniflua</i> Boiss.	Umbelliferae	+						سكيبيج	١١٧
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	⊙						تين	١٠١
<i>Ficus sycomorus</i> L.	Moraceae	⊙						جهميز	١٠٢
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	Umbelliferae	■						شمسر	١٧٥
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumariaceae	●						بقلة الملك — كليله	١٥

(G)

<i>Glaucium flavum</i> Gratz.	Papaveraceae	●						قرن الجديان — نعمان	١٦
<i>Globularia alypum</i> L.	Globulariaceae	★						زريقة — غنوم	٢١٥
<i>Glycene hispida</i> Merr.	Leguminosae	★					✓	فول صويا	٢١٦
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Leguminosae	△					✓	عرق سوس	٦٣
<i>Gossypium barbadense</i> L.	Malvaceae	★					✓	قطن	٢١٧

(١٣)

(H)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات منزوع	الاسم العربي	رقم النبات
			٤	٣	٢	١			
<i>Hedera Helix</i> L.	Araliaceae	△					✓	جبل الساكين — هيد	٦٤
<i>Helianthus annuus</i> L.	Compositae	★					✓	عباد الشمس	٢١٨
<i>Heliotropium bacciferum</i> Fors.	Boraginaceae	×						غيره — حشفة	٢٤٠
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	△					✓	هيسكس — جب المسك	٦٥
<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvaceae	△					✓	كر كديه	٦٦
<i>Hyocymus muticus</i> L.	Solanaceae	●						سكران	١٧
<i>Hypecoum procumbens</i> L.	Papaveraceae	●						جهره	١٨
<i>Humulus lupulus</i> L-	Moraceae	+					✓	حشيشة الدينار	١١٨
(I)									
<i>Iris florentina</i> L.	Iridaceae	★					✓	سوسن — زنبق	٢١٩
<i>Iris germanica</i> L.	Iridaceae	★					✓	عرق الطيب	٢١٩

(J)

(١٤)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات متررع	الاسم العربى	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
Jasminum Sp.	Oleaceae	■					✓	ياسمين	١٧٦
Juniperus communis L.	Cupressaceae	■						عرعر	١٧٧
(L)									
Lactuca sativa L.	Compositae	?					✓	خس	١٤٣
Lantana camara	Verbenaceae	×					✓	لنتانا	٢٤٢
Laurus nobilis L.	Lauraceae	■						غار	١٧٨
Lavandula multifida L.	Labiatae	■					✓	لاونده — خزامى	١٧٩
Lawsonia inermis L.	Lythraceae	+						حناء	١١٩
Leontice leontopetalum L.	Berberidaceae	●						رفق — نخيرة الدار	١٩
Lepidium sativum	Cruciferae	■						رشاد — حارة	١٨٠
Linum usitatissimum	Linaceae	★						كتان	٢٢٠
Lippia nodiflora Rich.	Verbenaceae	△						ليبيا — لية — بليحة	٦٧
Lotus corniculatus L.	Leguminosae	×						قون الغزال	٢٤٣
Lupinus termis L.	Leguminosae	●					✓	ترمس	٢٠

(١٥)

(M)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات متزرع	الاسم العربى	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
Malva parviflora L.	Malvaceae	⊙					✓	خبيزة — خبازى	١٠٣
Malva sylvestris L.	Malvaceae	⊙					✓	خبيزة — خبازى	١٠٣
Mangifera indica L.	Anacardiaceae	?					✓	مانجو	١٤٤
Marrubium vulgare L.	Laviatae	■					✓	روبية — فلية	١٨١
Matricaria chamomilla L.	Compositae	△					✓	بابونج المانى	٤٠
Medicago sativa L.	Leguminosae	×					✓	برسيم حجازى	٢٤٦
Melia azadirachto L.	Meliaceae	●					✓	ازاديرخت — نيم	٢١
Melilotus indica L.	Leguminosae	×						حندقوق — شنار	٢٤٧
Mentha piperita L.	Labiatae	■					✓	نعناع فلفل	١٨٢
Mentha spicata L.	Labiatae	■					✓	فلية	١٨٣
Mercurialis annua L.	Eupharbiaceae	×						هليوب — حشيشة الزئبق	٢٤٤
Mirabilis jalapa L.	Nyctaginaceae	●					✓	شب الليل	٢٢
Moringa peregrina L.	Moringaceae	★						مورنجة	٢٢١

(M)

(١٦)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات متزرع	الاسم العرفي	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
Morus alba L.	Moraceae	△					✓	توت أبيض	٦٨
Morus nigra L.	Moraceae	△					✓	توت أسود	٦٨
Muscari comosum L.	Liliaceae	?						بصل الذئب — بصيل	١٤٥
Myrtus communis L.	Myrtaceae	■						مرسين	١٨٤
(N)									
Nasturtium officinale R. B.	Cruciferae	△					✓	رشاد — قرنوش — قرة العين	٦٩
Nerium oleander L.	Apocynaceae	△						دقلة — دفل	٧٠
Nicotiana glauca R. Grah.	Solanaceae	△						مصاص — مساس	٧١
Nicotiana tabacum L.	Solanaceae	●						طباق	٢٣
Nigella sativa L.	Ranunculaceae	△						حبة البركة — حبة سوداء	٧٢
(O)									
Ocimum basilicum L.	Labiatae	■					✓	ريحان	١٨٥
Olea europea L.	Oleaceae	★					✓	زيتون	٢٧٢

١
٢
٣
٤

(١٧)

(٥)

الاسم اللاتينى	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات منزوع	الاسم العربى	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
Opuntia ficus-indica Mill.	Cactaceae	+						تين شوكى	١٢٠
Origanum vulgare L.	Labiatae	■					✓	بردقوش — مردقوش	١٨٦
Ornithogalum trichophyllum B.	Liliaceae	×						بصل الحنش	٢٤٥
Oxalis acetosella L.	Oxalidaceae	×						حمد — عرق الليمون	٢٤٨
Oxalis corniculata L.	Oxalidaceae	×						حمد — عرق الليمون	٢٤٨
(P)									
Pancratium maritimum L.	Amaryllidaceae	●						سوسن — ثمام	٢٤
Papaver rhoeas L.	Papaveraceae	●						خشخاش برى	٢٥
Papaver somniferum L.	Popoveraceae	●						خشخاش	٢٦
Parietaria officinalis	Urticaceae	?						حشيشة الریح	١٤٦
Peganum harmala L.	Zygophyllaceae	●						حرمل — حرملان	٢٧
Pelargonium oderatissimum L.	Geraniaceae	■					✓	عطر	١٨٧
Petroselinum sativum Hoffm.	Umbelliferae	■					✓	بقادونس	١٨٨

(P)

(١٨)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى					نبات متنوع	الاسم العربى	رقم النبات
			الموطن							
			٤	٣	٢	١				
<i>Pergularia tomentosa</i>	Asclepeadaceae	×						علقة	٢٤٩	
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmæ	?						بلح	١٤٧	
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Umbelliferae	■						ينسون	١٨٩	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae	+						صنوبر	١٢١	
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Anacardiaceae	+						فستق شرقى	١٢٢	
<i>Pisum sativum</i> L.	Leguminosae	?						بصلة	١٤٨	
<i>Piper nigrum</i>	Piperaceae	●						فلفل أسود	٢٨	
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	⊙						بلاتناجو	١٠٤	
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	⊙						لسان الحمل	١٠٥	
<i>Plantago indica</i> L.	Plantaginaceae	⊙						بسليم	١٠٤	
<i>Plantago psyllum</i> L.	Plantaginaceae	⊙						بسليم — بذر قطونة	١٠٤	
<i>Plumeria acutifolia</i> L.	Apocynaceae	■						ياصين — هندى	١٩١	
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Polygonaceae	△						قرضاب — عصى الراعى	٧٣	

(١٩)

(P)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات منزوع	الاسم العربي	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
Populus pyramidalis L.	Salicaceae	△						حور	٧٤
Portulaca oleracea	Portulacaceae	?						رجلة بربر	١٤٩
Punica granatum L.	Punicaceae	●						رمان	٢٩

(R)

<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Cruciferae	★						فجل برى	٢٢٣
<i>Raphanus sativus</i> L.	Cruciferae	★					✓	فجل	٢٢٣
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Ranunculaceae	×						عقيق — زعلنتة	٢٥٠
<i>Reseda lateola</i> L.	Resedaceae	★						بكم — خزامى	٢٢٤
<i>Rheum officinalis</i> L.	Polygonaceae	△					✓	راوند	٧٥
<i>Opuntia communis</i> L.	Euphorbiaceae	★						خروع	٢٢٥
<i>Rosa</i> Sp.	Rosaceae	■					✓	ورد	١٩٢
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae	×						زهر إيطالي	٢٥١
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	■					✓	حصالبان — روزمارى	١٩٣

(R)

(٢٠)

رقم النبات	الاسم العربي	نبات متزرع	نبات برى				التركيب	الفصيلة	الاسم اللاتيني
			الموطن						
			١	٢	٣	٤			
٧٦	قوة الصباغين — قوة	✓					△	Rubiaceae	Rubia tinctorum L.
١٢٣	توت برى						+	Rosaceae	Rubus fruticosus L.
٢٥٢	حماض — حميض						×	Polygonaceae	Rumex acetosa L.
٢٥٢	حماض — حميض						×	Polygonaceae	Rumex dentatus L.
٧٧	سفر — شراية الراعي	✓					△	Liliaceae	Ruscus aculeatus L.
٧٨	سذب — فيجن						△	Rutaceae	Ruta graveolens L.
(S)									
٧٩	صفصاف	✓					△	Salicaceae	Salix alba L.
٣٠	أراك — سواك						●	Solvdoraceae	Salvadora persica Garcin
١٩٤	رعلة — غبيشة						■	Labiatae	Salvia egyptiaca L.
١٩٥	مريكة						■	Labiatae	Salvia officinalis L.
٨٠	بلسان	✓					△	Caprifoliaceae	Sambucus nigra L.
٣١	مرار — سنائير						●	Compositae	Senecio vulgaris L.

(S)

(٢١)

الاسم اللاتينى	الفصيلة	التركيب	نبات برى				نبات منزوع	الاسم العربى	رقم النبات
			الموطن						
			٤	٣	٢	١			
Sesamum indicum L.	Pedaliaceae	★					✓	سمسم	٢٢٦
Sida jamaicensis L.	Malvaceae	△						سيداء — غبارى	٨٢
Solanum nigrum L.	Solanaceae	×						عنب الديب	٢٥٣
Solenostemma argel Hayne.	Asclepiadaceae	○						حرجل	١٠٧
Sonchus oleraceus L.	Compositae	?						جعقيض — جلونين	١٠٨
Spinacea oleracea L.	Chenopodiaceae	△					✓	سبانخ	٨٣
(T)									
Tamarindus indica L.	Leguminosae	△						تمر هندى	٨٤
Tamarix nilotica Bunge	Tamaricaceae	○						أثل — عيل — طرفة	١٢٤
Tecoma stans Juss.	Bignoniaceae	●					✓	تيكوما	٣٢
Teucrium polium L.	Labiatae	■						جعدة	١٩٦
Thevetia nerifolia L.	Apocynaceae	○					✓	ثفتيا	١٠٦
Thymus capitatus L.	Labiatae	■					✓	زعتر — سعتر	١٩٧

(T)

(٢٢)

رقم النبات	الاسم العربى	نبات منزوع	نبات برى					التركيب	الفصيلة	الاسم اللاتينى
			الموطن							
			١	٢	٣	٤				
١٩٨	زيرفون — تيليا						■	Tiliaceae	Tilia platyphyllos	
٣٣	دقن الشيخ						●	Zygophyllaceae	Tribulus terrestris L.	
٣٤	حلبة — بسيسة	✓					●	Leguminosae	Trigonella foenum-graecum L.	
(U)										
١٢٥	غرغار — دردار						+	Ulmaceae	Ulmus campestris L.	
٨٢	بصل فروعون						△	Liliaceae	Urginea maritima L.	
٢٥٤	حريق						■	Urticaceae	Urtica pilulifera L.	
(V)										
٨١	فول العرب						△	Caryophyllaceae	Vaccaria pyramidata L.	
٨٦	خرمة — صالح النظر	✓					△	Scrophulariaceae	Verbascum sinuatum L.	
٨٧	رجل الحمام						△	Verbenaceae	Verbena officinalis L.	
٢٥٥	فول	✓					×	Leguminosae	Vicia faba L.	
٨٨	بنفسج	✓					△	Violaceae	Viola adorata L.	

(٢٣)

(W)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	التركيب	نباتات برى				نبات منزوع	الاسم العربى	رقم النبات
			الموطن						
			١	٢	٣	٤			
Withania somnifera (L.) Dunal	Solanaceae	×						سم الفراخ	٢٥٦

(Z)

Zizyphus jujuba Miller	Rhamnaceae	?						✓	عنا ب	١٥١
Zizyphus spina christe Wild	Rhamnaceae	?						✓	نبق	١٥٢
Zea mays L.	Gramineae	★						✓	ذرة شامية	٢٢٧

III فهرس النباتات الطبية والعطرية والمسامية الى الوطن العربي مرتبة حسب الفصائل النباتية التي تنتمي اليها (٢٤)

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الغارماكولوجيا	الاسم اللاتيني
---------------	--------------	----------------	---------------	----------------------------------	----------------

Fam. Acanthaceae الفصيلة الأكانثية

١٢٦	أدهانتودا	جذور - أوراق	كحة - أزهارات صدرية	روماتيزم	<i>Adhatoda vasica</i> Nees.
-----	-----------	--------------	---------------------	----------	------------------------------

Fam. Amaryllidaceae الفصيلة النرجسية

١٢٧	أجاف	أوراق	كورتيرون	عصير سكري (جن)	<i>Agave sisiliana</i> Perr.
٢٤	سورسن	البصيلات	قلويدات	الأزمنة الربوية	<i>Pancatium maritimum</i>

Fam. Anacardiaceae الفصيلة الأناكارديية

١٤٤	مانجرو	ثمار - أوراق	ملينة - مدررة للبول		<i>Mangifera indica</i> L.
١٩٠	مستكي	أفرع - أوراق	تانيين ومواد بلسمية	المغص الكلوي	<i>Pistacia atlantica</i>
١٢٢	فستق	ثمار - بذور - لحاء	مواد راتنجية	منبهة - مدررة للبول آلام الأمساك	<i>Pistacia lentiscus</i>

Fam. Apocynaceae الفصيلة الدفلية

٨٩	ونكا	النبات	قلويد	ضد الأورام السرطانية	<i>Catharanthus roseus</i> G. Dov.
				سرطان الدم	

الاسم اللاتنى	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربى	رقم النبات
<i>Nerium oleander</i> L.	ضبط الدم - مهدئ للحمى	لبن نباتى <i>Neriena</i>	أوراق	دفلة	٧٠
<i>Plumeria acutifolia</i> L.	سهل قوى - آلام الأسنان	لبن نباتى	أزهار	ياسمين هندى	١٩١
<i>Thevetia uerifolia</i> L.	سهل قوى - مهدئ للحمى	لبن نباتى	ثمار	ثقيتيا	١٠٦
الفصيلة الأرابية <i>Fam. Araliaceae</i>					
<i>Hedera helix</i>	إدرار الطمث أمراض جلدية		أوراق	هيدرا - جبل المساكين	٦٤
الفصيلة العشارية <i>Fam. Asclepiadaceae</i>					
<i>Calotropis procera</i> Ait.	سهل قوى - روماتيزم	لبن <i>Trypin</i>	النبات	عشار	٩٤
<i>Pergularia tomentosa</i>	سام	قلويد وجليكوسيد	النبات	علقة	٢٤٩
<i>Solenostemma argel</i>	سهل	لبن	المادة اللبنة	حرجل	١٠٧
الفصيلة البربريدية <i>Fam. Berberidaceae</i>					
<i>Berberis vulgaris</i> L.	كبد - يرقان - حميات	قلويد	لحاء وجذور	عود ريح مغربى	٥
<i>Leontice leontopetalum</i> L.	إدرار اللبن - صرع	قلويد	جذور - أوراق	رقب	١٩

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الفاارماكوولوجيا	الاسم اللاتيني
الفصيلة البتولية Betulaceae					
١١١	حورة	قلف — أوراق	راتنجات	قابض — ضد الحروق	<i>Alnus glutinosa</i> Gaer.
٤٥	بتولا	قلف — أوراق	جليكوسيد	علاج الجروح — ومقوى	<i>Betula alba</i> L.
الفصيلة البجنونية Bignoniaceae					
٣٢	تيكوما	أوراق	قلويد	خفض نسبة السكر	<i>Tecoma stans</i> Juss.
الفصيلة البروميلية Bromeliaceae					
١٣١	أناناس	ثمار	لين	هضم البروتين	<i>Ananas comosus</i> Merr.
الفصيلة البوراجينية Boraginaceae					
٢٣٧	كحلة	نبات	قلويد	ضد السرطان	<i>Echium sericum</i>
١٠٠	مخطط	ثمار — قلف	مواد مخاطية وصفية	مدر للبول — ملين يساعد على الهضم — سام	<i>Cordia myxa</i>
٢٤٠	غيزة — حشفة	إفرازات	صمغ		<i>Heliotropium</i> Sp.
١١٢	لبان ذكر				<i>Boswellia carterii</i>

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Commiphora murrha</i>	مقو للمعدة طارد للغازات	راتنج	إفرازات	مر	١١٥
<i>Opuntia ficus-Indica</i>	مغذية	Fam. Cactaceae التانين - أملاح فيتامين	الثمار والسيقان	تين شوكي	١٢٠
<i>Cannabis sativa</i>	مسكن للألام - هستريا	Fam. Cannabinaceae راتنج Canbinone	أوبار غدية	حشيش	١١٣
<i>Humulus lupulus</i>	مهدئ - مقو - منوم	راتنج Lobaline	نورات مؤنثة	حشيشة الدينار	١١٨
<i>Capparis spinosa</i>	ضد الإسهال	Fam. Capparidaceae جليكوسيد وحامض مدر للبول - ضد الإسهال	جذور وثمار	لصف	٤٨
<i>Sambucus nigra</i>	مساعدة على القيء	Fam. Caprifoliaceae جليكوسيد Sambunigrin - مسهل - مساعد على القيء	قشور	بلسان	٨٠
<i>Carica papaya</i>	هاضم للبروتينات	Fam. Caricaceae أنزيم Papain	ثمار	باباز	٩٦

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الاسم اللاتيني
الفصيلة القرنفلية Fam. Caryophyllaceae					
٢٣٠	جيتاجو	البذور	سالم	طرد الديدان	Agrostema githago
١٧٢	قرنفل	أزهار	زيت	منبه شديد	Dianthus caryophyllus
٨١	فول العرب	جذور	صابونيات		Vaccaria pyramidata
الفصيلة الكازواريتية Fam. Casuarinaceae					
١١٤	كازوارينا	أوراق وقلف	Casuarin	ضد الإسهال والدوسنتاريا	Casuarina equisetifolia
الفصيلة السليسترية Fam. Celastraceae					
٨	قات	أوراق	قلويد	منبه شديد - مكيف	Catha edulis
الفصيلة الرمراية Fam. Chenopodiaceae					
٤٢	اسفناخ	نبات	جليكوسيد	ضد الالتهابات - مقيء	Atriplex hortensis
٢٠٦	رمرام - زربيج	أوراق	زيت Ascaridole	ضد الديدان الحطافية	Chenopodium ambrosioides
٨٣	سباخ	جذور وأوراق	Saponins	خفض السكر في الدم	Spinacia oleracea
أنيميا					

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
Fam. Compositae المركبة الفصيلة					
<i>Achillea fragrantissima</i>	طارد للديدان	Achiceine	أزهار	قيصوم	١
<i>Achillea santolina</i>	طارد للديدان	Achiceine	أزهار	قيصوم	١
<i>Ambrosia maritima</i>	منشط للكبد - إزالة الحصى	زيت	نبات	دمسية	١٢٩
<i>Anacyclus pyrethrum</i>	إدرار اللعاب - علاج الأسنان		جذور	عود العطاس	١٣٠
<i>Artemisia herba-alba</i>	طرد الديدان - مغص	Santonin	أوراق	شيخ	٤١
<i>Calendula officinalis</i>	معرق - مدر للبول - طمث	Calyndulin	النبات	أقحوان	١٦٠
<i>Carduus bededictus</i>	مقوى - مصلح للمعدة	مواد مخاطية وزيت	النبات	خرشيف	٩٥
مغص					
<i>Carthamus tinctorius</i>	مقو للكبد	Carthamine	زيت	عصفر	٢٠٤
<i>Centaurea calcitrapa</i>	قابض - فاتح للشهية	زيت	أزهار	حسك	١٦٢
<i>Chrysanthemum Sp.</i>	مبيد حشرى	Pyrethrum	زيت	غرديب	١٦٣
<i>Cichorium intybus</i>	مصلحة للمعدة - مدر للبول	مواد مخاطية	جذور - بذور	شيكوريا	٩٧
<i>Cichorium pumilum var. endevia</i>	مهضمة - طرد الغازات	مادة مرة	الأوراق	هندباء	١٣٥

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الاسم اللاتيني
١٥٠	خرشوف	ثمار	Cynarine	تنشيط الكبد - كولسترول	<i>Cynara scolymus</i>
١٧٣	حشيشة الجبل	النبات	زيت وفلافون	الجهاز البولي والتناسلي	<i>Erigeron canadensis</i>
٢١٨	عباد الشمس	أزهار	زيت Pyrethrum	مبيد حشري	<i>Helianthus annuus</i>
١٤٣	خس	النبات	زيت	مدر للبول - ملين	<i>Lactuca sativa</i>
٤٠	بابونج	أزهار	Anthemic acid	مقوى ومنبه للمعدة	<i>Matricaria chamomilla</i>
٣١	مرار	أزهار	فيتامين C - ستروك	مدر للطمث - طارد للديدان	<i>Senecio vulgaris</i>
١٠٨	جمضيض	النبات	فيتامين C - ستروك	سهل - مدر للبول	<i>Sonchus oleraceus</i>
Fam. Convolvulaceae					
الفصيلة الملافية					
٩٩	عليق	النبات	لين نباتي	كحة - أزمة - استسقاء	<i>Convolvulus arvensis</i>
Fam. Cruciferae					
الفصيلة الصليبية					
٣٩	كف مريم	النبات	زيت	مدر للطمث	<i>Anastatica hieracantha</i>
٤٦	خردل أبيض	بذور	جليكوسيد Singrin	علاج اللومباجو والروماتيزم	<i>Brassica alba</i>
٤٦	خردل أسود	بذور	زيت Singrin	علاج اللومباجو والروماتيزم	<i>Brassica nigra</i>
٢٠٣	كبر - حارة	بذور	زيت Singrin	يساعد على الهضم	<i>Brassica rapa</i>
				فتح الشهية	

(١٠)

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
Brassica oleracea	يفيد الكبد - النقرس	أملاح وفيتامينات	الأوراق	كرنب	١٣٣
Capsella bursa-pastoris	وقف النزيف	جليكوسيد Barsine	النبات	كيس الراعي	٤٩
Eruca sativa	تنقية الدم - اسقربوط	فيتامين C - أملاح	النبات	جرجير	١٤٢
Lepidium sativa	طارد للبلغم - أزمت صدرية	زيت	النبات	حارة - رشاد	١٨٠
Nasturtium officinalis	وقف النزيف - طمث	جليكوسيد	بادرات	رشاد	٦٩
Raphanus sativus	مدر للبول - ملين	زيت دهني	جذور	فجل	٢٢٣
Fam. Cucurbitaceae					
Bryonia cretica	مسهل - مرض السكر	جليكوسيد Bryonin	ثمار	لعبة مرة	٤٧
Citrullus colocynthis	مسهل قوى	جليكوسيد Colocynthin	ثمار	حنظل	٥٢
Cucumis melo	مدررة للبول	فيتامين A, B ₁ , B ₂ , C	ثمار ونبور	قارون	١٣٦
Cucumis sativa	ملطفة للأغشية يسكن العطش أمراض جلدية		ثمار	خيار	١٣٧
Ecballium elaterium	مرض اليرقان	حامض اكباليك - قلويد	الثمار الناضجة	بزيط	١٤٠

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الاسم اللاتيني
الفصيلة السروية Cupressaceae					
١١٦	سرو	أوراق وخشب	تابينات وزيت	مدر للبول - التام الجروح	<i>Cupressus sempervirens</i>
١٧٧	عرعر	خار	زيت Cadinine	ضد الإسهال والالتهابات	<i>Juniperus communis</i>
Fam. Cyperaceae الفصيلة السعدية					
١٣٨	حب العزيز	ريزومات	زيت	إدرار اللبن - شراب منعش	<i>Cyperus esculentus</i>
١٦٩	سعد	ريزومات	زيت	عطور - مدرة للبول	<i>Cyperus longus</i>
Fam. Euphorbiaceae الفصيلة اللبينية					
٢١٤	كروتون	بذور	زيت	مسهل	<i>Croton tiglium</i>
٢٣٨	لبينية	النبات	لبن نباتي	مسهل	<i>Euphorbia pepius</i>
٢٣٩	بنت القنصل	النبات	لبن نباتي	مسهل شديد - مقيء	<i>Euphorbia pulcherima</i>
٢٤٤	هليوب - مريقة	النبات	زيت	سام	<i>Mercurialis annua</i>
٢٢٥	خروع	بذور	زيت	مسهل	<i>Ricinus communis</i>
Fam. Ephedraceae الفصيلة الإيفيدرية					
١٤	عدم	خار - سيقان	قلويد إيفيدرين	البرد - الأنفلونزا الأزمات الصدرية	<i>Ephedra alata</i>

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Centaurium spicatum</i>	ضغط الدم - إخراج الحصاوى	Fam. Gentianaceae	أزهار	حشيشة العقرب	١٣٤
<i>Erodium cicutarium</i>	قابض - مدر للبول	Fam. Geraniaceae	صابونيات	دهمية أبو بكر	٦٠
<i>Pelargonium odoratissimum</i>	عطور - مستحضرات تجميل	Geraniaceae	زيت Geraniol	عطر	١٨٧
<i>Globularia vulgaris</i>	مسهل - مقو	Fam. Globulariaceae	النبات	زريقة	٢١٥
<i>Agropyron repens</i>	مدر للبول - معرق	Fam. Gramineae	زيت - أملح - فيتامينات ملين - الريزومات	أنجيل	٩٠
<i>Cymbopogon citratus</i>	طاردة للغازات - مدر للبول	Citral	زيت به Citral	حشيشة الليمون	١٦٧
<i>Cymbopogon proximus</i>	سالم	طاردة للغازات - مدر للبول	زيت طيار	حلفاير	١٦٨
<i>Cynodon dactylon</i>	مدررة للبول	زيت	نبات	نجيل	٢٣٤
<i>Zea mays</i>			شواشي	ذرة صفراء	٢٢٧

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الغرائد الطبية الفارماكولوجيا	الاسم اللاتيني
<p>الفصيلة الهيريكية Fam. Hypericaceae</p> <p>Hypericum triquetrifolium</p> <p>سام</p>					
<p>الفصيلة السوسينية Fam. Iridaceae</p>					
٢٤١	بوقراد	النبات	الميرسين	Hypericum triquetrifolium	Hypericum triquetrifolium
٥٤	زعفران	براعم ومياسم	جليكوسيد	تابل - مضاد للبرد	Crocus sativa
٢١٩	عرق الطيب	رغزومات	Myristicin	سهل - مدر للبول	Iris florentina
٢١٩	سوسن	رغزومات		سهل - مدر للبول	Iris germanica
<p>الفصيلة الشفوية Fam. Labiatae</p>					
١٥٤	سندقورة - جوجا	أوراق	زيت	طارد للديدان - مرض السكر	Ajuga iva
١٧٩	خزامى - لاوئدة	أزهار	زيت Linalool	مدرّة للبول - مسكّنة	Lavandula multifida
١٨٦	بردقوش	أوراق	زيت	منفث طارد للغازات	Origanum vulgare
<p>Geraniol terbenol</p>					
١٨١	روية	أوراق	زيت	طارد للديدان - ضد البلمم	Marubium vulgare
١٨٢	نمناح فلعللي	أوراق - أزهار	زيت Menthol	منبه للجهاز الهضمي طارد للغازات	Mentha piperita

الاسم اللاتيني	القوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
Mentha spicata	ضد الالتهابات	زيت Carvone	أوراق - أزهار	منتهى - فلية	١٨٣
Ocimum basilicum	طارد للغازات - مدر للبول	زيت Ocimene	أوراق	ريحان	١٨٥
Rosmarinus officinalis	طارد للغازات	زيت	أوراق	إكليل	١٩٣
	محسن للطعم	Berneol coneol		(حصا اللبان)	
Salvia officinalis	اضطراب الأعصاب والدوخة	زيت	أوراق	مريمية	١٩٥
Salvia aegyptiaca	إسهال - بواسير	زيت طيار	أوراق	رعلة	١٩٤
Teucrium polium	البرد والحمى تشفى المعدة والأمعاء	زيت طيار	أوراق	جمدة	١٩٦
Thymus capitatus	طارد للديدان	زيت Thymol	أوراق	زعر	١٩٧
	طارد للبلغم وضد الحمى				
Laurus nobilis	هستريا - روماتيزم	زيت	أوراق	غار	١٧٨
		Fam. Lauraceae			
Acacia arabica	الجروح والالتهابات والإسهال والدوستناريا	تانين وأرابين	الفصيلة البقولية أو القرنية Fam. Leguminosae	سنط - سيال	٨٩

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الفارماكوولوجيا	الاسم اللاتيني
١٥٣	فتنة	أزهار	زيت	قابض - مرهم للإكزيما	<i>Acacia farnesiana</i>
٢١١	سنط عروى	إفراز	صمغ	ملين - ملطف	<i>Acacia nilotica</i>
٣٧	لبخ	قلف	جليكوسيد	ذو ستاريا - بواسير	<i>Albizia lebek</i>
٩٢	كثيراء	قلف	راتنج و صمغ	عمل المستحلبات والبلايغ	<i>Astragalus gummifer</i>
١٢٨	عقول	النبات	زيت	ملين ومدر للبول علاج الروماتيزم	<i>Alhagi maurorum</i>
٢٠٢	فول سوداني	بذور	زيت	مدر للبن - مصدر بروتيني	<i>Arachis hypogea</i>
٤٤	خف الجمل	قلف - أوراق	جليكوسيد	مقو - قابض طارد للغازات	<i>Bauhinia variegata</i>
٦	بقم	قلف - بذور	قلويد	نزيف دموي - ضد السل	<i>Caesalpinia sappan</i>
٢٠٧	حمص	ثمار		ضد البرص والجدري مقو للياه	<i>Cicer arietinum</i>
٢٠٥	خروب	ثمار		ضد الإسهال - مدر للبول	<i>Ceratonia siliqua</i>
٥١	سامكي	أوراق	جليكوسيد	مسهل - قابض	<i>Cassia acutifolia</i>
٥٠	خيار شنبدر	لب الثمار	جليكوسيد	مسهل	<i>Cassia fistula</i>

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
Dolichos lablab	معرفة - ضد المغص	جليكوسيد Dolichosin	بذور	لبلاب	٥٧
Dalbergia sisso	علاج السيلان		أوراق	سرسوع	١٣٩
Glycyrrhiza glabra	ملين - ملطف	جليكوسيد	جذور	عرق سوس	٦٣
	طاراد للبلغم	Camphene Glyarrhizin			
Glycene hispida	تقليل نسبة السكر في الدم	زيت Genistan	بذور	فول الصويا	٢١٦
Lotus corniculatus	قابض - التام الجروح	جليكوسيد ستوجين	النبات	قرن الغزال	٢٤٣
Lupinus termis	طاراد للديدان	قلويد Lobaline	ثمّار	ترمس	٢٠
Medicago sativa	سام أحياناً	صابونيات	النبات	برسيم حجازي	٢٤٦
Melilotus indica	سام ولكن يستخدم كملين وفي علاج الأورام	كومارين	الأوراق	حندقوق	٢٤٧
Pisum sativum	خفض السكر في الدم التهاب أغشية المخ	أحماض أمينية وصبغة	ثمّار وبذور	بصلة	١٤٨
Robinia pseudoacacia	سام	قلويد الروبينين	سوق - أوراق	زهر إيطالي	٢٥١
Tamarindus indica	شراب منعش وملين	جليكوسيد Limonine	ثمّار	تمر هندي	٨٤
Trigonella foenum-graecum	مقوية للمعدة - منقية للدم	قلويد Trigoneline	ثمّار	حلبة	٣٤
Vicia faba	سام أحياناً لبعض الأشخاص	أنزيم	البذور	الفلول	٢٥٥

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الغفار ماكو لزجيا	الاسم اللاتيني
الفصيلة الزنبقية Fam. Liliaceae					
٢٠٠	بصل	بصلة	زيت البصل	طرد الغازات - هضم	Allium cepa
٢٠١	كرات	أوراق	زيت	مهضم - طارد للبلغم	Allium porrum
١٥٥	ثوم	بصلة	زيت	تسكين الآلام يقوى مناعة الجسم	Allium sativum
٣٨	صبار	أوراق	جليكوسيد Aloin	سهل - منه للمعدة مهضم	Aloe barbadensis
٣٨	صبار	أوراق	جليكوسيد Aloin	سهل - منه للمعدة	Aloe vera
٢٠	أندروستينيم	كرمات	قلويد Colchicine	آلام النقرس والمفاصل	Androcymbium gramineum
١٣٢	هليون	دزانات	قلويد Colchicine	مرض السيلان	Asparagus officinalis
٣	بصل المنصل	جنودور وبذور	قلويد Asphodeline	قابس - يمنع الحمل	Asphodelus microcarpus
١٢	عككة	كرمات - بذور	قلويد Colchicine	تخفيف آلام الروماتيزم والنقرس	Colchicum autumnale
١٤٥	بصل الذئب	النبات دون البصلة	مقو للمعدة مزيل للحموضة	Muscari comosum	

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Ornithogalum Sp.</i>	سام	جليكوسيد	النبات	بصل الحنش	٢٤٥
<i>Ruscus aculeatus</i>	قابض - مدر للبول	Ruscogenin	ريزومات	سفندر	٧٧
<i>Urginea maritima</i>	منفث للبلغم - منبه مدر للبول مقو لعضلات القلب	Scillaridin	بصل	بصل فرعون	٨٥
Fam. Linaceae الفصيلة الكتانية					
<i>Linum usitatissimum</i>	ضد الإمساك	زيت	بذور	كتان	٢٢٠
Fam. Lythraceae الفصيلة الحناثية					
<i>Lawsonia inermis</i>	قابض - التام الجروح	راتنجات - تانيات	أوراق	حناء	١١٩
Fam. Malvaceae الفصيلة الحجازية					
<i>Abutilon pannisum</i>	ملين - مراهم	زيت	أوراق	أبو طيلون	١٩٩
<i>Althaea officinalis</i>	ملطف - ضد الكحة	مواد مخاطية	جذور	خطمية	٩١
<i>Gossypium barbadense</i>	تابل	زيت - مواد مخاطية	بذور	قطن	٢١٧
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	منفث طيبة - منمنش	فيتامينات	أوراق - أزهار	حب المسك	٦٥

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية	الاسم اللاتيني
٦٦	كر كديه	الكأس ونخت الكأس	جليكوسيد	مدر للبول — ملين ومطهر	<i>Hibiscus sabdariffa</i>
١٠٣	خبيزة	أوراق	مواد مخاطية	آلام الأسنان	<i>Malva parviflora</i>
١٠٣	خبيزة	أوراق	مواد مخاطية	آلام الأسنان	<i>Malva sylvestris</i>
٨٢	سيط	جذور	كليكوسيد Saponin	طارد للديدان	<i>Sida jamaicense</i>
			Fam. Meliaceae الفصيلة الزنترنجية		
٢١	أزادراخت	قلف — ثمار	قلويد Margasperin	قابض — ضد الحمى والرشح	<i>Melia azadirachta</i>
			Fam. Moraceae الفصيلة التوتية		
١٠١	تين	أوراق — ثمار	جليكوسيد — مواد هلامية	ملين	<i>Ficus carica</i>
١٠٢	جميز	أوراق — ثمار	لين نباتي	أمراض جلدية — ملين	<i>Ficus sycomorus</i>
٦٨	توت	أوراق — ثمار	جليكوسيد Quercetin	إدرار البول وطرد الديدان	<i>Morus Sp.</i>
			Fam. Moringaceae الفصيلة المورنجية		
٢٢١	بان — يسار	بذور	زيت	إنفراز الصفراء	<i>Moringa peregina</i>

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
الفصيلة المرسينية Fam. Myrtaceae					
<i>Eucalyptus</i> Sp.	برد - ضد الحمى - زكام -	زيت Eucalyptol	أوراق	يوكالبتوس	١٧٤
<i>Myrtus communis</i>	تقوية الشعر	زيت	أوراق	مرسين	١٨٤
الفصيلة الجهنمية Fam. Nyctaginaceae					
<i>Mirabilis jalapa</i>	علاج السيالان - مدر للبول - قلويد	أوراق - جذور	شب الليل	٢٢	٢٢
الفصيلة الزيتونية Fam. Oleaceae					
<i>Jasminum grandiflorum</i>	تابل - مركبات عطرية	زيت	أزهار	ياسمين	١٧٦
<i>Jaeminum officinale</i>	تابل - عطور	زيت	أزهار	ياسمين	١٧٦
<i>Olea europaea</i>	أغراض طبية	زيت الزيتون	ثمار	زيتون	٢٢٢
الفصيلة الأنجورية Fam. Onagraceae					
<i>Epilobium hirsutum</i>	علاج البثور الجلدية	حامض المالك	عصر النبات	علفة	١٤١
الفصيلة الأكساليديية Fam. Oxalidaceae					
<i>Oxalis corniculata</i>	طارد للديدان	كارونين	أوراق	حمد	٢٤٨

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الاسم اللاتيني
الفصيلة النخيلية Fam. Palmae					
١٤٧	نخيل البلح	ثمار	فيتامين	ضد البلاجرا - تكوين الدم	<i>Phoenix dactylifera</i>
الفصيلة الخشخاشية Fam. Papaveraceae					
٢٣٢	أرجيمون	النبات	قلويد Berberine	مدر للبول - منوم	<i>Argemone mexicana</i>
١٠	عروق صفير	أوراق	قلويد Chelodone	سعال ديكى - ضد اليرقان	<i>Chelidonium majus</i>
١٥	بقلة الملك	النبات	قلويد Fumarine	تخفيض ضغط الدم	<i>Fumaria officinalis</i>
١٦	قرن الجديان	النبات	قلويد Glaucine	الكحة - ضغط الدم	<i>Glaucium flavum</i>
١٨	جهرة	نبات مزهر	قلويد Protopene	ضد الروماتيزم - مخدر	<i>Hypecoum procumbens</i>
٢٥	خشخاش برى	ثمار	قلويد Papaverine	مخدر - منوم - مهدئ	<i>Papaver rhoeas</i>
٢٦	خشخاش أبو النور	ثمار (لبن)	قلويد Morphine	مخدر - مسكن للآلام	<i>Papaver somniferum</i>
الفصيلة السمسمية Fam. Pedaliaceae					
٢٢٦	سمسم	بذور	زيت Myresein	يصلح الصوت ويخصب البدن	<i>Sesamum indicum</i>

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
الفصيلة الصنوبرية Fam. Pinaceae					
Abies alba	مطهر - ضد الروماتيزم أمراض جلدية	راتنجات	أوراق - بذور	تنوب	١٠٩
Pinus Sp.	ضد عسر التبول	مواد راتنجية Borneol	خشب	صنوبر	١٢١
الفصيلة الفلفلية Fam. Piperaceae					
Piper nigrum	منبه للجهاز الهضمي انتفاخ	Piperine	بذور - ثمار	فلفل أسود	٢٨
الفصيلة الحملية Fam. Plantaginaceae					
Plantago major	ملين	مادة مخاطية	البذور	ودنة	١٠٥
Plantago psyllium	ملين	بسليم	البذور	بسليم	١٠٤
الفصيلة الحماضية Fam. Polygonaceae					
Polygonum aviculare	وقف النزيف - الجروح		سوق - أوراق	قروضاب	٧٣
Polygonum equisetiforme	جروح - سل رئوي	Rumicin	النبات	حماض	٧٣
Rheum officinale	مسهل - مطهر	Raioindin	ريزومات	راوند	٧٥

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الاسم اللاتيني
٢٥٢	خمضة	النبات	Rumicine	جروح - إمساك	Rumex acetosa
٢٥٢	خمضة	النبات	Rumicine	جروح - إمساك	Rumex dentatus
١١٠	كزبرة البئر	الأوراق السرخسية	تانيث وصمغ	ملين - إدرار الطمث إدرار البول - البرد	Adiantum capellus veneris
١٤٩	رجلة	النبات	Fam. Portulacaceae	إزالة آلام الأسنان	Portulaca oleraceae
٢٢٩	عين القط	النبات	Fam. Primulaceae	سام - مدر للبول معرف	Anagallis arvensis
٢٩	رمان	فلف - ثمار	قلويد Pelletierine	قتل الدودة الشريطية دوستاريا	Punica granatum

الاسم اللاتيني	القوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
الفصيلة الشقيقية Fam. Ranunculaceae					
<i>Adonis aestivalis</i>	منبه للقلب - مدر للبول	جليكوسيد Adonidin	النبات	عين الديك	٣٥
<i>Adonis macrocarpa</i>	سام	جليكوسيد	النبات	ناب الجمل (زغليل)	٢٣٨
<i>Anemone cornarium</i>	سام		النبات	أنيمون	٢٣١
<i>Delphinium ajacis</i>	سام	قلويد	النبات	عائق	٢٣٦
<i>Nigella sativa</i>	ضد الكحة - ضد الربو مدر للبول	جليكوسيد Nigelin	بذور	حبة سوداء	٧٢
<i>Ranunculus repens</i>	أمراض جلدية - سيلان	صبغة	أوراق	عقيق - زعلنتة	٢٥٠
<i>Ranunculus sceleratus</i>	أمراض جلدية - عرق النسا	صبغة	أوراق	عقيق - زعلنتة	٢٥٠
الفصيلة الرزديية Fam. Resedaceae					
<i>Reseda lateola</i>	معرق - مدر للبول طارد للديدان	فلافون - ليتولين صبغة - زيت	النبات	خزامى - بكم	٢٢٤

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية النفار، ماكو، لوجيا	الاسم اللاتيني
الفصيلة النعانية Fam. Rhamnaceae					
١٥١	عناّب	الثمار		الكحة - الإمساك الدوستاريا	<i>Zisphus jujuba</i>
١٥٢	سدر - نبق	الثمار - الأوراق الخشب		قابض - طارد للديدان ضد الإسهال - الالتهابات	<i>Zisphus spina-christe</i>
الفصيلة الوردية Fam. Rosaceae					
٥٣	زعرور	النبات		مدر للبول - موقف للزئيف	<i>Crataegus oxyacantha</i>
٥٩	بشملة	ثمار	جليكوسيد	حساوي الكلى - السكر	<i>Eriobotrya japonica</i>
١٩٢	ورد	بتلات	زيت Geraniol	تابل - عطور	<i>Rosa damascina</i>
١٢٣	توت برى	ثمار	رانتجات	قابض - خرخرة	<i>Rubus fruticosus</i>
الفصيلة البنية Fam. Rubiaceae					
١١	بن	بذور	قلويد Caffeine	مدر للبول مهدئ للأعصاب	<i>Coffea arabica</i>
٧٦	فوة	بذور		مقو للدم - مقو للباه	<i>Rubia tinctorum</i>

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
Fam. Rutaceae					
Citrus aurantifolia	مقو للمعدة ضد الأسقربوط	زيت	ثمار	ليمون بنزهير	٢٠٨
Citrus aurantium	ملين - بعض أمراض المعدة	جليكوسيدات	ثمار - أوراق	نارينج	٢٠٩
Citrus limetto	عطور	زيت	ثمار - أوراق	ليمون حلو	٢١٠
Citrus limonia	امتصاص الغازات الإسهال والدوسنتاريا	زيت	ثمار	ليمون أضاليا	٢١١
Citrus medica	قابضة - منشطة	Citron	ثمار وأزهار	ترنج	٢١٢
Citrus paradisi	ضد البرد	زيت وبكتين	وبراعم	ليمون هندي	٢١٣
Citrus sinensis	امتصاص الغازات وتفقيه الدم	Citral	ثمار	برتقال	١٦٤
Ruta graveolens	طارد للديدان تقوية الأوعية الدموية	جليكوسيد Barssmire	أوراق	سذب	٧٨

رقم النبات	الاسم العرفي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الغارما كولو جيا	الاسم اللاتيني
الفصيلة الصفصافية Fam. Salicaceae					
٧٤	حور	قلف	جليكوسيد Populin	مقو - ضد الروماتيزم	<i>Populus pyramidalis</i>
٧٩	صفصاف	قلف	جليكوسيد Salicin	طارد للديدان وضد الروماتيزم	<i>Salix alba</i>
الفصيلة السلفادورية Fam. Salvadoraceae					
٣٠	سراك	سيقان - قلف	قلويد	مسواك - مدر للبول	<i>Salvadora persica</i>
الفصيلة السابندية Fam. Sapindaceae					
٥٦	دودونيا	قلف - أوراق	قلويد	مقرف - قابض مخفض للحرارة	<i>Dodonaea viscosa</i>
الفصيلة خنك السبع Fam. Scrophulariaceae					
٥٥	ديجيتاليس	أوراق	جليكوسيد Digitalin	منظم لضربات القلب	<i>Digitalis purpurea</i>
٨٦	خرمة	جذور		غسيل للميون - تحسين الرؤية	<i>Verbascum sinuatum</i>
الفصيلة السيماروبية Fam. Simarubaceae					
٣٦	شجرة السماء	قلف	جليكوسيد	طارد للديدان	<i>Ailanthus glandulosa</i>

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
الفصيلة الباذنجية Fam. Solanaceae					
<i>Atropa belladonna</i>	مسكن	قلويد	أوراق	بلادونا	٤
<i>Capsicum annum</i>	توسيع حدقة العين	Atropine & Belladonnine	قسم زهرية	فلفل	٧
<i>Capsicum frutescens</i>	مدر للبول - مقو للمعدة	Capsaicine	بذور	فلفل شطة	٧
<i>Datura stramonium</i>	إزالة الآلام الروماتيزمية أزمات صدرية - مخدر	Capsaicine قلويد	بذور - ثمار أوراق	داتورة	١٣
<i>Hyocymus muticus</i>	مخدر - مسكن للآلام	Daturine & Atropine	أوراق	سكران	١٧
<i>Nicotiana glauca</i>	مبيد حشري - منع النزيف	Hyocyanine	أوراق	مصاص	٧١
<i>Nicotiana tabacum</i>	مخدر - معرق - مقهئ	Anabisine Nicotine	أوراق	طباق	٢٣
<i>Solanum nigrum</i>	سام		النبات	عنب الديب	٢٥٣
<i>Withania somnifera</i>	سام		النبات	سم الفراخ	٢٥٦
الفصيلة الأتلية Fam. Tamaricaceae					
<i>Tamarix nilotica</i>	أمراض جلدية سيلان - إسهال	تانين	قلف - أفرع	أتل	١٢٤

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الغار ماكرو لوجيا	الاسم اللاتيني
الفصيلة الزيتونية Fam. Tiliaceae					
١٩٨	زيتون	الثمرة والبراعم والقلف	جليكوسيد - زيت ومواد مخاطية	الروماتيزم وأمراض الجهاز التنفسي والجروح	<i>Tilia platyphyllos</i>
الفصيلة الحورافية Fam. Ulmaceae					
١٢٥	غرغار دردار أحمر	قلف	مواد مخاطية	ملطف للأنسجة الملتبنة	<i>Ulmus campestris</i>
الفصيلة الخيمية Fam. Umbelliferae					
١٥٦	خلة شيطاني	ثمار	زيت زيت	أمراض جلدية - بهاق ذئبة صدرية	<i>Ammi majus</i> <i>Ammi visnaga</i>
١٥٦	خلة بلدي	ثمار	زيت	إزالة الحصى	
١٥٧	شبت	ثمار	زيت Carvone	طارد للآرياح - ضد الغص	<i>Anethum graveolens</i>
١٥٨	حشيشة الملاك	النبات	زيت Angelic	فاتح للشهية - مهضم	<i>Angelica sylvestris</i>
١٥٩	كرفس	ثمار - عشب	زيت	علاج الروماتيزم - الكلى	<i>Apium graveolens</i>
Apole & Limonine					

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Carum carvi</i>	تنبيه الغدد المعدية والمعوية	زيت Carvone	ثمار	كراوية	١٦١
<i>Conium maculatum</i>	مسكن ومخدر يفيد في علاج الدوالي	قلويدات كوتنين وكونسين	ثمار	شوكران	٢٣٦
<i>Coriandrum sativum</i>	ضد المغص - منبه للمعدة	Linalol زيت	ثمار النبات	كزبرة	١٦٥
<i>Cuminum cyminum</i>	تنبيه المعدة - طارد للأرياح	زيت - ألدهيد	ثمار	كمون	١٦٦
<i>Daucus carota</i>	إدرار البول	زيت	جذور - بذور	جزر	١٧١
<i>Eryngium campestre</i>	الجهاز البولي - مدر للبول	جليكوسيد	جذور - أوراق	شقائق	٦١
<i>Foeniculum vulgare</i>	طارد للغازات - المغص	Anithole زيت	ثمار	فمر	١٧٥
<i>Ferula assa-foetida</i>	إزالة الانتفاخ - الغازات	راتنج Ferulioester	ثمار	حلتيت - أبو كبير	١١٧
<i>Petroselinum sativum</i>	إدرار البول - مقو للباه	زيت Apiole	العشب كامل	بقدونس	١٨٨
<i>Pimpinella anisum</i>	ضد المغص	Anithole زيت	ثمار	ينسون	١٨٩
إزالة الانتفاخ					
Fam. Urticaceae الفصيلة الحرقاقية					
<i>Parietaria officinalis</i>	مدر للبول - ملين	فلافونات	النبات	حشيشة الريح	١٤٦
<i>Urtica pilulifera</i>	نزيف الدم - ضعف المفاصل	مادة لاسعة	النبات	حريق	٢٥٤

رقم النبات	الاسم العربي	الجزء المستعمل	الجوهر الفعال	الفوائد الطبية الغفار ماكو لوجيا	الاسم اللاتيني
الفصيلة الغريبية Verbenaceae					
٩٨	ياسمين زفر	أوراق - جذور	زيت - أصباغ	أورام - أمراض جلدية وروماتيزم	<i>Clerodendron inerme</i>
٥٨	ديورانتا	أوراق	جليكوسيد Narcotine	قاتل للبعوض	<i>Duranta repens</i>
٢٤٢	لانتانا	النبات	ترايتيرين	سام - يفيد في التيانوس والمالاريا	<i>Lantana camara</i>
٦٧	لييا	أوراق	جليكوسيد Nodiflorine	مدر للبول - ملين	<i>Lippia nodiflora</i>
٨٧	رجل الحمام	النبات	جليكوسيد Verbenalin	مدر للبول والطمث	<i>Verbena officinalis</i>
الفصيلة البنفسجية Violaceae					
٨٨	بنفسج	النبات	جليكوسيد وزيت	مقيء - مسهل	<i>Viola odorata</i>
٨٨	بنسية	النبات	جليكوسيد وزيت	مقيء - مدر للبول	<i>Viola tricolor</i>
الفصيلة الرطراطية Zygophyllaceae					
٤٣	بلح الصحراء	ثمار - بذور	صابونيات Saponins	طارد للديدان - مسهل	<i>Balanites aegyptiaca</i>
٦٢	خشبات	النبات	جليكوسيد	مقو - مدر للبول - قابض	<i>Fagonia bruguieri</i>

الاسم اللاتيني	الفوائد الطبية الفارماكولوجيا	الجوهر الفعال	الجزء المستعمل	الاسم العربي	رقم النبات
Peganum harmala	طارد للديدان - مخدر	Harmaline	أوراق - بذور	حرمل	٢٧
Tribulus terrestris	مدر للبول - قابض	قلويد	ثمار - بذور	دقن الشيخ	٣٣
Fam. Zingiberaceae الفصيلة الزنجبارية					
Curcuma longa	منبه للمعدة ويساعد على الهضم	Termerol	ريزومات	كركم	١٧٠
Curcuma sedoaria	تابل - عمل العطور	Termerol	ريزومات	زدوار	١٧٠

IV فهرس النباتات الطبية والعطرية والمساهمة في الوطن العربي مرتبة حسب تأثيرها الفارماكوولوجي

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
------------	--------------	---------------	---------	----------------

أولا : نباتات تؤثر على الجهاز العصبي

(١) نباتات مخدرة ANAESTHETICS

١١٣	حشيش	Morphine	Cannabaceae	<i>Cannabis sativa</i>
٨	قات	Caffein	Celastraceae	<i>Catha edulis</i>
٢٢٣	شوكران	Conine	Umbelliferae	<i>Conium maculatum</i>
١٣	دائورة	Daturine	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>
١٧	سكران	Hyocyamine	Solanaceae	<i>Hyocyamus muticus</i>
٢٦	خشخاش	Morphine	Papaveraceae	<i>Papaver somniferum</i>
٢٧	حرميل	Harmaline	Zygophyllaceae	<i>Peganum harmala</i>

(٢) منبهات الجهاز العصبي ANALEPTICS

٢٥	عين الديك	Adonidine	Ranunculaceae	<i>Adonis aestivalis</i>
٢٠٠	بصل	Oil	Liliaceae	<i>Allium cepa</i>
١٥٥	ثوم	Oil	Liliaceae	<i>Allium sativum</i>

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Digitalis purpurea</i>	Scrophulariaceae	Digitalin	ديجاتالس	٥٥
<i>Ephedra alata</i>	Ephedraceae	Ephedrine	إيفيدرا	١٤
<i>Nerium oleander</i>	Apocynaceae	Oleandrin	دفعلة	٧٠
<i>Ranunculus repens</i>	Ranunculaceae	Protoamemonin	علقة	٢٤٩
<i>Thevetia nerifolia</i>	Apocynaceae	Thevetin	ثفيتيا	١٠٦
ANALGESICS مسكنات (٣)				
<i>Allium sativum</i>	Liliaceae	Oil	ثوم	١٥٥
<i>Metricaria chamomilla</i>	Compositae	Anthemis	بابونج روماني	٤٠
<i>Atropa belladonna</i>	Solanaceae	Atropine	بلادونا	٤
<i>Cannabis sativa</i>	Cannabaceae	Cannabine	حشيش	١١٣
<i>Coffea arabica</i>	Rubiaceae	Caffeine	بن	١١
<i>Foeniculum vulgare</i>	Umbelliferae	Anethol	شمر	١٧٥
<i>Humulus lupulus</i>	Moraceae	Lobulin	حشيشة الدينار	١١٨
<i>Hyocymus muticus</i>	Solanaceae	Hyocymam.	سكران	١٧
<i>Nigella sativa</i>	Ranunculaceae	Nigelline	حبة البركة	٧٢
<i>Papaver somniferum</i>	Papaveraceae	Morphine	عشخاش	٢٦

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
٢٧	حرملة	Harmaline	Zygophyllaceae	Peganum harmala
٨٠	بلسان	Sambungrin	Caprifoliaceae	Sambucus nigra

ثانيا : نباتات تعالج الجهاز التنفسي

(١) نباتات لعلاج نزلات البرد والكحة

١١٠	كبرية البئر	Tanins	Polypodaceae	Adiantum capellus veneris
٩١	خطمية		Malvaceae	Althaea officinalis
١١٥	مر	Myrrh	Burseraceae	Commiphora myrrha
٥٤	زعفران	Picrocrocin	Iridaceae	Crocus sativa
١٧٤	يو كالبتوس	Eucalyptol	Myrtaceae	Eucalyptus globulus
١٧٥	شمر	Anethol	Umbelliferae	Foeniculum officinalis
٦٣	عرق سوس	Glycyrrhizin	Leguminosae	Glycyrrhiza glabra
١٠٣	خبيزة	Malvidin	Malvaceae	Malva sylvestris
١٨١	روية	Marrubiin	Labiatae	Marrubium vulgare
١٨٩	ينسون	Anesol	Labiatae	Pimpinella anisum
١٢١	صنوبر	Turpentine	Pinaceae	Pinus sylvestris

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Teucrium polium</i>	Labiatae	Oil	جملة	١٩٦
<i>Thymus capitatus</i>	Labiatae	Thymol	زعتر (سعتر)	١٩٧
(٢) نباتات لعلاج الأزمات الصدرية والربو				
<i>Atropa belladonna</i>	Solanaceae	Atropine	بلادونا	٤
<i>Ephedra alata</i>	Ephedraceae	Ephedrine	إيفيدرا	١٤
<i>Datura stramonium</i>	Solanaceae	Daturine	داتورة	١٣
<i>Lepidium sativum</i>	Cruciferae	Glycotropaeolin	جارة	١٨٠
<i>Nigella sativa</i>	Ranunculaceae	Nigellin	حبة البركة	٧٢
<i>Panacratium maritimum</i>	Amaryllidaceae	Lycorine	سوسن	٢٤
ثالثا : نباتات تعالج الجهاز البولي				
(١) نباتات تفتت حصاوى الكلى				
<i>Caesalpinia sappan</i>	Leguminosae	Sterol	بسم	٦
<i>Cicer arietinum</i>	Leguminosae	Oil	حمص	٢٠٧
<i>Ephedra alata</i>	Ephedraceae	Ephedrine	إيفيدرا	١٤
<i>Eryngium campestre</i>	Umbelliferae	Saponin	شفاقيل	٦١

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
١٨٢	نعناع	Menthol	Labiatae	<i>Mentha piperita</i>
١٢٣	توت بري	Tanin	Rosaceae	<i>Rubus fruticosus</i>
DIURETICS				
(٢) مدرات للبول				
١٩٩	أبو طيلون	Oil	Malvaceae	<i>Abutilon pannosum</i>
١٥٦	خلة	Ammoidin	Umbelliferae	<i>Ammi majus</i>
١٣٢	هليون	Asparagin	Liliaceae	<i>Asparagus officinalis</i>
٣	عنصل	Asphodeline	Liliaceae	<i>Asphodelus microcarpus</i>
٤٨	لصف	Rutin	Caparidaceae	<i>Caparis spinosa</i>
٩٧	شيكوريا	Cichorin	Compositae	<i>Cichorium intybus</i>
٥٢	حفظل	Colocythin	Cucurbitaceae	<i>Citrullus colocynthis</i>
١١	بن	Theobromine	Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i>
٥٣	زعرور	Quercitin	Rosaceae	<i>Crataegus oxyacantha</i>
١١٦	سرو	Camphor	Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i>
١٥٠	خرشوف	Cynarin	Compositae	<i>Cynara scolymus</i>
١٦٩	سعد خشن	Oil	Cyperaceae	<i>Cyperus longus</i>
١٧١	جزر	Oil	Umbelliferae	<i>Daucus carota</i>

(٦١)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربى	رقم النبات
<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Tyramin	دهمية أبو بكر	٦٠
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	Leguminosae	Glycyrrhizin	عرق سوس	٦٣
<i>Hibiscus sabdariffa</i>	Malvaceae	Hibicin	كركدية	٦٦
<i>Iris florentina</i>	Iridaceae	Myristic	سوسن	٢١٩
<i>Lactuca sativa</i>	Compositae	Nit.	خس	١٤٣
<i>Linum usitatissimum</i>	Linaceae	Acid.	كتان	٢٢٠
<i>Morus alba</i>	Moraceae	Quercetrin	توت	٦٨
<i>Nasturtium officinalis</i>	Cruciferae	Nasturin	رشاد	٦٩
<i>Petroselinum sativum</i>	Umbelliferae	Anitol	بقدونس	١٨٨
<i>Polygonum aviculare</i>	Polygonaceae	Avicularin	قرضاب	٧٣
<i>Rubia tinctorum</i>	Rubiaceae	Alizarin	فوة	٧٦
<i>Ruscus esculentus</i>	Liliaceae	Ruscogenin	سفندر	٧٧
<i>Tribulus terrestris</i>	Zypophyllaceae	Oils	دقن الشيخ	٣٣
<i>Zea mays</i>	Gramineae	Oil	ذرة شامية	٢٢٧

الاسم اللاتيني

الفصيلة

الجوهر الفعال

الاسم العربي

رقم النبات

وابها : نباتات تعالج الجهاز الهضمي

(١) نباتات لمعالجة سوء المزاج

<i>Alnus glutinosa</i>	Betulaceae	Tanin	حورة	١١١
<i>Brassica alba</i>	Cruciferae	Singrine	خردل أبيض	٤٦
<i>Brassica nigra</i>	Cruciferae	Singrine	خردل أسود	٤٦
<i>Carum carvi</i>	Umbelliferae	Carvone	كراوية	١٦١
<i>Humulus lupulus</i>	Moraceae	Humuline	حشيشة الديار	١١٨

(٢) مسهلات PURGATIVES

<i>Aloe barbadensis</i>	Liliaceae	Alain	صبار	٣٨
<i>Melia azadirachta</i>	Meliaceae	Azardine	ازادارخت	٢١
<i>Balanites aegyptiaca</i>	Balanitaceae	Saponine	بلح الصحراء	٤٣
<i>Bryonia cretica</i>	Cucurbitaceae	Bryonine	لبية مرة	٤٧
<i>Caloptropis procera</i>	Asclepiadaceae	Latex	عشار	٩٤
<i>Cassia acutifolia</i>	Leguminosae	Camphene	سنامكي	٥١
<i>Cassia fistula</i>	Leguminosae	Alain	خيار شبر	٥٠

(٦٣)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Chelidonium majus</i>	Papaveraceae	Berberine	عروق صفر	١٠
<i>Citrullus colocynthis</i>	Cucurbitaceae	Colocynthin	حنظل	٥٢
<i>Colchicum autumnale</i>	Liliaceae	Colchicine	عكنة	١٢
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae		عليق	٩٩
<i>Croton tiglium</i>	Euphorbiaceae	Croton	كروتون	٢١٤
<i>Globularia alypum</i>	Globulariaceae	Oil	زريقة	٢١٥
<i>Plumeria acutifolia</i>	Apocynaceae	Latex	ياسمين هندي	١٩١
<i>Ricinus communis</i>	Euphorbiaceae	Oil	خروع	٢٢٥
<i>Sambucus nigra</i>	Caprifoliaceae	Sambungrin	بلسان	٨٠
<i>Sida jamaicensis</i>	Malvaceae	Saponin	سيدا	٨٢
<i>Sonchus oleraceus</i>	Compositae	Latex	جعضيفر	١٠٨
<i>Thevetia nerifolia</i>	Acanthaceae	Thevetoxin	ثيفيتيا	١٠٦

EMOLIENTS (٣) ملينات

<i>Alhagi mauroorum</i>	Leguminosae	Oil	عقول	١٢٨
<i>Bauhinia variegata</i>	Leguminosae	Astragalin	خف الجمل	٤٤
<i>Cerdia myxa</i>	Boraginaceae		مخيط	١٠٠

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
٢٠	ترمس	Lupenin	Leguminosae	Lupinus termis
١٨١	روينة	Oil	Labiatae	Marrubium vulgare
٢٢٢	زيتون	Oil	Oleaceae	Olea europaea
١٤٧	بلح		Palmae	Phoenix dactylifera
١٠٤	ودنة	Psyllium	Plantaginaceae	Plantago psyllium
٧٥	راوند	Amodin	Polygonaceae	Rheum officinalis
٢٥١	حماض	Rumicin	Polygonaceae	Rumex acetosa
٨٤	قتر هندي	Citric	Leguminosae	Tamarindus indica
١٩٦	جعدة	Oil	Labiatae	Teucrium polium

(٤) نباتات توقف الإسهال ANTIDIARRHOETICS			
٢٠٠	بصل	Oil	Liliaceae
٢١	ازادارخت	Azardine	Meliaceae
٥	عود ريح	Berberine	Berberidaceae
٤٨	لصف	Rutin	Capparidaceae
٢٠٥	خروب		Leguminosae
١٤	إيفيدرا	Ephedrine	Ephedraceae

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Juniperus communis</i>	Pinaceae	Terpene	عرعر	١٧٧
<i>Linum usitatissimum</i>	Linaceae	Oil	كتان	٢٢٠
<i>Myrtus communis</i>	Myrtaceae	Myrcine	مرسين	١٨٤
<i>Ocimum basilicum</i>	Labiatae	Ocimine	ريحان	١٨٥
<i>Polygonum aviculare</i>	Polygonaceae	Avicularin	قرضاب	٧٣
<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae		رجلة	١٤٩
<i>Punica granatum</i>	Punicaceae	Pelletierine	رمان	٢٩
<i>Rubia tinctorum</i>	Rubiaceae	Alizarin	فوة	٧٦
<i>Salvia aegyptiaca</i>	Labiatae	Oil	رعلة	١٩٤
<i>Zyzyphus spina-christi</i>	Rhamnaceae		نبق	١٥٢
ANTISPASMODICS (٥) ضد المغص				
<i>Acacia farnisiana</i>	Leguminosae	Geraniol	فتنة	١٥٣
<i>Achillea fragrantissima</i>	Compositae	Achiceine	أخيليا	١
<i>Allium sativum</i>	Liliaceae	Oil	ثوم	١٥٥
<i>Apium graveolens</i>	Umbelliferae	Oil	كرفس	١٥٩
<i>Carduus benedictus</i>	Compositae		خرشيف	٩٥

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
١٦١	كراوية	Carvone	Umbelliferae	Carum carvi
٢٠٩	نارنج	Oil	Rutaceae	Citrus aurantium
١٦٥	كزبرة	Linalol	Umbelliferae	Coriandrum sativum
٥٣	زععور	Lululin	Rosaceae	Crataegus oxyacantha
٥٤	زعفران	Picrocrocin	Iridaceae	Crocus sativa
١٦٦	كمون	Anithol	Umbelliferae	Cuminum cyminum
١٦٨	حفابر	Geraniol	Gramineae	Cymbopogon proximus
١٣	داتورة	Daturine	Solanaceae	Datura stramonium
٥٧	لبلاب	Dolichosine	Leguminosae	Dolichos lablab
١٧٤	يو كالتوس	Eucalyptol	Myrtaceae	Eucalyptus Sp.
١٧٥	شمر	Anethol	Umbelliferae	Foeniculum vulgare
٦٤	هيدرا ب. جبل المساكين	Hederin	Araliaceae	Hedera helix
١٧	سكران	Hyoeyamine	Solanaceae	Hyoeyamus muticus
١٧	سكران	Hyoeyamine	Solanaceae	Hyoeyamus albus
١٧٩	خراصي — لاو ندة	Linalol	Labiatae	Lavandula multifida
١٨٢	نعناع فلفلي	Menthol	Labiatae	Mentha piperita
١٨٣	فلية	Carvone	Labiatae	Mentha spicata

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Nigella sativa</i>	Ranunculaceae	Nigelline	حبة البركة	٧٢
<i>Ocimum basilicum</i>	Labiatae	Ocimene	ريحان	١٨٥
<i>Origanum vulgare</i>	Labiatae	Origanin	بردقوش	١٨٦
<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae		رجلة	١٤٩
<i>Rosemarinus officinalis</i>	Labiatae	Borneol	حصا لبان	١٩٣
<i>Salix alba</i>	Salicaceae	Salicin	صفصاف	٧٩
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiliaceae	Farnesol	زيزفون	١٩٨
(٦) مقيمات Emetics				
<i>Atriplex hortensis</i>	Chenopodiaceae	Chenopodine	أسفناخ	٤٢
<i>Colchicum autumnale</i>	Liliaceae	Colchicine	عكنة	١٢
<i>Sambucus nigra</i>	Capparidaceae	Sambungrin	بلسان	٨٠
<i>Urginea maritima</i>	Liliaceae	Scillaridin	بصل فرعون	٨٥
(٧) نباتات تماذج الانتفاخ Carminatives				
<i>allium cepa</i>	Liliaceae	Oil	بصل	٢٠٠
<i>Anethum graveolens</i>	Umbelliferae	Carvone	شبت	١٥٧
<i>Angelica archangelica</i>	Umbelliferae	Cetral	حشيشة الملاك	١٥٨

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
٤٤	خف الجمل	Isoquercitrin	Leguminosae	<i>Bauhinia variegata</i>
١٦١	كراوية	Carvone	Umbelliferae	<i>Carum carvi</i>
١١٥	مر	Myrrh	Burseraceae	<i>Commiphora myrrha</i>
١٦٥	كزبرة	Linalol	Umbelliferae	<i>Coriandrum sativum</i>
١٦٦	كمون	Anihol	Umbelliferae	<i>Cuminum cyminum</i>
١٧٥	شعر	Anihol	Umbelliferae	<i>Foeniculum vulgare</i>
١٨٢	نعناع	Menthhol	Labiatae	<i>Mentha piperita</i>
٧٢	الحبة السوداء	Nigelline	Ranunculaceae	<i>Nigella sativa</i>
١٨٥	ريحان	Ocimene	Labiatae	<i>Ocimum basilicum</i>
١٨٩	ينسون	Anethol	Umbelliferae	<i>Pimpinella anisum</i>
٢٨	فلل أسود	Piperine	Piperaceae	<i>Piper nigrum</i>
ANTHEMECTICS				
١٦٠	أفحوان	Calynduim	Compositae	<i>Calendula officinalis</i>
٩٥	خرشيف		Compositae	<i>Carduus benedictus</i>
٥٩	بشملة	Malic	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i>

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
VERMIFUGES طاردة للديدان (٩)				
<i>Achillea millefolium</i>	Compositae	Achiceine	قيصوم	١
<i>Achillea santolina</i>	Compositae	Achilleine	قيصوم	١
<i>Allium cepa</i>	Liliaceae	Oil	بصل	٢٠٠
<i>Allium sativum</i>	Liliaceae	Oil	ثوم	١٥٥
<i>Artemisia herba-alba</i>	Compositae	Santonin	شبح	٤١
<i>Calendula officinalis</i>	Compositae	Calendulin	أقحوان	١٦٠
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumariaceae	Fumarine	بقلة الملك	١٥
<i>Lupinus terminis</i>	Leguminosae	Lupenin	ترمس	٢٠
<i>Morus alba</i>	Moraceae	Quercetrin	توت	٦٨
<i>Peganum harmala</i>	Zygophyllaceae	Harmaline	حرميل	٢٧
<i>Polygonum aviculare</i>	Polygonaceae	Avicularin	قرضاب	٧٣
<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae		رجلة	١٤٩
<i>Polulus pyramidalis</i>	Salicaceae	Populin	حور	٧٤
<i>Punica granatum</i>	Punicaceae	Pelletierine	رمان	٢٩
<i>Ruta graveolens</i>	Rutaceae	Rutine	سذاب	٧٨

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
٣١	مرار	Senecine	Compositae	Senecio vulgaris
١٩٧	زعر	Thymol	Labiatae	Thymus capitatus
١٥٢	بنق		Rhamnaceae	Zyzyphus spina-christi

خامسا : نباتات تعالج الجهاز الدوري

ANTIANEMICS الأنيميا لملح (١) نباتات

١٦٠	أفحوان	Calyndulin	Compositae	Calendula officinalis
١٥٠	خرشوف	Cynarine	Compositae	Cynara scolymus
٢٤٦	برسيم حجازي		Leguminosae	Medicago sativa
٨٣	سبانخ	Saponin	Chenopodiaceae	Spinacea oleracea
٢٥٤	حريق	Glycotropaeolin	Urticaceae	Urtica pilalifera

ANTIDIABETICS نباتات تخفض نسبة السكر في الدم (٢)

١٥٤	سندقورة		Labiatae -	Ajuga iva
٢٠٠	بصل	Oil	Liliaceae	Allium cepa
١٥٥	ثوم	Allicine	Liliaceae	Allium sativa
١٥٩	كرفس	Oil	Umbelliferae	Apium graveolens

(٧١)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
Artemisia herba-alba	Compositae	Santonin	شبح	٤١
Cassia acutifolia	Leguminosae	Camphene	سنا — سنامكي	٥١
Centaurea calcitrapa	Compositae	Oil	حسك	١٦٢
Centaureum spicatum	Gentianaceae		حشيشة العقرب	١٣٤
Cucumis sativa	Cucurbitaceae		خيار	١٣٧
Daucus carota	Umbelliferae	Oil	جزر	١٧١
Erodium cicutarium	Geraniaceae	Tyramine	دهمية أبو بكر	٦٠
Eruca sativa	Cruciferae		جرجير	١٤٢
Helianthus annuus	Compositae	Oil	عباد الشمس	٢١٨
Lactuca sativa	Compositae	Oil	خس	١٤٣
Lupinus termis	Leguminosae	Lupenin	ترمس	٢٠
Morus alba	Moraceae	Quercettrin	توت	٦٨
Olea europaea	Oleaceae	Oil	زيتون	٢٢٢
Piper nigrum	Piperaceae	Piperine	فلفل أسود	٢٨
Portulaca oleracea	Portulacaceae		رجلة	١٤٩
Salix alba	Salicaceae	Salicin	صفصاف	٧٩
Spinacea oleracea	Chenopodiaceae	Saponins	سانخ	٨٣

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
٢٥٥	فول		Leguminosae	Vicia faba
٢٢٧	ذرة شامية	Oil	Gramineae	Zea mays
ANTIPYRETICS نباتات تخفف الحرارة (٣)				
٥١	سنا - سنامكي	Camphene	Leguminosae	Cassia acutifolia
١٦٧	حشيشة الليمون	Citral	Gramineae	Cymbopogon citratus
٥٦	دودونيا	Citrol	Sapindaceae	Dodonaea viscosa
٥٧	لبلاب	Dolichosin	Leguminosae	Dolichos lablab
٥٨	ديورانتيا	Saponins	Verbenaceae	Duranta repens
٦٧	ليسا	Nodiflorin	Verbenaceae	Lippia nodiflora
٢١	ازادارخت	Azardine	Meliaceae	Melia azaderachta
١٤٥	بصل الذئب	Nigelline	Liliaceae	Muscari comosum
٧٢	حبة البركة	Nigelline	Ranunculaceae	Nigella sativa
١٨٥	ريحان	Ocimene	Labiatae	Ocimum basilicum
٧٤	حور	Populin	Salicaceae	Populus pyramidalis
٨٧	رجل الحمام	Verbenalin	Verbenaceae	Verbena officinalis

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
----------------	---------	---------------	--------------	------------

(٤) معوقات DIOPHORETICS

Asparagus officinalis	Liliaceae	Asparagin	هليون	١٣٢
Berberis vulgaris	Berberidaceae	Berberin	عود ريح	٥٠
Capparis spinosa	Capparidaceae	Rutin	لصف	٤٨
Hedera helix	Araliaceae	Hederin	هيدرا — جبل المساكين	٦٤
Salix Sp.	Salicaceae	Salicin	صفصاف	٧٩

سادسا : نباتات تعالج الجهاز التناسلي

(١) نباتات مقوية للباه APHRODISIACS

Acacia arabica	Leguminosae	Arabin	سنط عربي	٨٩
Allium cepa	Liliaceae	Oil	بصل	٢٠٠
Aloe barbadensis	Liliaceae	Aloin	صبار	٣٨
Anacyclus pyrethrum	Compositae		عود العطاس	١٣٠
Papaver somniferum	Papaveraceae	Morphine	خشخاش	٢٦
Peganum harmala	Zygophyllaceae	Harmaline	حرميل	٢٧
Tribulus terrestris	Zygophyllaceae		دقن الشيع	٣٣

الاسم اللاتيني

الفصيلة

الجوهر الفعال

الاسم العربي

رقم النبات

EMENAGOGUES نباتات مدرة للطمث (٢)

<i>Adiantum capellus veneris</i>	Polypodiaceae	Tanin	كزبرة البشر	١١٠
<i>Anastatica heerochuntica</i>	Cruciferae		كف مرع	٣٩
<i>Angelica archangelica</i>	Umbelliferae	Angelic	حشيشة الملاك	١٥٨
<i>Artemisia herba-alba</i>	Compositae	Oil	شبح	٤١
<i>Boswellia carteri</i>	Burseraceae	Olibene	كندر — لبنان دكر	١١٢
<i>Capsella bursa pastoris</i>	Cruciferae	Choline	كيس الراعي	٤٩
<i>Cassia acutifolia</i>	Leguminosae	Camphene	سامكة	٥١
<i>Commiphora myrrha</i>	Burseraceae	Myrrh	مر	١١٥
<i>Cymbopogon citratus</i>	Gramineae	Geraniol	حشيشة الليمون	١٦٧
<i>Hedera helix</i>	Araliaceae	Hederin	هيدرا — جبل المساكين	٦٤
<i>Lavandula multifida</i>	Labiatae	Linalol	لاوندة — خزامي	١٧٩
<i>Origanum vulgare</i>	Labiatae	Citral	بردقوش	١٨٦
<i>Pimpinella anisum</i>	Umbelliferae	Anethol	ينسون	١٨٩
<i>Ruta graveolens</i>	Rutaceae	Rutin	سذاب	٧٨
<i>Sambucus nigra</i>	Labiatae	Sambunigrin	بلسان	٨٠

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
(٣) نباتات تساعد على الولادة				
Cucumis sativa	Cucurbitaceae		خيار	١٣٧
Lupinus termis	Leguminosae	Lupetin	ترمس	٢٠
Phoenix dactylifera	Palmae		بلح	١٤٧
Trigonella foenum graecum	Leguminosae	Trigonellene	حلبة	٣٤
Zea mays	Graminae		ذرة	٢٢٧
سابعاً : نباتات تعالج الأمراض الجلدية				
(١) نباتات تساعد على التئام الجروح				
Ajuga iva	Labiatae	Cyastrone	سندقورة	١٥٤
Artemisia herba-alba	Compositae	Santonin	شبح	٤١
Carica papaya	Caricaceae	Papain	باباظ	٩٦
Centaurea calcitrapa	Compositae		حسك	١٦٢
Convolvulus althoides	Convolvulaceae	Latex	عليق	٩٩
Cupressus sempervirens	Cupressaceae	Camphor	سرو	١١٦
Hedera helix	Aralliaceae	Hederin	هيدرا	٦٤

رقم النبات	الاسم العربى	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتينى
١١٩	حساء	Tanin	Lythraceae	Lausonia inermis
٦٨	توت		Moraceae	Morus alba
٧٣	قرضاب	Anthroquinone	Polygonaceae	Polygonum aviculare
٨٠	بلسان	Sambunegrin	Caprofoliaceae	Sambucus nigra
١٩٦	جعدة		Labiatae	Teucrium polium
(٢) نباتات تساعد على التئام الجروح				
٤١	شيع	Santonin	Compositae	Artemisia herba-alba
٢١٩	كان		Linaceae	Linum usitatissimum
١٨٤	مرسين		Myrtaceae	Myrtus communis
٢٢١	زيتون		Oleaceae	Olea europaea
١٠٤	بسليم		Plantaginaceae	Plantago psyllium
٢٢٥	خروع		Euphorbiaceae	Ricinus communis
(٣) نباتات تعالج الحروق				
١١١	حورة	Tanin	Betulaceae	Alnus glutinosa
٣٨	صيار	Aloin	Liliaceae	Aloe ferox
٤٥	بتولا	Betuline	Betulaceae	Betula alba

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Clerodendron inerme</i>	Verbenaceae		كليروندرون	٩٨
<i>Leontice leontopetalum</i>	Berberidaceae	Leonticine	رقف	١١٩
<i>Withania somnifera</i>	Solanaceae		سم الفراخ	٢٢٥
<i>Zea mays</i>	Gramineae	Oil	ذرة	٢٢٧
(٤) نباتات لعلاج الأمراض الجلدية				
<i>Allium sativum</i>	Liliaceae	Oil	ثوم	١٥٥
<i>Ammi majus</i>	Umbelliferae	Ammoidin	خلعة	١٥٦
<i>Carica papaya</i>	Papayaceae		باباظ	٩٦
<i>Centaurea calcitrapa</i>	Compositae		حسك	١٦٢
<i>Epilobium hirsutum</i>			علقة	١٤١
<i>Ficus sycomorus</i>	Moraceae		جميز	١٠٢
<i>Foeniculum vulgare</i>	Umbelliferae	Anithole	شمر	١٧٥
<i>Fumaria officinalis</i>	Papaveraceae	Fumarine	كليلة	١٥
<i>Hedera helix</i>	Araliaceae	Hederin	هيدرا	٦٤
<i>Juniperus communis</i>	Pinaceae	Terpenes	عرعر	١٧٧
<i>Lupinus termis</i>	Leguminosae	Lupenin	ترمس	٢٠

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
٧٠	دفله	Nerium	Apocynaceae	Nerium oleander
٧٨	سذاب	Rutin	Rutaceae	Ruta grageolens
٣٤	حلبة	Trigonellin	Leguminosae	Trigonella foenum graecum
١٢٤	أثل	Tanins	Tamaricaceae	Tamarix nilotica
٨٠	بلسان	Sambunigrin	Caprifoliaceae	Sambucus nigra
١٢٥	غرغار	Tanins	Ulmaceae	Ulmus rubra
(٥) نباتات لتقوية وضميل الشعر				
١٣٢	كشك ألمانظ	Asparagin	Liliaceae	Asparagus officinalis
٤٠	بابونج	Anthemic	Compositae	Anthemis nobilis
٨١	فول العرب	Saponins	Caryophyllaceae	Saponaria officinalis
٢٥٣	حريق		Urticaceae	Urtica urens

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
ثامنيا : نباتات تعالج الروماتيزم				
ANTIRHEUMATICS				
Abies alba	Pinaceae	Balsam	تنوب	١٠٩
Adhatoda vasica	Malvaceae		أدهاتودا	١٢٦
Alhagi maurorum	Leguminosae		عقول	١٢٨
Allium sativum	Liliaceae		ثوم	١٥٥
Aloe ferox	Liliaceae	Aloin	صبار	٣٨
Anagallis arvensis	Primulaceae		عين القط	٢٢٨
Apium graveolens	Umbelliferae		كرفس	١٥٩
Asparagus officinalis	Liliaceae	Asparagin	كشك الماظ	١٣٢
Balanites aegyptiaca	Balanitaceae	Saponin	بلح الصحراء	٤٣
Bryonia cretica	Cucurbitaceae	Bryonin	لغة مرة	٤٧
Capparis spinosa	Capparidaceae	Saponin	لصف	٤٨
Cichorium endivia	Compositae	Intybin	هندباء	٩٧
Coriandrum sativum	Umbelliferae	Linalol	كزبرة	١٦٥

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Cymbopogon citratus</i>	Gramineae	Citral	حشيشة الليمون	١٦٧
<i>Cymbopogon proximus</i>	Gramineae	Geraniol	حلفاير	١٦٨
<i>Dodonea viscosa</i>	Sapindaceae	Citrol	دودونيا	٥٦
<i>Eriobotrya japonica</i>	Rosaceae	Malic	بشملة	٥٩
<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Eucalyptol	يوكولبتوس	١٧٤
<i>Hypecoum procumbens</i>	Papaveraceae	Protopine	جهيرة	١٨
<i>Laurus nobilis</i>	Lauraceae	Lauriol	غار	١٧٨
<i>Melia azadarachta</i>	Meliaceae	Azaridine	أزادراخت	٢١
<i>Myrtus communis</i>	Myrtaceae		مرسين	١٨٤
<i>Ocimum basilicum</i>	Labiatae	Ocimine	ريحان	١٨٥
<i>Origanum majorana</i>	Labiatae		بردقوش	١٨٦
<i>Pinus sylvestris</i>	Pinaceae	Borneol	صنوبر	١٢١
<i>Plantago ovata</i>	Plantaginaceae	Psyllium	بلتاجو	١٠٤
<i>Populus nigra</i>	Salicaceae	Populin	حور	٧٤
<i>Ranunculus repens</i>	Ranunculaceae	Protoamemonin	شقيق	٢٤٩
<i>Reseda luteola</i>	Resedaceae	Luteolin	خزام	٢٢٤

(٨١)

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
Rosmarinus officinalis	Labiatae	Borneol	حصا اللبان	١٩٣
Salix alba	Salicaceae	Salicin	صفصاف	٧٩
Sinapis alba	Cruciferae	Sinigrin	خردل أبيض	٤٦
Thymus vulgaris	Labiatae	Thymol	زعتر	١٩٧
Tilia platyphyllos	Tiliaceae	Farnesol	زيرفون	١٩٨

Achillea fragrantissima	Composita	Achiceine	قيصوم	١
Acacia nilotica	Leguminosae	Arabin	سنت عرنى	٨٩
Acacia arabica	Leguminosae	Arabin	سنت عرنى	٨٩
Agave sisilana	Amaryllidiceae		آجاف	١٢٧
Allium sativum	Liliaceae		ثوم	١٥٥
Anagallis arvensis	Primulaceae		عين القط	٢٢٩
Angelica archangelica	Umbelliferae	Phelandrene	حشيشة الملاك	١٥٨
Asparagus officinalis	Liliaceae	Asparagin	كشك — ملاظ — هليون	١٣٢

تاسعا : نباتات تعالج الأسنان

(١) نباتات لتسكين آلام الأسنان

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
١١٤	كازوارينا	Casuarin	Casuarinaceae	Casuarina equisetifolia
٦٤	هيدرا - جبل المساكين	Hederin	Araliaceae	Hedera helix
١٧	سكران	Hocyanin	Solanaceae	Hocyanus muticus
١٨٦	بردقوش		Labiatae	Organum vulgare
٢٦	خشخاش	Morphine	Papaveraceae	Papaver somniferum
١٢٢	مسلكي - فستق		Anacardiaceae	Pistacea lentiscus
٢٢٥	خروع	Ricinine	Euphorbiaceae	Ricinus communis
٧٨	سذب	Rutin	Rutaceae	Ruta graveolens
١٩٤	رعدة	Terpene	Labiatae	Salvia aegyptiaca
١٩٥	مرية	Terpene	Labiatae	Salvia officinalis
(٢) نباتات لنظافة الأسنان				
٨٩	سنت عروى	Arabin	Leguminosae	Acacia arabica
٤٥	بتولا	Betulin	Betulaceae	Betula alba
٦٥	هيسكس - جب المسك	Hibicin	Malvaceae	Hibiscus rosa sinensis
١٤٤	مانجو		Anacardiaceae	Mangifera indica
٢١	ازادارخت	Azaridine	Meliaceae	Melia azadirachta

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
<i>Peganum harmala</i>	Zygophyllaceae	Harmalin	حرميل	٢٧
<i>Pistacea lentiscus</i>	Anacardiaceae		مسطكى	١٢٢
<i>Populus pyramidalis</i>	Salicaceae	Populin	حور	٧٤
<i>Salvadora persica</i>	Salvadoraceae	Trimethylamin	مسواك	٣٠
<i>Tamarindus indica</i>	Leguminosae	Acids	تمر هندي	٨٤
(٣) نباتات لعلاج التهاب الفم				
<i>Citrus aurantifolia</i>	Rutaceae	Limonine	ليمون بنزهر	٢٠٨
<i>Quercus alba</i>	Fagaceae	Quercetrin	بلوط	
<i>Vicia faba</i>	Leguminosae		فول	٢٥٥

عاشرا : نباتات مطهرة وضد السموم والسرطان

(١) مطهرات ANTISEPTICS

<i>Abies alba</i>	Pinaceae	Balsam	تنوب	١٠٩
<i>Acacia arabica</i>	Leguminosae	Arabin	سنط عربي — قَرْد	٨٩
<i>Achillea millefolium</i>	Compositae	Achiceine	أكيليا — قيصوم	١
<i>Adhatoda vasica</i>	Acanthaceae		أدهاتودا	١٢٦

رقم النبات	الاسم العربي	الجوهر الفعال	الفصيلة	الاسم اللاتيني
١٥٥	ثوم		Liliaceae	Allium sativum
٢٣١	شقائيق النعمان		Ranunculaceae	Anemone coronarium
٤١	شيج	Santonin	Compositae	Artemisia helba-alba
٥١	سنامكة	Camphin	Leguminosae	Cassia acutifolia
١٧٤	يوكالبتوس	Eucalyptol	Myrtaceae	Eucalyptus Sp.
٦٢	فاجونيا		Zygophyllaceae	Fagonia bruguieri
١١٨	حشيشة الديار	Humulin	Moraceae	Humulus lupulus
١٧٧	عرعر	Terpene	Pinaceae	Juniperus communis
١٧٩	لاوندة — خزامي	Linalol	Labiatae	Lavandula multifida
١٨٢	نعناع	Menthol	Labiatae	Mentha piperita
١٨٤	مرسين		Myrtaceae	Myrtus communis
٧٤	حور	Populin	Salicaceae	Populus pyramidalis

الاسم اللاتيني	الفصيلة	الجوهر الفعال	الاسم العربي	رقم النبات
(٢) نباتات تعالج السموم				
Anethum graveolens	Umbelliferae	Carvone	شبت	١٥٧
Coriandrum sativum	Umbelliferae	Linalol	كزبرة	١٦٥
Nerium oleander	Apocynaceae	Oleandrin	دفلة	٧٠
Nigella sativa	Ranunculaceae	Nigelline	حبة سوداء	٧٢
Ruta graveolens	Rutaceae		سذاب	٧٨
Verbascum sinuatum	Scophulariaceae	Saponins	خرمة	٨٦
(٣) نباتات ضد السرطان ANTICANCERS				
Echium cerecium	Boraginaceae		كحلبة	٢٣٧
Mirabilis jalapa	Nyctaginaceae	Trigonelline	شب الليل	٢٢
Chatharanthus roseus	Apocynaceae	Vinblastin	دنكار	٩

حادى عشر : نباتات منمنمة

DEVEPAGES نباتات منمنمة

<i>Citrus sinensis</i>	Rutaceae	Limonine	برتقال	١٦٤
<i>Cratonia siliqua</i>	Leguminosae		خروب	٢٠٥
<i>Mentha piperita</i>	Labiatae		نعناع	١٨٢
<i>Morus alba</i>	Moraceae		توت	٦٨
<i>Rheum officinalis</i>	Polygonaceae	Amodine	راوند	٧٥
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	Leguminosae		عرق سوس	٦٣
<i>Hibiscus sabdariffa</i>	Malvaceae	Hibicin	كر كديه	٦٦
<i>Pimpinella anisum</i>	Umbelliferae	Anithole	بنسون	١٨٩
<i>Rosa Sp.</i>	Rosaceae	Rosin	ورد	١٩٢
<i>Zizyphus jujuba</i>	Rhamnaceae		عنايب	١٥١
<i>Tamarindus indica</i>	Legumenosae		تمر هندي	٨٤

المراجع العربية

- ١ — النباتات الزهرية : نشأتها — تطورها — تصنيفها .
الدكتور شكرى إبراهيم سعد .
الطبعة الثامنة — جامعة الإسكندرية ١٩٨٧
- ٢ — نباتات العقاقير والتوابل : مكوناتها وفوائدها .
الدكتور شكرى إبراهيم سعد .
دار الفكر العربى — القاهرة ١٩٧٧
- ٣ — نباتات الكويت الطبية .
عيسى جاسم محمد الخليفة ، والدكتور محمد صلاح الدين شركس .
مؤسسة الكويت للتقدم العلمى ١٩٨٤
- ٤ — النباتات البرية لدولة قطر .
المنظمة العربية للتنمية الزراعية ١٩٨٣
- ٥ — مقدمة الغطاء النباتى فى اليمن .
الدكتور أحمد الجيشى ، والدكتور كلاوس مولر .
المؤسسة الألمانية للتعاون الفنى ١٩٨٤
- ٦ — ذخيرة العطار أو تذكرة داود فى ضوء العلم الحديث .
حسن عبد السلام .
مطبعة المعارف — القاهرة ١٩٤٢

المراجع الأجنبية

1. Medicinal Plants of North Africa.
Dr. Loutfy Boulos.
Inc. Algenoc, Michihan, U. S. A. 1983.
2. Medicinal Plants in Libia.
Dr. Fauzy Kotb.
Asab Encyeolopedia House, Beirut, Lebenon, 1985.
3. Poisonous Plants of Libya.
Abdallah A. El-Cadi & A. B. M. Enayet Hossain.
Enmorobly 20049 Ben-Gazy, 1986.
4. Plant Wealth of Iraq.
H. L. Chakravarty.
Ministry of Agrieuture & Agrarian Reforns, 1973.
5. Medicinal Plants of The Sudan, Part I.
Gamal El-Ghazaly.
Khartoum University Press, 1986.
6. Basic Pharmacology.
Dr. M. Mahfouz & Dr. Raouf A. Maguid.
7. Flowers of Saudi Arabia.
Scheila collenette.
Scorpion Publication LTD London, 1985.
8. Students Flora of Egypt.
Vivi Taekholm.
Cairo University, 1974.

أعضاء فريق الدراسة

الأستاذ الدكتور شكرى إبراهيم سعد (رئيس الفريق) .

أستاذ النبات بكلية العلوم — جامعة الإسكندرية

الدكتور عبد الله القاضى .

رئيس قسم النبات بكلية العلوم — جامعة الفاتح — طرابلس — ليبيا

الدكتور عبد الكريم محمد صالح .

أستاذ مشارك بمعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية — المركز القومى للبحوث بالخرطوم

أشرف على إعداد وإخراج هذا الكتاب :

مستشار فريق الدراسة

الأستاذ الدكتور / عبد العزيز محمد خلف الله

مدير إدارة الإنتاج النباتى بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية

وأستاذ البساتين بكلية الزراعة — جامعة الإسكندرية


دار مصر للطباعة
سميد جودة السحار وشركاه



المنظمة العربية للتنمية الزراعية

النباتات الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربي

الجزء الثاني





مقدمة

كلمة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

في إطار الأهداف والموجهات الرئيسية لعملية التطوير والتحديث الشاملة فقد أفردت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ضمن أولويات مجالاتها التي تشتمل عليها الاستراتيجية المجازة من جمعيتها العمومية المكونة من معالي وزراء الزراعة العرب في مجال تنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة ومكافحة التصحر، أخذاً في الاعتبار خطورة وأبعاد المشكلات المرتبطة بالبيئة وحماية الموارد الطبيعية في الأقطار العربية والتي تشمل المحافظة على الأصول الوراثية للثروة النباتية والحيوانية والتنوع الإحيائي عامة وحمايتها وصيانتها وتسجيلها والاستفادة منها وفق المتطلبات الدولية لحماية الملكية الفكرية، حماية لها من التغول والقرصنة للمورثات المتاحة من الموارد الطبيعية وبخاصة النباتات البرية الطبية منها والعطرية، وذلك عن طريق التعريف بها من حيث التصنيف والموطن والمواد الفعالة والأثر الطبي.

هذا وقد سبق للمنظمة أن أصدرت كتاب عن النباتات الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربي في عام ١٩٨٨ يحتوي على (٢٥٦) نباتاً. وقد وجد ذلك الكتاب قبولا طيباً من المختصين والمهتمين بهذا المجال، واستكمالا وتواصلا مع هذا الجهد فقد رأت المنظمة إصدار الجزء الثاني من كتاب النباتات الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربي مستندة على العديد من المراجع وقواعد المعلومات الدولية المتاحة على شبكة الإنترنت والاستفادة بالخبراء في هذا المجال حتى يخرج الكتاب بمستوى عال يكون مرجعا مهما للباحثين والعاملين في هذا المجال.

اتبع الجزء الثاني من الكتاب نفس الأسلوب التنظيمي الذي ورد في الجزء الأول منه من حيث التعريف بالاسم العلمي والإنجليزي والعربي لكل نبات بالإضافة لصور موثقة للتعرف عليه ومقارنته بما هو متاح للباحث. وفي هذا الإطار فقد استخدم نظام التسلسل الأبجدي للحروف اللاتينية لترتيب النباتات بدلا من أسلوب التركيب الكيميائي الذي اتبع في الجزء الأول، مما يبسط ويسهل من عملية البحث عن النباتات التي وردت في الكتاب.

ويسرني كمدير عام للمنظمة ومختص ومهتم بهذا المجال أن أقدم هذا الجهد المتميز للباحثين والعاملين في هذا المجال، آملا أن يكون عضدا وسندا للبحث العلمي ويساعد الأقطار العربية في الحفاظ على مواردها النباتية والاستفادة منها.

والله الموفق


الدكتور / سالم اللوزي
المدير العام

(1)

بروس

الاسم اللاتيني: *Abrus precatorius*

الاسم الإنكليزي: Love bean, Rosary bean,

الأسماء الأخرى: حبة العروس

العائلة: البقولية Fabaceae

موطن النبات: أمريكا ثم انتشر إلى شمال أفريقيا والسودان

الوصف النباتي: نبات بقولي ينمو في المناطق الحارة

والمعتدلة ساقه دقيقة عارشة والأوراق

مقابلة ريشية لونها اخضر، الأزهار ابطية

الارتكاز، متجمعة في ألوان حمراء وبيضاء بمثابة قرون، والقرون تحتوي 4 بذور.

الجزء الطبي: الثمار

المواد الفعالة: قلويدات Abrasine وبروتينات Abrin A وفلافونيدات Aburuquinone
الأثر الطبي: تستعمل لشفاء الملتهمة (داء في العين). مدر للبول، طارد للبلغم ومعالجة السعال، لمعالجة الجروح والأورام ومضاد للمغص.

* نوع آخر لنفس الجنس *A. CANTONIENSIS*



(2)

رجل الدب



الاسم اللاتيني: *Acanthus mollis* L

الاسم الإنكليزي: Bear's Breech, Bear's Foot,

الأسماء الأخرى: أفتارخصة، أفتوس، شوكة اليهود، رخصة.

العائلة: الافنتيات (الكانثية) (Acanthaceae)

موطن النبات: الجبال الصخرية شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نبات مر معمر له ساق منتصب يصل ارتفاعه

إلى حوالي 40 سم، الأوراق قاعدية، الأزهار

بيضاء أرجوانية، تزهّر في تموز (يوليو) والبذور لامعة سمراء.

الجزء الطبي: الأوراق والأزهار والجذور

المواد الفعالة: سكريات، تانين، أصماغ، عناصر معدنية.

تحتوي على مركبات فلافونية وكاربوهيدراتية ومركبات بروتينية ونتيروجنية

إضافة إلى فيتامين ج وأحماض دهنية وفلافينودية مثل كامفيرول وكوارسيتين.

الأثر الطبي: منشط للصفراء، ملين. تستخدم للالتهابات، والأورام وكغرغرة ومطهر كمضاد

للبكتيريا في حالات التهابات الحنجرة والفطريات

الملاحظات: * اعتبره ديوسقوريدوس واق للسل ومدر للبول.

* أنواع أخرى لنفس الجنس *A. montanus* و *A. spinosissimus*



(3)

خائق الذنب

الاسم اللاتيني: *Aconitum napellus* SSP. NEOMONTANUM

الاسم الإنكليزي: Wolf's Bane, Monkshood, Aconite

الأسماء الأخرى: أكونيتم، قلنسوة الراهب، اقونيطن، قاتل النمر.

العائلة: الشقية (الحوذانيات) Ranunculaceae

موطن النبات: المراعي والغابات في شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: أعشاب حولية ارتفاعها 50 سم، له أوراق مركبة راحية، الأزهار زرقاء في

نورات راسية والجذور متكونة من بصلتين.

الجزء الطبي: الجذور والسيقان

المواد الفعالة: قلويدات بنسبة 1.2 % أهمها (Aconitine) و تحتوي على مركبات فلافونية

وكاربوهيدراتية ومركبات بروتينية ونتيروجنية اصافة الى Neopelline فيتامين

ج واحماض دهنية وفلافينودية مثل كامفيرول

وكوارسيتين.

الأثر الطبي الاستعمال التقليدي تستخدم العروق عند غياب

الطمث وكذلك للإجهاض وللضعف الجنسي عند

الرجال كما تستخدم لعاج ارتفاع درجات الحرارة

وأمرض القلب.

السمية: الإنسان والقطة

أعراض التسمم: تقيؤ

العلاج: غسيل معدة وإعطاء المريض سوائل

المواد السامة: Aconitine , Aconitine

الملاحظات: * لكونه سام يجب الحذر الشديد عند استخدامه.

* استخدم معجون السيقان لتلطيف رؤوس الحراب

وسهام الصيد. ويستخدم لإعدام المحكوم عليهم كما

كان يخلط مع اللحم ويلقى للذئاب فإذا أكلت منه هلك.

* عقار اسمه (Aconti radix) يستخدم كمسكن مضاد للالتهابات وخافض

للحرارة مصنع من الجذور الدرنية الجافة لهذا النبات. (مسجل في الدستور الطبي

الألماني).

* أنواع أخرى لنفس الجنس

A. anthora

A. anthora

A. lamarckii

A. altissimum

A. axilliflorum

A. lamarckii

A. variegatum



(4)

الذريرة

الاسم اللاتيني: *Acorus calamus* L.

الاسم الإنكليزي: Sweet Flag, Sweet Calomel, Myrtle Grass Myrtle
Sedge, Hemarthia

الأسماء الأخرى: قصب الذريرة، عود الوجد، كثة، قصب الطيب، الوجد، أقورون، عرق
اكر، عود الريح، القصب العطري.

العائلة: القلقاسية (الافوية) و (الايكرية) Araceae

موطن النبات: ضفاف الأنهار والمستنقعات في جنوب شرق آسيا وينتشر حاليا في شرق
البحر الاحمر.

وصف النبات: نبات عشبي معمر، ارتفاعه 50 سم، الاوراق ناعمة منبسطة، النورة
خضراء طويلة تحمل أزهار صفراء خضراوية (ايار - مايو)، الجذر
رايزومات متفرعة مدادة.

الجزء الطبي: الجذور (الرايزومات).

المواد الفعالة: يحتوي على زيت عطري فصلت منه عدد من المركبات التربينية احادية
وثنائية وسيسكوتربينية كما يحتوي على فايتمين ج يحتوي الزيت العطري على
مادة *Asrone* الازرون المسرطنة.

الأثر الطبي: مقوي ومهدئ، طارد للغازات، هاضم ومخفض للحميات خصوصا حمى
الملاريا ومطعم ولعلاج مرض السعال المزمن ومزيل لآلام الصدر والمعدة
والكبد، يستخدم كبديل للنكوتين للمدخنين للإقلاع عن التدخين وكمنشط للدورة
الدموية في حالات الأورام والإصابات. والاستسقاء وخفقان وضعف القلب.
وهو يُستخدم الآن في الطب والتجميل، وطارد للبق.

*يجب التركيز على أن الرسول صلى الله عليه أستعمله خارجيا (بين الأصابع وطيب)

* أنواع أخرى *A. aromaticus*

Acorus Griffithii (Latin Binomial), *Acorus Casia* (Latin Binomial), *Acorus*
Odoratus (Latin Binomial), *Acorus Nilaghiensis* (Latin Binomial) *Acorus*
Aromaticus (Latin Binomial), *Acoro Verdadero*, *Acorus Belangeri* (Latin
Binomial) *Acorus Asiaticus* (Latin Binomial)

*مذكور في دستور الأدوية الألمانية كعقار طبي.





(5)

بلسانية

الاسم اللاتيني: *Actea spicata* L.

الاسم الإنكليزي: Herb Christopher, Actea

الأسماء الأخرى: الأقطية السنبلية، خمانية سنبلية.

العائلة: الشقيقية Ranunculaceae

موطن النبات: شمال أفريقيا

الوصف النباتي: أشجار ارتفاعها 2 متر، الأوراق مسننة، الثمار ذات شكل مستطيل غنية

بنوى صلبة، وهي سامة.

الجزء الطبي: الثمار

المواد الفعالة: Protoanemonin

الأثر الطبي: غير معروف

أعراض التسمم: تكوي الجلد وتلتهب الأمعاء

العلاج: وضع كريمات على المناطق المصابة

الملاحظات: * الحذر عند استخدام الثمار لأنها سامة.



(6)

بلوط بري

الاسم اللاتيني: *Aesculus hippocastanum* L.

الاسم الإنكليزي: Horse Chestnut, Rosskastanie

Marronner

الأسماء الأخرى: الكستناء، قسطلة الحصان.

العائلة: الكستنائية (القننديات) Hippocastanaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: شجرة معمرة (قد يصل عمرها إلى 250

سنة) ارتفاعها 20 متر، الساق بني مشقق،

الأوراق مكونه من 5-7 وريقات مسننة، الأزهار بيضاء مبقعة على شكل

عنقود، الثمرة تحتوي 3 بذور.

الجزء الطبي: القشرة والثمار.

المواد الفعالة: فصل مركبات فلافونية من البذور "الروتين" ومواد كحولية. Saponine

و Quercetin و Aescoculin و Praxin

الأثر الطبي: علاج ضد الحمى، علاج لإمراض الجلد. تستخدم شعبيا لاورام الثدي

والسرطان كما تستخدم لعلاج البواسير والدسنتاريا الاميبية وللنزيف المهبل

وجدت فعالة ضد البكتيريا في المعمل ومصاد للإلتهابات و للفيروسات

الملحوظات: * صنعت ألمانيا من الأزهار عقار Flores Hippocastani يستخدم

كدواء لالتأم الجروح ومقوي للجسم وضد جرب الجلد. وعقار

Fructus Hippocastani من المجموع الخصري لعلاج البواسير واحتقان

الأوردة.

* استخدمت ثمارها وأوراقها علفا للأحصنة ويستخرج من ثمارها زيت للإنارة

وصناعة الصابون والخل

ومواد تجميلية.* أنواع أخرى

لنفس الجنس

A. arguta

A. CALIFORNICA

A. GLABRA

A. HIPPOCASTANEUM

A. OCTANDRA

A. PARVIFLORA





والعطرية والسامة في الوطن العربي - الجزء الثاني

(7)

بقدونس كاذب

الاسم اللاتيني: *Aethusa cynapium* L

الاسم الإنكليزي: Pitit cigue

Hemlock, Fool's Parsley, Dog poison

الأسماء الأخرى: الشوكران الصغير

العائلة: الخيمية Umbelliferae أو Apiaceae

موطن النبات: أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: نبات عشبية ارتفاعها 30-100 سم، أوراقها

خضراء لامعة ريشية الشكل، الأزهار مظلية بيضاء

ذات حوامل طويلة، الثمار خيمية عديدة.

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: أملاح معدنية، فيتامينات، أنزيمات تحتوي على فلافونويدات * Rutin

Flavonol والكينات كحولية Alkenynol C5 or More.

الأثر الطبي: تقلل من تهيج المعدة والأمعاء والبواسير وجدت فعالة ضد البكتيريا في المعمل

ومضاد للالتهابات و للفيروسات

الملحوظات: * نبات سام لبعض الناس ولكنه ذو سمية عالية للجردان والأبقار

* استخرج في ألمانيا من هذا النبات عقار Herbe Aethusae يستخدم كمنعش

في حالات التشنج والدوخة والإغماء وضد المغص والإسهال.



(8)

برجمان

الاسم اللاتيني: *Ageratum conyzoides*

الاسم الإنكليزي: Herbe-A-Femme, Goat Weed

الأسماء الأخرى: كورنك، بركان

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: عشب بري شتوي، ارتفاعه 30 سم، الأوراق متقابلة مثلثة الشكل إلى قلبية مسننة، الأزهار بنفسجية أو زرقاء متجمعة في نورة (كانون أول - ديسمبر).

الجزء الطبي: الجذور والأوراق.

المواد الفعالة: يحتوي على زيت عطري يتكون من التربينات الأحادية والثنائية سيسكوتيربينات كما يحتوي على فيتامين ب وفيتامين أ.

الأثر الطبي: لعلاج الاضطرابات المعدية والمعوية، وكمعرق ومقوي ومنبه ومسهل. يستخدم كمضاد للمقصد وطارد للغازات ومدر للطمث ويستخدم كخافض لدرجة الحرارة.

الملاحظات: * كانت تسمى العائلة Asteraceae (Compositae).

* يزرع في الأحواض والأصص لتزيين الحدائق

* للجنس *Ageratum* أنواع أخرى هي

A. houstonianum

A. microcarpum

A. mexicanum

A. laseauxii





(9)

غافت

الاسم اللاتيني: *Agrimonia eupatoria*

الاسم الإنكليزي: Liverwort, Herba Agrimony

الأسماء الأخرى: أوفاطوريون، العرنج

العائلة: الوردية (الورديات) Rosaceae

موطن النبات: الأراضي الطينية في شمال أفريقيا.

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 50 سم، ساقه منتصبه مغطاة بالوبره، الأوراق مكونة من

6 وريقات مسننة، الأزهار صفراء صغيرة (حزيران - يونيو) لها رائحة خفيفة.

الجزء الطبي: المجموع الخضري الجاف.

المواد الفعالة: زيت، تانين، راتنج يحتوي على فلافينويدات Quercetin-3'-O-Beta-D-

Glucoside إلى جانب تيربينات.

الأثر الطبي: مدر للبول ولعلاج أمراض الكبد ومرطب للأيدي ومدر للطمث، لعلاج التهاب

القولون، لعلاج التهاب المثانة، غرغرة لعلاج التهاب اللوزتين. فعال في علاج

أمراض السكري في الجرذان ومضاد لعدد من البكتيريا الممرضة وكذلك لبكتيريا

السل الرئوي أو الدرن.

الملاحظات: * عرف من زمان بعيد بأنه مقاوم لسموم الثعابين، وكان يستخدم من قبل المنشدين

حيث يحافظ على الصوت.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

A.

GYROSEPALA

A. JAPONICA

A. PARVIFLORA

A. PUBESCENS

A. ROSTELLATA

A. STRIATA



(10)

نجل

الاسم اللاتيني: *Agropyrum repens*

(*Elymus repens* L.Gould)

الاسم الإنكليزي: Quitch

الأسماء الأخرى: فيل (الفاء ذو ثلاث نقاط)

العائلة: النجيلية Poaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نبات عشبي مداد معمر، الأوراق ضعيفة طويلة والسنابل دقيقة، الجذور تزحف داخل التربة مسافات طويلة.

الجزء الطبي: الجذور

المواد الفعالة: نشا، سكر فاكهة، مانوز، صابونين، كارفون، سيليس.

الأثر الطبي: مدر للبول، مطهر، مضاد لتكوين الحصى، مضاد للحميات.

الملحوظات:

* نوع آخر لنفس الجنس *A. junceum*



(11)

القرنفل البري

الاسم اللاتيني: *Agrostemma githago*

الاسم الإنكليزي: Corncockle

الأسماء الأخرى: قرنفولة

العائلة: القرنفلية Caryophyllaceae

موطن النبات: أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: نبات ارتفاعه 75 سم، ذو ساق رئيسي

ضعيف التفرع مكسو بشعر ابيض طويل،

الأوراق طويلة ورفيعة، الأزهار أرجوانية،

البذور سمراء مسننة الحواف.

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: يحتوي على قلويدات وأحماض أمينية

وتربينات إلى جانب مواد صابونية

الأثر الطبي: لعلاج التهاب المعدة والمثانة والأمعاء.

الملاحظات: حضر منه عقار ألماني اسمه *Herba Agrostemmae* يستخدم كمدر للبول

و ضد ديدان الأمعاء.



(12)

شجرة السما

الاسم اللاتيني: *Ailanthus altissima*

الاسم الإنكليزي: Stink Tree, Tree of Heaven

الأسماء الأخرى: شجرة الله

العائلة: السماروبيات Simaroubaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: شجرة من الغابات، ترتفع إلى 15 متر، الساق غليظة منتصبة، الأوراق متعاقبة مركبة مزدوجة، الأزهار تاجية عثوكية متفرعة عديدة الشعب وخماسية البتلات.

الجزء الطبي: اللحاء الخارجي (القشرة)

المواد الفعالة: جكلوسيد، راتنج، زيت، تانين، لعاب نبات تحتوي على زيت طيار وتربينات ومواد عفصية واستريوسيدات وفلافينويدات كيوميرينات ومواد سكرية.

الأثر الطبي: طارد للديدان، مضاد للإسهال، قابض تستخدم لألم البطن المسبب من دودة الاسكاريس كما تستخدم كمدر للطمث



وتخفيف ألم الظهر وخافض لحرارة الجسم.

الملاحظات: * أشجار جميلة وشاهقة.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

AILANTHUS GLANDULOSA (Latin Binomial)
AILANTHUS SUTCHUENENSIS (Latin Binomial)
AILANTHUS CACODENDRON (Latin Binomial)

(13)

رجل الأرنب

الاسم اللاتيني: *Alchemilla vulgaris* L

الاسم الإنكليزي: Ladys-Mantle

الأسماء الأخرى: رجل الأسد، رداء السيدة، حشيشة الفضة، كمالية
مبذولة، كمالية المروج.

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: غابات وجبال الوطن العربي.

الوصف النباتي: نباتات معمرة، ارتفاعها 20 سم الساق خضراء

فاتحة موشحه بالأحمر، الأوراق كبيرة تحوي 7- 11

فصوص، الأزهار خضراء فاتحة صغيرة (أيار-

مايو)، الثمرة داخل الكأس وفيها بذرة واحدة، الجذور

سوداء متفرعة قوية.

الجزء الطبي: كل النبات.

المواد الفعالة: حوامض عضوية، تانين، دهنيات، سكريات، صابونيات، راتنج إضافة إلى

فلافنويدات وكيومارين.

الأثر الطبي: مضاد للالتهابات، قابض، لائم للجروح، هاضم.

الملاحظات: * يوصف للنساء لأنه يعدل من تهدل الثدي بعد الولادة.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

A. abyssinica

A. acutiloba

A. alpina

A. arvensis

A. conjuncta

A. elisabetha

A. ellenbeckii

A. epipsila

A. incisa

A. erythropoda

A. faeroensis

A. filicaulis

A. fulgens

A. glabra

A. glaucescens

A. gracilis

A. hoppeana



(14)

ألماندا

الاسم اللاتيني: *Allamanda cathartica* L

الاسم الإنكليزي: Allamanda Canario Canaria

الأسماء الأخرى: ماى ماند Campanilla De Oro

العائلة: الدفلية Apocynaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نبات متسلق، الأوراق خضراء لامعة

متبادلة، الأزهار خماسية البتلات صفراء

وحمرء، تحتوي أنسجة النبات مادة لبنية.

الجزء الطبي: الثمار (اللبن النباتي)

المواد الفعالة: تحتوي على مواد ايرودويس (Iridoids)

وأحماض دهنية.

الأثر الطبي: مسهل، معرق، مقبى ويستعمل لعلاج اليرقان ويستعمل للدغات الثعابين، وقد وجد

أن له فعالية لمنع التقلصات.

الملحوظات: * تسمية النبات ترجع نسبة إلى العالم السويسري Allamand

* أنواع أخرى لنفس الجنس

A. blanchetii

A. Grandiflora

A. schottii



(15)

الحشيشة الثومية

الاسم اللاتيني: *Alliaria officinalis andrz. Ex m. bieb*

الاسم الإنكليزي: Garlic ,Wort , Sauce-alone, Mustard , Alliaire

الأسماء الأخرى: حشيشة الثوم، الثوم البري

العائلة: الصليبية (Cruciferae) Brassicaceae

موطن النبات: المناطق الصخرية لحوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: عشبة برية ثنائية الحول، الساق منتصبه ارتفاعها 60سم، الأوراق متعاقبة معنقة رمحية مسننة الحافة، الأزهار عنقودية التجميع تاجي الارتكاز، بيضاء (أذار- مارس)، الثمار طويلة فيها بذور سمراء منتظمة صغيرة لاذعة لها طعم ورائحة الثوم.

الجزء الطبي: العشبة بكاملها.

المواد الفعالة: ايتيروزيد، نترات، زيت عطري، أنزيمات. زيت كبريتي، بكتين، كاروتين.

الأثر الطبي: منظم، مطهر، مدر للبول، طارد للبلغم، شافي للجروح. طارد للديدان، مضاد للروماتزم، مطهر، مضاد للربو، مضاد للإسقربوط، فعال ضد عضات الحيوانات.

* نوع آخر لهذا الجنس *A.PETIOLATA*



(16)

الخولنجان الصيني



الاسم اللاتيني: *Alpinia officinarum*

الاسم الإنكليزي: Galanga Galangal

الأسماء الأخرى: الخولنجان الصغير

العائلة: الزنجبيلية (الزنجبارية) Zingiberaceae

موطن النبات: الصين ثم انتشر إلى بقية دول العالم.

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر يصل ارتفاعه إلى المتر،

الأوراق رمحية، الأزهار بيضاء في نورات

عنقودية، يشبه الزنجبيل.

الجزء الطبي: الرايزومات

المواد الفعالة: زيت طيار 0.5-1 %، مواد راتنجية، نشا 25 %، Galangine

الأثر الطبي: منشط، هاضم، طارد للغازات، يعدل حموضة المعدة، يخفف من دوار السفر.

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

A. GALANGA

A. PURPURATA

A. ZE

A. SPECIOSUM





(17)

الستونيا

الاسم اللاتيني: *Alstonia constricta* F.Muell

الاسم الإنكليزي: *Alstonia*

الأسماء الأخرى: استونيا

العائلة: الدفلية Apocynaceae

موطن النبات: شرق البحر الأحمر

الوصف النباتي: أشجار ترتفع إلى 10 أمتار، الأوراق رمحية متبادلة على الشجرة، الأزهار

صفراء بيضاء في عناقيد. يوجد في أنسجة النبات مادة لبنية

الجزء الطبي: قلف الشجرة

المواد الفعالة: قلويدات (Alstonin) وهو مادة بلورية ويوهمبين Yohmbine وريزربين

Reserpine

الأثر الطبي: لعلاج الملاريا مقوي للجسم في حالات الملاريا ومقوي الجنس.

الملاحظات: * خلد العالم Alston بهذا النبات

* للجنس *ALSTONIA* نوع آخر هو *A. SCHOLARIS*



(18)

الشنآن

الاسم اللاتيني: *Anabasis articulata* (Forssk.) Moq.

الاسم الإنكليزي: Jointed anabasis Berry

الأسماء الأخرى: الشنآن السوري

العائلة: الرمرامية (السرمدية) Chenopodiaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات معمر له أوراق صغيرة وأزهار كثيرة ملونة

الجزء الطبي: الثمار والفروع

المواد الفعالة: قلويدات 2-4 % ومواد صابونية.

الأثر الطبي: منشط تنفسي، يستخدم بكميات عالية كمبيد حشري، فروع النبات تستخدم للتنظيف

كالصابون. تستخدم كعلاج للأكزيما و الأمراض الجلدية.

الملاحظات: * الكميات الكثيرة منه تسبب الدوخة والغثيان.





(19)

الكازو

الاسم اللاتيني: *Anacardium officinarum* Garten.

الاسم الإنكليزي: Marsh Nut ,Caju, Cashew, Cashew Apple, Cashew

الأسماء الأخرى: البلاذر

العائلة: البطميات Anacardiaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: شجرة أوراقها متقابلة معنقة كاملة بسيطة، الأزهار عنقودية التجميع، تاجية الارتكاز، الثمار قلبية الشكل لحمية، تحوي على البذور المعقوفة البيضاء اللون.

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: دهون 47%، بروتينات.

الأثر الطبي: معالجة الثآليل، تطهير الجروح، كوي البرص، تقوية الذاكرة، تقوية الباه.

الملاحظات: أنواع أخرى لنفس الجنس *A. OCCIDENTALE* و *A. EXCELSUM*



(20)

خروب الخنزير

الاسم اللاتيني: *Anagyris foetida* L.

الاسم الإنكليزي: Bean clover, Karrub El Klab, Habbet, Griful El Klab,

Bean Trefoil

الأسماء الأخرى: قاطير، عود المقلة، صلوان، ينبوت، خروب الكلب، خروب المعيز.

العائلة: الخروبية Fabaceae

موطن النبات: سفوح الجبال في شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: حولي، الأوراق ثلاثية، الأزهار صفراء مخضرة، يُكون قرنات تحتوي على البذور، يزهر خلال شهر مارس.

الجزء الطبي: الأوراق والبذور.

المواد الفعالة: قلويدات Anagyrine و Cytisine

الأثر الطبي: طارد للديدان.

السمية: نبات سام للإنسان والحيوان.

أعراض التسمم: تهيج في الأعصاب وإسهال شديد وتقيؤ وتغير في لون العين وتغير في الغشاء المخاطي للفم.

العلاج: إعطاء المهدئات.

الملاحظات: * نوع آخر لنفس الجنس *A. LATIFOLIA*





(21)

ساق الحمام

الاسم اللاتيني: *Retz Anchusa italica*

الاسم الإنكليزي: Catmint, Buglosse, Borage

الأسماء الأخرى: ورد لسان الثور، بوغلصن، حمم زائف، لسان اللوز.

العائلة: المحميات (البوراجينيات) (المحمية) (البوراجينية) Boraginaceae

موطن النبات: المراعي في شرق البحر الأحمر.

الوصف النباتي: نبات مغطى بالوبر القاسي، الأوراق بيضاوية، التويج على شكل أنبوب واسع

الفوهة، الأزهار زرقاء (حزيران - يونيو)، غنية بالرحيق العسلي، ارتفاعه 50

سم.

الجزء الطبي: الأزهار والأوراق.

المواد الفعالة: قليودات وفلافينويدات Delphinidin Kaempferol و كاروتين

Carotene كولين، نترات البوتاسيوم، اللانثويين.

الأثر الطبي: خافض للحرارة، معرق، مهدئ للأعصاب، فعال ضد الزكام، يعمل منه لبيخة

لعلاج التهابات الجلدية، منق للدم، مدر للبول. خافض للضغط وطارد للبلغم.

الملاحظات: *يستخرج من جذوره صباغ احمر لتجميل النساء، حيث اسمه *Anchusa* مشتقة

من Ankousa والتي تعني باليونانية الحُمْرة.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

A. officinalis

A. arvensis

A. azurea Mill

A. caespitosa



(22)

رجل الهر

الاسم اللاتيني: *Antennaria dioica* (L) Gaerten

الاسم الإنكليزي: Cat's foot

الأسماء الأخرى: بريسية، أنتينارية.

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: الجبال في شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: عشبي معمر صغير ارتفاعه 30 سم، الساق قائمة، الأوراق بسيطة مورقة

خضراء مدببة الحواف تؤلف بساطا مخمليا، الأزهار نورية وردية وبيضاء تزهر

في نيسان (ابريل)

الجزء الطبي: الرؤيسات الزهرية.

المواد الفعالة: (نترات البوتاسيوم، تانين، راتنج). فلافينودات Kaempferide Apigenin

Luteolin

الأثر الطبي: ملين، علاج للسعال الرئوي، مهدئ للسعال، طارد للبلغم.

الملاحظات: * اسمه العلمي يعني الأطراف الحريرية المزهرة

* رجل القط أطلق هذا الاسم تيمنًا بإزهاره الوردية الناعسة الناعمة

* أنواع أخرى لنفس الجنس *Gnaphalium Dioicum* (Latin Binomial)

A. media

A. microphylla

A. neglecta

A. plantaginifoli

A. racemosa

A. rosea

A. suffrutescens

A. umbrinella

A. alpina

A. argentea

A. carpatica

A. corymbosa

A. dimorpha

A. flagellaris

A. geyeri

A. lanata

A. luzuloides



(23)

زهرة السباع



الاسم اللاتيني: *Anthemis nobles L.*

الاسم الإنكليزي: Roman chamomile

الأسماء الأخرى: ربيان، بهار البر، عين البقر،

خبز الغراب، أربيان، بابونج روماني

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: شمال أفريقيا

الوصف النباتي: بري حولي، ارتفاع النبات 15-25 سم، النورات محاطة بصفيين أو ثلاثة

صفوف من القنابات، الأوراق قصيرة الأعناق، الأزهار قرصية صفراء أنبوبية،

السيقان شبه زاحفة ومداة.

الجزء الطبي: النورات الزهرية.

المواد الفعالة: زيت طيار بنسبة 0.8-1% يحتوي على Esters of Angelic acid و

stere of Tiglic acid و Anthamol و Anthamine و Azulene

وتحتوي النورات على مادة Apigenin كذلك صموغ وراتنجيات وعنصري

الكبريت والكالسيوم.

الأثر الطبي: فاتح للشهية، علاج الاضطرابات المعوية والمعوية وعسر الهضم، وتنشيط الدورة

الدموية، ومنع روائح الفم الكريهة.

الملحوظات: أنواع أخرى

لنفس الجنس

A. arvensis

A. deserti

A. melampodina

A. mucroniata

A. pyrethrum

A. retusa

A. rotata

A. cotula



(26)

حلق السبع

الاسم اللاتيني: *Antirrhinum majus*

(*A. majus* CV. *butterfely yellow*, *A. majus* CV. *bright eyes*)

الاسم الإنكليزي: Snapdragon و *Vocca'e leone*

الأسماء الأخرى: انف العجل، انف الثور، فم السمكة، تيسم.

العائلة: الخنازيريات Scrophulariaceae

موطن النبات: أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: نبات زينة حولي ومعمّر، ساقه فرعاء 60 سم، الأوراق متقابلة، الأزهار كبيرة عنقودية التجمع، لها ألوان عدة ابيض واخضر واصفر ووردي.

الجزء الطبي: الأوراق والأزهار.

المواد الفعالة: حامض التانين، راتنج، سكر الفاكهة، ريناتين تحتوي على فلافنويد Apigenin

وتربينات أحادية Amyrin وتربينات ايرودية Antirrhinolide.

الأثر الطبي: مضاد للالتهابات، والباكتيريا والفطريات وباكتيريا الدرن والاحتقانات وغرغرة تقضي على قروح الفم.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

- A. barlieri*
- A. cornutum*
- A. filipes*
- A. kelloggii*
- A. latifolium*
- A. orontium*
- A. vexillo*
- A. virga*



(27)

خوشان

الاسم اللاتيني: *Apocynum cannabinum*

الاسم الإنكليزي: Dogbane, Hemp, Worm root Indian hemp

الأسماء الأخرى: قنبلي

العائلة: الدفلية Apocynaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر ساقه وفروعه ليفية شبه منتصب، يرتفع إلى 75 سم، الأوراق معنقة بيضيه، الأزهار بيضاء يعلوها مشحمة خضراء.

الجزء الطبي: العشبة بكاملها.

المواد الفعالة: Apocynamarin و Resins و Cardiac جلوكوسيدات قلبية
Apocannoside وفلافينويدات Flavonol * Quercitrin وتربينات
Amyrin

الأثر الطبي: لعلاج القلب، مدر للبول، لعلاج السفلس. مسبب للإجهاض، ومخفف لألم الدورة

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

A. androsaemifolium , *Apocynum pubescens* (Latin Binomial)

A. ercicum



(28)

لاخليا

الاسم اللاتيني: *vulgaria Aquilegia*

الاسم الإنكليزي: Ancolie و Common cornette و Columbine

الأسماء الأخرى: كفوف السيدة، نسرية، حوضية الحدائق، مهماز، اكيلاجيا.

العائلة: الشقيقة Ranunculaceae

موطن النبات: المناطق الصخرية والغابات في شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر، الساق منتصب ارتفاعه 70 سم، مغطى بالزغب، الأوراق

معنقة كبيرة خضراء مقسمة، الأزهار هامية الارتكاز جميلة فردية التجمع منقبة

نحو الأرض متعددة الألوان بنفسجية ووردية وبيضاء تزهر في (أيار - مايو)،

الجذور وتدية.

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: اكيلجين، غلوكوزيد، سينوجنتيك، امولسين، زيوت، فيتامين (C)، سكريات.

الأثر الطبي: مهدئ، قابض، مطهر، يعالج مرض الايرقان، منق للدم، مدر للبول، معرق.

الملاحظات: * استخلص من بذوره عقار (Semen Aquilegae)

* الحذر في استخدام النيات لوجود مادة سينوجنتيك السامة.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

- A. bertoloni*
- A. bertolonii*
- A. caerulea*
- A. canadensis*
- A. chaplinei*
- A. chrysantha*
- A. coerulea*
- A. desertorum*
- A. einseleana*
- A. eximia*
- A. flabellata*
- A. flavescens*
- A. formosa*
- A. fragrans*
- A. glandulosa*



(29)

مشمش بري

الاسم اللاتيني: *Arbutus unedo* L.

الاسم الإنكليزي: Arbousier, Strawberry Tree

الأسماء الأخرى: القطلب، قاتل أبيه، عفار، جني، قبقبان، شجر الدب.

العائلة: الخنجيات (الاركية) (الاريكيات) Ericaceae

موطن النبات: غابات وأدغال غرب وجنوب البحر الأحمر.

الوصف النباتي: أشجار ارتفاعها 5 أمتار، ساقها منتصبة، أوراقها أحادية، أزهارها بيضاء وخضراء (تشرين أول - أكتوبر) والثمار مستديرة لحمية حمراء عند النضج تحتوي 25 بذرة والجذور عميقة.

الجزء الطبي: الأوراق والثمار والقشور والجذور.

المواد الفعالة: تانين، أربوتوزيد. فلافونيدات Afzelin وزيت عطري يحتوي على تربينات ثلاثية Amyrin سيسكوتيربين: Eudesmol, Gamma وتربينات أيرودية

Asperuloside

الأثر الطبي: مضاد لالتهابات المجاري البولية، مطهر، منق للدم، مدر للبول ومعالج للإسهالات.

الملاحظات: يحضر من ثماره شراب لذيذ ومربيات شهية ويجني النحل من زهره عسلاً مميزاً وأخشابه من أفضل الأنواع المستخدمة في التدفئة.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

A. andrachne

A. canariensis

A. xalapensis

A. arizonica

A. menziesii



(30)

أرقطين

الاسم اللاتيني: *Arctium lappa*

الاسم الإنكليزي: Burdock, Great major edible burdock

Bardone root ، Burdock root

الأسماء الأخرى: ويسار، رأس الحمامة، أرقطون، أرقطيون، المركبات.

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نبات حولي، ارتفاعه 120 سم، الأوراق أحادية و كبيرة و ملساء، الأزهار في نورات متجمعة تاجية الارتكاز، يزهر النبات في شهر (أغسطس).

الجزء الطبي: الجذور، ولكن الأوراق والثمار سامة.

المواد الفعالة: زيت طيار، اينولين، راتنج، بوتاسيوم، تانين. (يحتوي على مركبات نيتروجينية Lappaol A * Ligna * وقلويدات Atropine وتربينات سيسكوتيربين

Clovene

الأثر الطبي: لعلاج البول السكري (يحتوي مواد مشابهه للأنسولين ومواد مماثلة للبنسلين) ويحتوي على مواد لتقوية الشعر، ويستخدم كمدر للعرق والبول والصفراء، ومنقي للدم. كما يستخدم في الأمراض الجلدية.

السمية: الماشية و الخيول.

أعراض التسمم: يؤدي إلى التهاب الجلد و انتفاخ الحيوان.

العلاج: يستخدم كبراهم مرطبة للجلد.

الملحوظات: أنواع أخرى لنفس الجنس *Lappa Major, Arctium Majus*

A. majua

A. minus

A. minor



(31)

عنب الدب

الاسم اللاتيني: *Arctostaphylos uva-ursi* L.

الاسم الإنكليزي: Kinnickinnick و Spreng و Busserolle

الأسماء الأخرى: قطب زحاف، بقس صغير.

العائلة: الخنجيات Ericaceae

موطن النبات: الغابات في شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نباتات مدادة، ارتفاعها 15-25 سم، تزحف وتنتشر لتغطي مساحات واسعة

من الغابات، الأوراق دائمة وقوية وسميكة، الأزهار وردية (نيسان - ابريل)،

الثمار عنبية تصبح حمراء عند النضج.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: سكريات، تانين، أملاح معدنية.

الأثر الطبي: مطهرة، قابضة، مدرة للبول.

الملحوظات: تستخدم الأوراق في دبغ الجلود، يخلط مع التبغ، تلتهمه الدببة بشهية.



(34)

فجل الحصان

الاسم اللاتيني: *Armoracia lapathifolia*

الاسم الإنكليزي: Raifort و Horse radish

الأسماء الأخرى: أرموراسيا، اللبسان، فجيل، فجل بري، خردل صحراوي.

العائلة: الصليبية Brassicaceae

موطن النبات: شمال أفريقيا.

الوصف النباتي: عشب معمر طويل جاف ذو أوراق خضراء مسننة، الأزهار بيضاء والثمار

خردلية، الجذور درنية بيضاء اللون طويلة سميكة.

الجزء الطبي: الجذور الدرنية.

المواد الفعالة: جلوكوسيد (السينجرين). اتروزيد، أملاح معدنية.

الأثر الطبي: مضاد لفقر الدم، دافع للسعال، طارد للبلغم، يستخدم كتوابل وطارد للغازات

الملحوظات: * يحضر تناوله من النساء الحوامل

* نوع آخر لنفس الجنس *A. rusticana*



(35)

زهرة العطاس

الاسم اللاتيني: *Arnica Montana L.*

الاسم الإنكليزي: Mountain Arnica, Leopard's Bane

الأسماء الأخرى: أرنيكا، خانق الفهد، العاطوس، حشيشه الجروح، كينا الفقراء.

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نبات معمر طوله 50 سم ساقه قائمة فردية متجمعة قاعدياً، الأزهار صفراء برتقالية في نورة كبيرة (أيار - مايو).

الجزء الطبي: الأوراق والأزهار.

المواد الفعالة: زيت ثابت وطيّار، راتنج، تانين، شموع، أرنيسين. تحتوي على أحماض أمينية

Alanine, Phenyl و سيسكوتربينات Arnicolide E ومواد سكرية

Fructose وكاربوهيدريتيّة Arnica Polysaccharide وفلافينودية

Laciniatin.

الأثر الطبي: قابض، معطس، معرق، منشط للمخ، لعلاج حب الشباب وتساقط الشعر وإزالة

القمل. تستخدم للأميبيا والتريكموناس والفطريات.

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس



- A. alpina*
- A. amplexicaulis*
- A. cernua*
- A. chamissonis*
- A. cordifolia*
- A. discoidea*
- A. fulgens*
- A. latifolia*
- A. longifolia*
- A. mollis*
- A. nevadensis*
- A. parryi*
- A. sororia*
- A. venosa*
- A. viscosa*

(38)

الناردين البري

الاسم اللاتيني: *Asarum europaeum* L.

الاسم الإنكليزي: Public House Plant, Snakeroot, European,

الأسماء الأخرى: أسارون، نجيل الهند، أذن الإنسان، حشيشه الكابارية.

العائلة: الارستولوخية Aristolochiaceae

موطن النبات: جبال حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها 15 سم، سيقانها متسلقة، الأوراق خضراء قائمة لامعة

كلوية الشكل، الأزهار سمراء أرجوانية (آذار - مارس)، لها شكل الجرس فيه

حجرات تحوي البذور، الجذور سمراء متعرجة لها رائحة تشبه رائحة الكافور.

الجزء الطبي: الأوراق والجذور.

المواد الفعالة: زيت طيار، وفينيل بروبونيدات مادة الزارون Asarone، قلويدات

Allantoin وفلافونيدات: Quercitrin, ISO وستيرويدات (Sitosterol,

Beta)

الأثر الطبي: طارد للبلغم، مقيء، مثير للعطاس (مدر للبول وللأجهاز موسع للشعب ومانع

لتقلصات الرحم ورافع للمناعة).

* أنواع أخرى لنفس الجنس

A. hartwegii

A. lemmonii

A. canadense

A. caudatum



(39)

سبع الأرض



الاسم اللاتيني: *Asplenium antiquum*

الاسم الإنكليزي: Wall-rue

الأسماء الأخرى: سرخس

العائلة: السرخسيات Aspleniaceae

موطن النبات: أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: نوع من السرخسيات، الأوراق كثيرة التشريح والتفريش، يرتفع النبات إلى 15 سم.

الجزء الطبي: أوراق السرخس والمسمامة (المرجمة) Fronds
المواد الفعالة: تانين، أملاح معدنية، حامض التانيك.

الأثر الطبي: مدر للطمث، لعلاج الالتهابات، قابض، مفيد للكبد والطحال.

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

- A. bulbiferum*
- A. ceterach*
- A. contiguum*
- A. macraei*
- A. nidus*
- A. platyneuron*
- A. resiliens*
- A. rhizophyllum*
- A. ruta muraria*
- A. scolopendrium*
- A. septentrionale*
- A. trichomanes*



(42)

البوكو

الاسم اللاتيني: *Barosma betulina*

الاسم الإنكليزي: Buchu

الأسماء الأخرى: بوشر

العائلة: السببية (السببيات) Rutaceae

موطن النبات: المناطق الجبلية في شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نبات شجيري صغير، الأوراق

خضراء مصفرة يوجد عليها غدد زيتية.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: زيت طيار 0.8- 2.5 % واهم مكونات

الزيت Diosphenol و Limonene و Menthone، كذلك تحتوي

الأوراق على Diosmin و Glycoside و Barosmin

الأثر الطبي: مطهر للمسالك البولية، مدر للبول، علاج لعسر الهضم، وعلاج للكوليرا.

الملاحظات: *يوجد في ثلاث أنواع؛ البوكر القصيرة والطويلة والبيضاوية.

B. crenulata و *B. serratifolia*

*أستعمل في بريطانيا عام 1790 وأصبح عقارا رسمياً في عام 1821،

وأدرج في دستور الأدوية البريطاني كعلاج فعال لالتهاب المثانة والتهاب

الإحليل.





(43)

بنونيا



الاسم اللاتيني: *Begonia capreolata*

الاسم الإنكليزي: Crosse-vine

الأسماء الأخرى: السجادة المبهرجة

العائلة: البنونية Begoniaceae

موطن النبات: المراعي في أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: نبات معمر، الأوراق متعاقبة معنقة،

الأزهار وحيدة المسكن رباعية البتلات،

ألوان الأزهار عديدة منها الأبيض

والوردي والأحمر.

الجزء الطبي: اللحاء والثمار.

المواد الفعالة: كاتالين، حامض هيدروكسيبيزويك وبروتوكاتشيك.

الأثر الطبي: خافض للحرارة، مخدر ضئيل، للمصابين بالربو.

الملاحظات: لهذا الجنس 800 نوع منها العادي والبري والعسقولي والطبي والزراعي.

B. convallariodora

B. corallina

B. dichroa

B. hirtella

B. macrophylla

B. multinervia

B. semiovata

B. sericoneura

B. udisilvestris



(46)

قنب مائي



الاسم اللاتيني: *Bidens tripartita*

الاسم الإنكليزي: Bur , Marigold

الأسماء الأخرى: تيل مائي، القطيفة.

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: المناطق الجبلية في شمال أفريقيا.

الوصف النباتي: نباتات عشبية ارتفاعها 60 سم، ذات

سيقان رفيعة تميل إلى الحمرة، الأوراق

رمحية مدببة، الأزهار قمية وطرفية

صفراء (تموز - يوليو).

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: زيت، Astringent principles

الأثر الطبي: موقف للنزف، مضاد للتبول الدموي، مضاد لتقرح المعدة، مضاد القولون.

الملاحظات: أنواع أخرى لنفس الجنس

B. alba

B. aristosa

B. bipinnata

B. cernua

B. discoidea

B. frondosa

B. laevis

B. mauiensis

B. pilosa

B. polylepis

B. triplinervia

B. reptans



(47)

لسان الثور

الاسم اللاتيني: *Borago officinalis* L.

الاسم الإنكليزي: Borage

الأسماء الأخرى: البوراجو، الحمحم

العائلة: الحمحميات Boraginaceae

موطن النبات: حوافي الطرق وأقدام الجدران والخرائب في شمال أفريقيا.

الوصف النباتي: عشب حولي، ساقه قائمة عصيرية

سميكة لونها اخضر رمادي يصل ارتفاعها



إلى 60 سم مغطى بشعيرات كثيفة، الأوراق كبيرة تصل إلى 20 سم وهي

متناوبة الوضع على الساق شكلها بيضوي اهليلجي، الأزهار نجمية صغيرة

لونها ازرق فاتح جاذبة للنحل (أيار - مايو)، الثمار بندقية بيضية.

الجزء الطبي: الأوراق والأزهار

المواد الفعالة: قلويدات Pyrrolizidine و Naphtha quinones وصابونيات

Allantion و Flavonoids و Triterpenoid saponine وأصبغ

وزيت.

الأثر الطبي: لعلاج نزلات البرد، لعلاج الطفح الجلدي، لعلاج السعال، مطهر معرق، مدر

للبول، لعلاج أمراض الكلى والمثانة، لعلاج بعض أمراض القلب، أمراض

السكر.

الملاحظات: *يضاف إلى السلطة والشوربة، يطبخ مع الزيت ويضاف إلى اللحوم

والأسماك، ويعمل من الأزهار منقوع كالشاي ومربيات وحلوى.



(50)

الكتم

الاسم اللاتيني: *Buxus sempervirens* L.

الاسم الإنكليزي: Box و Katam و Boxwood و Buxus

الأسماء الأخرى: بقسيس، شمشاد، عثق، الخشب المبارك، شمشار.

العائلة: البقسيات *Buxaceae*

موطن النبات: غرب وجنوب البحر الأحمر.

الوصف النباتي: شجيرة يصل ارتفاعها 150 سم - الأوراق دائمة متميزة غامقة تغطيها طبقة شمعية - الأزهار صغيرة صفراء إلى خضراء (نيسان - ابريل) - الثمار كبسولية الشكل.

الجزء الطبي: الأوراق وقشرة الجذور.

المواد الفعالة: مادة Buxin تانين، صبغات، قلويدات، فيتامين (C).

الأثر الطبي: منشط لإفراز الصفراء، طارد للديدان، وفي مجال التجميل يستخدم صبغة لشعر الرأس حيث يعطي اللون الأسود.

الملاحظات: *استعمل النبات في عصر النهضة الصناعية في أوروبا كدواء للصلع.

*في ألمانيا حضر دواء Folia Buxi لعلاج أمراض الجلد المزمنة والنقرس والملاريا.

* للكتم 70 نوع، في الصين يوجد 17 نوعاً وفي كوبا 30 نوعاً، من هذه الأنواع

B. japonica B. suffructaca B. dioica B. arborescens



(51)

نعناع الجبل

الاسم اللاتيني: *Calamintha officinalis mornch*

الاسم الحديث أو المطابق: *Calamintha menthifolia* Host

(*Calamintha nepeta* (L.) Savi)

الاسم الإنكليزي: Calament

الأسماء الأخرى: نعناع بري، بلسم بري

العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: الصخور الجبلية في شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نبات معمر، ارتفاعه 25 سم -

الأوراق مسننة خفيف - الأزهار أرجوانية

(تموز - يوليو) لها زنيدات طويلة.

الجزء الطبي: المجموع الخضري المجفف في الظل.

المواد الفعالة: عطر، أنزيمات.

الأثر الطبي: مضاد للتشنج، هاضم، منشط.

الملحوظات: * له رائحة شبيهة برائحة النعناع الاعتيادي

* أنواع أخرى لنفس الجنس



C. alpina
C. grandiflora
C. nepeta
C. sylvatica



(54)

جريسة

الاسم اللاتيني: *rapunculus Campanula* L.

الاسم الإنكليزي: Campanule

الأسماء الأخرى: الجريس، عصا يعقوب، اللفت البري.

العائلة: الجريسات Campanulaceae

موطن النبات: المراعي في أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: نبات عشبي من ذوات الحولين، ارتفاعه

110 سم، ساقه مغطى بالوبر، الأوراق

رفيعة مطاولة، الأزهار بيضاء وزرقاء

وبنفسجية (حسب النوع)، تزهر (أيار - مايو) تنتظم في عناقيد رخوة على هيئة

جرس، الجذر لحمي على شكل مغزل.

الجزء الطبي: الأوراق والجذور

المواد الفعالة: اينولين (سكر نباتي)، فيتامين (C).

الأثر الطبي: مطهر، قابض، منعش، شاف للجروح، لعلاج الثآليل.

الملاحظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس

- C. alliariifolia*
- C. americana*
- C. angustiflora*
- C. aucheri*
- C. bononiensis*
- C. californica*
- C. carnica*
- C. carpatica*
- C. cervicaria*
- C. cespitosa*
- C. divaricata*
- C. drabifolia*
- C. erinus*
- C. exigua*
- C. glomerata*
- C. griffinii*
- C. grossekii*
- C. spathulat*



(55)

قرد مانا

الاسم اللاتيني: *Cardamine pratensis* L

الاسم الإنكليزي: Cuckoo flower Karamdana

الأسماء الأخرى: أم الأربع بتلات

العائلة: الصليبية Brassicaceae

موطن النبات: أوروبا ثم انتقل إلى شمال أفريقيا

الوصف النباتي: أعشاب حولية شتوية يصل ارتفاعها إلى المتر، الأوراق بسيطة بيضية مفصصة، الأزهار في نورات مختلفة الألوان يغلب عليها الأبيض والوردي.

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: زيت، سائل صمغي مركب كبريتي 1- : PENTANE,3-4-EPI-THIO

CYANO

الأثر الطبي: مسهل، لانم للجروح، يزيل الكلف. مسبب للإجهاض ومدر للطمث

الملاحظات: أنواع أخرى لنفس الجنس

- C. amara*
- C. angulata*
- C. bellidifolia*
- C. breweri*
- C. bulbifera*
- C. bulbosa*
- C. californica*
- C. diphylla*
- C. douglassii*
- C. enneaphyllos*
- C. heptaphylla*
- C. hirsute*
- C. pachystigma*
- C. trifoliata*



C. nuttallii

C. oligosperma

C. pensylvanica

C. pentaphyllos

عرق الذهب

الاسم اللاتيني: *Cephaelis ipecacuanha*

(*Carapichea ipecacuanha* (Brot.) L. Andersso *Piper retrofractum* Vahl)

الاسم الإنكليزي: Ipeca و Ipecacuanha

الأسماء الأخرى: أبيكاك

العائلة: البنية (الروبية) Rubiaceae

موطن النبات: البرازيل ثم انتشر إلى شمال أفريقيا

الوصف النباتي: شجيرات صغيرة، الأوراق رمحية خضراء، الأزهار حمراء، بيضاء، صفراء، الجذور رايزومات بيضاء رمادية.

الجزء الطبي: الرايزومات

المواد الفعالة: قلويدات Emetine و Cephaeline و Psychotrine إلى جانب تربينات

أحادية Borneol Camphor و سيسكوتيربينات Bisabolene وفيتامين ج.

الأثر الطبي: علاج للدوسنتاريا الأميبية، مدر للصفراء، طارد للبلغم ، مقى ، مسبب للإجهاض وطارده للديدان ومخفض للحرارة.

الملاحظات: * معروف عند قدماء الهنود الحمر لمعالجة الزحار.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

C. acuminata

C. schwartzii



(59)

دار فلفل

الاسم اللاتيني: *Chavica officinarum*

(*Erysimum cheiri* (L.) Crantz)

الاسم الإنكليزي: Long pepper

الأسماء الأخرى: أم الرأس

العائلة: الفلفلويات Piperaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عارش معمر، أوراقه متعاقبة

حاضنة سنانية الشكل، الأزهار متجمعة إبطية

الارتكاز، الثمار بيضية الشكل عطرية

العرف.

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: غير مدروس

الأثر الطبي: هاضم، طارد للغازات، معرق، معالج للضعف الجنسي.

الملاحظات: * يستخدم كسياج للحدائق.



(62)

الكينا

الاسم اللاتيني: *Cinchona officinalis* L

الاسم الإنكليزي: Cinchona و Quinine

الأسماء الأخرى: الكينين

العائلة: البنية Rubiaceae

موطن النبات: أمريكا الجنوبية وانتقلت إلى شمال أفريقيا

الوصف النباتي: أشجار دائمة الخضرة، ارتفاعها 15 متر،

الأوراق سيفيه رمحيه كثيفة، الأزهار بوقيه بيضاء-

حمراء.

الجزء الطبي: القلف

المواد الفعالة: يوجد في القلف حوالي 25 قلويد تشكل حوالي 18 % من أهمها Quinine

و Quinidine و Cinchonine و Cinchonidine و مواد تانينية

Cinchotannic acid

الأثر الطبي: علاج مذهب للملاريا، مادة مقوية للدم، مساعد في عملية الهضم، علاج تليف

عضلات القلب.

الملاحظات: * استخدامه بكميات عالية يؤدي إلى فقد السمع والبصر.

* يدخل في صناعة معاجين الأسنان لتقوية اللثة.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

C. calisaya

C. succirubra

C. pubescens

C. ledgeriana

C. pitayensis



(63)

الكافور

الاسم اللاتيني: *Cinnamomum camphor* Nees

(*Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl, *Cinnamomum verum* J. Presl)



الاسم الإنكليزي: Camphor

الأسماء الأخرى: كوافير

العائلة: القرفية (الغاربية) Lauraceae

موطن النبات: أمريكا الجنوبية وانتشر في الدول العربية.

الوصف النباتي: من أطول الأشجار المعروفة (يصل

الارتفاع إلى 100 متر) مستديمة الخضرة

غزيرة التفرع، الأوراق لامعة داكنة خضراء محمرة، رمحية معنقة بسيطة،

الأزهار صغيرة لونها أصفر أو رمادي، الثمار كبسولة بداخلها 3-5 بذور صغيرة

الحجم.

الجزء الطبي: الأوراق والقلف.

المواد الفعالة: زيت طيار 5% يحتوي على مواد Ceneole و Pinene و Terpineol و

Citronellal و Camphor و Safrol و Eugenol و Cineole و

Lignans

الأثر الطبي: علاج التهاب الأنف والحنجرة، طارد للبلغم، علاج للسعال الديكي، علاج للزكام

والأنفلونزا والربو، مسكن للألام المفاصل والروماتزم.



(66)

الشوكة المباركة

الاسم اللاتيني: *Cnicus benedictus* L.

(*Centaurea benedicta* (L.) L.)

الاسم الإنكليزي: St. Benedict Thistle, Holy Thistle

Blessed thistle

الأسماء الأخرى: باذر ورد، مقل الصيف، الفراسيون، قنطريون، مروية، الشوك المقدس.

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات بري حولي شوكي، ارتفاعه 30 سم، ساقه قائمة وعليها زغب وبري

ابيض، الأوراق صغيرة بيضاوية سمكية النصل خضراء باهتة، الأزهار صفراء

(نيسان - ابريل) في شكل نورات وبرية قطنية الملمس، الثمرة بنية.

الجزء الطبي: المجموع الخضري المجفف في الظل

المواد الفعالة: زيت، راتنج، أملاح معدنية، مادة الكنيسين.

الأثر الطبي: هاضم، معرق، منق للدم، خافض للحرارة، مسكن للألام الروماتزم، منشط للجهاز

العصبي، مضاد للسرطان، معقم ومطهر ومدر للبن ومانع للحمل.



(67)

حشيشة الملاح

الاسم اللاتيني: *Cochlearia officinalis* L.

الاسم الإنكليزي: Cranson

الأسماء الأخرى: حشيشة الإسقربوط

العائلة: الصليبية Brassicaceae

موطن النبات: سواحل حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نبات من ذوات الحولين، ارتفاعه 20 سم، ساقه منتصبه اجرد متفرع، الأوراق خضراء لحمية قلبية على شكل ملاعق، الأزهار بيضاء أو وردية (آذار - مارس) تنتظم في شكل عناقيد قصيرة في نهاية الساق، والثمرة خردلية، الجذر أنبوبي رقيق.

الجزء الطبي: المجموع الخضري.

المواد الفعالة: يود، أملاح معدنية، تانين، فيتامين(C).

الأثر الطبي: مضاد للإسقربوط، منق للدم، منظف، هاضم.



(70)

العائق

الاسم اللاتيني: *Consolida regalis* S.F.Gray

الاسم الإنكليزي: Dauphinelle Pied, Zaban Pas Ghafa, Night's Spur

الأسماء الأخرى: رجل القبرة، خالف والديه، عائق الحدائق.

العائلة: الشقيقية Ranunculaceae

موطن النبات: الحقول في شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات بري موسمي ارتفاعه 50 سم، الأوراق مقسمة إلى شرائح طويلة

ودقيقة، الأزهار زرقاء قاتمة (حزيران – يوليو) تتجمع في عنقود نهائي رخو،

الثمرات جرابيه جرداء أحادية فيها بذور سوداء مجمدة.

الجزء الطبي: الأزهار

المواد الفعالة: سكريات، زيت دهني، قلويدات تربينات ثنائية * Alkaloid Delcosine

Diterpene Magnoflorine* Isoquinoline Alkaloid

الأثر الطبي: مضاد للالتهابات، مضاد للطفيليات ولعلاج الصلع والتهابات الرأس.

الملاحظات: نوع آخر لنفس الجنس

C. ajacis



(71)

زنابق الوادي

الاسم اللاتيني: *Convallaria majalis* L.

(*Lilium Convallium-Majale*)

الاسم الإنكليزي: Lilly of the valley MAY LILY

الأسماء الأخرى: المضغف - المجلس العرفي - دنق

العائلة: الزنبقية Liliaceae or Ruscaeeae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط

الوصف النباتي: عشبه معمرة تزرع لزهرا التي تتفتح في الربيع، بيضاء إلى بنفسجية على

كل أجراس محمولة على حامل، طول الأوراق يصل 20 سم.

الجزء الطبي: الأزهار والثمار والأوراق

المواد الفعالة: فلافينويدات * Apigenin وزيت عطري وتربينات اتحادية Citronella

Citronellol Acetate جلوكوسيدات قلبية Cheirotoxin وصابونية

Convallamaroside* Sapogenin

الأثر الطبي: مدر للبول في حالة أمراض القلب

السمية: الإنسان والحيوان

أعراض التسمم: بمجرد مضغ الأزهار أو أكل الثمار تحدث السمية

العلاج: غسل المعدة فوراً و غسل الفم و إعطاء المهدئات.

الملاحظات: * مسجل في الدستور الطبي الألماني

* أنواع أخرى لنفس الجنس *C. racemosa* و *C. polygonatum*



(74)

شجرة البندق

الاسم اللاتيني: *Corylus avellana* L.

الاسم الإنكليزي: Noisetier, Hazelnut, Hazel Nut Tree

الأسماء الأخرى: الجلوز، البندق

العائلة: البتوليات (السوماليات) Betulaceae

موطن النبات: الغابات في شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: شجرة ارتفاعها 4 أمتار، لها عدة سيقان تنطلق من أرومة واحدة، الأوراق رخوة بيضوية تنتهي برأس دقيق وهي مسننة مغطاة بالزغب، الأزهار الذكورية صفراء والأنثوية حمراء، الثمرة قنابية فيها بذرة واحدة.

الجزء الطبي: قشور الأفرع والبذور

المواد الفعالة: فلافونويدات Afzelin * Foeniculin ، تانين، بروتين، مواد دهنية (50% من وزنه)، أملاح معدنية وفيتامين ج وتربينات ثنائية * Taxol.

الأثر الطبي: موقف للنزيف، مضاد للتعرق، منق للدم، مقاوم للحرارة، قابض للأوعية الدموية، مقوي للباه، يوصف للرياضيين والشيوخ والمصابين بالسكري ولعلاج البواسير والعقم عند النساء ومضاد للفطريات.

* نوع آخر لنفس الجنس *Corylus colurna*





(75)

أشزان

الاسم اللاتيني: *Cotyledon orbiculata* L

الاسم الإنكليزي: Venus navel-wort و Pig's Ear Kidney-wort

الأسماء الأخرى: صرة الأرض، خبز الرقاق

العائلة: المخلدات Crassulaceae

موطن النبات: البساتين في أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر، الأوراق لحمية متقابلة، الأزهار سنبلية التجميع عنقودية جميلة الألوان.

الجزء الطبي: عصير الأوراق

المواد الفعالة: غير مدروسة. مركبات قلبية * Cardenolide * Orbicusine C

Tyledoside C

الأثر الطبي: مضاد للصرع، يثير الشهوة الجنسية، مدر للبول.

الملحوظات: لجمال أزهاره يستخدم كنبات زينة في الحدائق والأصص.



(78)

اليقطين

الاسم اللاتيني: *Cucurbita pepo* L.

الاسم الإنكليزي: Botte gourd Marrow, Vegetable

Gourd, Pumpkin, Squash, (Yaqtin).

الأسماء الأخرى: اللقطين، القرع، الكوسة، الدباء، قرع عسلي.

العائلة: القرعية Cucurbitaceae

موطن النبات: أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: نبات عشبي زاحف ينمو في جميع الوطن العربي.

الجزء الطبي: الثمار

المواد الفعالة: الثمار تحوي 94% ماء، 1% بروتين، 4% كربوهيدرات، 1% دهن، 6%

ألياف، 5% رماد، والرماد يحتوي الكالسيوم والفوسفور والحديد والصوديوم

والبوتاسيوم والمغنيسيوم وتحتوي الثمار أيضاً فيتامين A، والريبوفلامين والنياسين

وحامض الأسكوربيك، وتحتوي البذور 46% دهن و34% بروتين و10%

كربوهيدرات و3% ألياف. كما يحتوي على جلوكوسيدات فلافينويدية - Apigenin

وستيرويدات 7-O-Beta-D-Glucosyl-6-C-Glucoside

Campesterol و سيسكوثيربينات Absciscic Acid و ترايثيربينات

.Bryonolic Acid

الأثر الطبي: مسهل وملطف ومضاد للسعال ومدر وملطف للأغشية المخاطية وهو فعال لعلاج

البروستات ويفتح الشهوة الجنسية. نشرت مجلة الأبحاث البيوكيميائية عام 1985

دراسة أجريت في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، أشارت هذه

الدراسة إلى أن لليقطين تأثيراً في سرطان الرئة وهو واقٍ منه يستخدم لعلاج

للنمش وقشرة الرأس.

الملاحظات:

* الأنواع التابعة لجنس *Cucurbita*

pepo Cucurbita Cucurbita argyrosperma Cucurbita palmate





Cucurbita digitata



Cucurbita ficifolia



Cucurbita foetidissima



Cucurbita maxima



Cucurbita moschata

(81)

السفرجل

الاسم اللاتيني: *Cydonia oblonga Pers*

(*Cydonia oblonga* Mill. *Cydonia Vulgaris*)

الاسم الإنكليزي: Quince Common Quince و Cognassier

الأسماء الأخرى: التفاحة الذهبية

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط

الوصف النباتي: شجرة مثمرة يصل ارتفاعها 6 أمتار، ساقها قصيرة وأغصانها منبسطة،

أوراقها كاملة متقابلة بيضاوية الشكل قلبية القاعدة، الأزهار خماسية، الثمار

صفراء حجرية.

الجزء الطبي: الثمار والبذور.

المواد الفعالة: 0.5 % البروتين، 12 % ألياف، 7 % سكر، 0.3%، مواد دهنية، 15 %

رماد، وبوتاسيوم وفسفور وكبريت وكلس، فيتامينات (A,B,C,E,D). زيت

عطري سيسكوتيربين *Cydonia Ionone* وفلافنويدات /Cyanidin

Astragalin

الأثر الطبي: التسكين والتقوية وفتح الشهية، وعلاج المعدة والكبد، وهو يشفي الإسهال المزمن،

ويقوي القلب، ويفيد المصابين بسل الصدر والنزيف المعدي والمعوي وانهيارات

الرئة، ويقوي الهضم والأمعاء، ويمنع القيء ، ويشفي من سيلان اللعاب ومن

الزكام الشديد وفقد الشهية، والعجز الكبدي.



(82)

لسان الكلب

الاسم اللاتيني: *Cynoglossum officinal* L.

الاسم الإنكليزي: Gypsy-Flower, Cynoglosse, Dog's Tongue

الأسماء الأخرى: كثير الأضلاع، بزوزة، مصاصة

العائلة: المحميات Boraginaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات يعيش سنتين، ارتفاعه 50 سم ، ساقه قوي مشعر اخضر - الأوراق

رمادية-خضراء طويلة رخوة - الأزهار حمراء خميرية (أيار- مايو) تنتظم في

عناقيد لولبية - الجذور سوداء.

الجزء الطبي: الجذر المجفف في السنة الثانية من عمر النبات

المواد الفعالة: قلويدات Pyrrolizidine Alkaloids ، مادة لزجة، راتنج، تانين، زيت عطري.

الأثر الطبي: قابض، مهدئ، ملين يستعمل كدهان للأمراض الجلدية والبواسير.

الملاحظات: * كلمة *Cynoglossum* كلمة يونانية مكونة من مقطعين تعني (لسان الكلب)

* أنواع أخرى لنفس

الجنس

C. cheirifolium

C. creticum

C. grande

C. occidentale

C. virginianum



(85)

الدريس

الاسم اللاتيني: *Derris elliptica*

(*Millettia Splendidis*, *Millettia Splendens*, *Millettia Piscatoria*, *Galedupa Elliptica*, *Cylista Piscatoria*)

الاسم الإنكليزي: Derris و Tuba roots Hanglai-Daeng

الأسماء الأخرى: دريس

العائلة: البقولية Fabaceae

موطن النبات: آسيا ثم انتشر إلى أنحاء الوطن العربي.

الوصف النباتي: نبات شجيري زاحف أو متسلق، يصل

ارتفاعه إلى المتر، السيقان بنية اللون تميل إلى

الوردي، الأوراق متبادلة خضراء رمادية مركبة

ريشية فردية تصل إلى 50 سم طولاً وتحتوي

على 9-13 وريقة بيضيه أو مستطيلة أو رمحيه

زغبية، الأزهار في نورات عنقودية مركبة في

أباط الأوراق، الثمار قرنية مفلطحة طولها من 3-9 سم وتحتوي على 1-4 بذور.

الجزء الطبي: الجذور

المواد الفعالة: فلافينويد Rotenone و Deguelin و قلويدات Piperidine,

Rotenone 8% وهي مادة بلورية تستخدم كمبيد حشري وفي صيد السمك.

الأثر الطبي: مبيد للحشرات وقاتل الديدان، مضاد للقواقع وقاتل للأسماك والفطريات، مسبب

للإجهاض.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس *D. trifoliata* و *D. malaccensis*



(86)

سمارة

الاسم اللاتيني: *Descurainia sophia* L.

الاسم الإنكليزي: Sisymbre sagesse Flix Weld

الأسماء الأخرى: حشيشة القديسة صوفيا، سمارة الحلبة، حكمة الجراحين.

العائلة: الصليبية Brassicaceae

موطن النبات: تنمو على الطرق والخرائب وفي الشوارع والساحات في أنحاء الدول العربية.

الوصف النباتي: نبات حولي ارتفاعه 50 سم له ساق منتصب شاحب اخضر رمادي عليه

شعيرات نجمية، الأوراق كثيرة وذات لون اخضر رمادي مقسمة إلى فصوص،

الأزهار شاحبة (نيسان - ابريل) صغيرة الحجم على شكل عناقيد طرفية، الثمرة

رقيقة مقوسة والبذور ملساء تتجمع في صف

واحد ضمن كل حجرة.

الجزء الطبي: المجموع الخضري.

المواد الفعالة: مشتقات كبريتية Thiocyanate:

ISO. وفلافينويدات Rhamnetin, ISO:

مواد 7-O-Beta-Gentiobioside

Strophanthidin * قلبية

Cardenolide

الأثر الطبي: قابض، طارد للديدان، شاف للجروح.

الملاحظات: * استخدمت هذه النبتة في شفاء جرحى الحروب.

* أنواع أخرى لنفس الجنس *D. californica* و *D. incana* و *D. pinnata*

Sisymbrium Sophia



(89)

الديفنباخيا

الاسم اللاتيني: *Diffenbachia picta* Schott

الاسم الإنكليزي: Dieffenbachia, dumbcane

الأسماء الأخرى: ديفنباخيا

العائلة: الأرامية Araceae

موطن النبات: أفريقيا

الوصف النباتي: نبات من نباتات الزينة الداخلي، ارتفاعه يصل إلى متر، يتميز بأوراقه المخططة بلون ابيض.

الجزء الطبي: العشبة بكاملها.

المواد الفعالة: Calcium oxalate crystals, Oxalic acid

الأثر الطبي: غير مدروسة

الملحوظات: * النبات كله سام

* نوع آخر *seguineD*



(90)

ديوسمه

الاسم اللاتيني: *Diosma hirstua*

الاسم الإنكليزي: Diosma

الأسماء الأخرى: داو سمى

العائلة: السذابية Rutaceae

موطن النبات: الأماكن والبيوت في شرق البحر المتوسط..

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 75 سم، أوراقه خيطية متقابلة ومتعاقبة طول نصلها 3 سم، على صفحتها السفلى غدد دهنية، الأزهار صغيرة جميلة ذات ألوان مختلفة مستمرة على مدار السنة.

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: غير مدروسة

الأثر الطبي: مقو للباه، منشط، مقو عام

الملاحظات:

* نوع آخر لنفس الجنس *D. oppositifolia*



(93)

الندبة

الاسم اللاتيني: *Drosera rotundifolia* L.

الاسم الإنكليزي: Drosera و Round-Leaved Sunden

الأسماء الأخرى: دروسيره، حشيشه الندى، ندى الشمس، نديمان، نديان، ماسك الذباب.

العائلة: الندويات Droseraceae

موطن النبات: المستنقعات والمراعي الرطبة في شمال أفريقيا.

الوصف النباتي: نبات معمر يبلغ ارتفاعه 20 سم، الساق اخضر محمر هزيل اجرد منتصب،

الأوراق مدورة ذات شعر طويل احمر لاصق، الأزهار بيضاء (تموز – يوليو)،

الثمرة متطاولة تحتوي عدد كبير من البذور المجنحة.

الجزء الطبي: المجموع الخضري.

المواد الفعالة: Droseron و صمغ وتانين وحوامض Gallus وزيت فلافينويدات

Quercetin و Plumbagin * Quinoid

الأثر الطبي: مضاد للسعال الديكي والربو والشعب والقصبات الهوائية، مطهر، مقاوم للحمى،

مضاد للتشنج والتقلصات.

الملحوظات: * صنع في ألمانيا عقار من خلاصة النبات اسمه Herba Droserae

* من النباتات أكلة الحشرات، فهو قادر على التهام 2000 حشرة خلال صيف

واحد.

* مضاد للجراثيم Staphyloquoques و Pneumocoque

* أنواع أخرى لنفس الجنس

D. aliciae

D. anglica

D. annua

D. binata

D. brevifolia

D. capensis

D. capillaris

D. filiformis

D. intermedia

D. rotundifolia

D. rotundifolia

D. xhybrida

D. xobovata





(94)

الحوربة

الاسم اللاتيني: *Dryas octopetala* L.

الاسم الإنكليزي: Dryade

الأسماء الأخرى: نبتة الجبال، حشيشه الريش.

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: أعالي الجبال في الوطن العربي.

الوصف النباتي: نبات معمر (يعيش إلى 100 عام) ارتفاعه 15 سم، ساقه زاحف مداد خشبي

متفرع، الأوراق سوقية خضراء من فوق وبيضاء قطنية الملمس، من تحت جلدية

متطاولة مستدبرة القاعدة، أطرافها مسننة بانتظام، الأزهار بيضاء (حزيران -

يونيو) كبير، الثمرة جافة، الجذر غليظ وليفي.

الجزء الطبي: الأوراق.

المواد الفعالة: تانين، سليكات، أملاح معدنية.

الأثر الطبي: قابض، هاضم، منشط، علاج لالتهاب الحلق.

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

D. drummondii

D. integrifolia



(97)

الهيل

الاسم اللاتيني: *Elettaria cardamomum* Motan

(*Amomum Repens*, *Alpinia Cardamomum*, *Amomum Cardamomum* *Amomum Cardamon*)

الاسم الإنكليزي: Cardamon و Cardamon seed Cardamomen

الأسماء الأخرى: حبهان، الحبهال، حب هان.

العائلة: الزنجبارية Zingiberaceae

موطن النبات: الهند ويزرع اليوم في عدة دول عربية منها العراق.

الوصف النباتي: عشبه معمرة ارتفاعها يصل إلى 2.5 متر، الأوراق بيضاء ولها شفاه زرقاء أو صفراء، تحمل الأزهار على أعناق طويلة، الثمار علبية خضراء مصفرة فيها بذور صغيرة سوداء، لها رايزومات لحمية.

الجزء الطبي: الثمار والبذور.

المواد الفعالة: زيت طيارة 2-7% يحتوي على تربينات أحادية، Terpinyl-acetate

و Limonene و Borneol و Carvol.

وسيكوتربينية FARNESOL

الأثر الطبي: تنبيه المعدة، طارد للغازات، هاضم، مسكن للمغص، مدر للطمث، مقو للقلب،

منبه للجنس، مطهر للفم، توسيع الشرايين.

الملحوظات: تضاف البذور إلى القهوة لإكسابها الطعم المميز، كما إلى الأطعمة والحلوى والمخلالات والكاري والمشروبات.



(98)

ذيل الفرس

الاسم اللاتيني: *Equisetum arvense* L.

الاسم الإنكليزي: Field Horsetail, Grass, Shave, Bottle Brush

الأسماء الأخرى: ذنب الخيل، كنبات، شيلة أمسوخ، ذيل الحصان، حشيشة الطوخ.

العائلة: ذيل الحصانيات Equisetaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: أعشاب معمرة تنمو برياً في المناطق الجبلية، لها سيقان طويلة 30 سم، الأوراق مظلية معكوسة تصغر إلى أعلى لتكون نورات زهرية (آذار - مارس) تحمل على سنبله متطاولة لونها اصفر- بني.

الجزء الطبي: الأوراق والبذور

المواد الفعالة: * Phosphoric Acid Sponius- Silica - Kiesel -

Flavonglykosid تربينات ثلاثية Betulinic Acid وستيرويدات

Apigenin-5-O-Beta-D- فلوكونيدات فلافينودية Fucosterol, ISO

Glucoside Lutein Epoxide* Carotenoid

الأثر الطبي: لعلاج النقرس، والحصى والرمل، تصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم مضاد للألم والالتهابات وفتح للشهية لمرضى الدرن ومضاد للفطريات.

السمية: الإنسان والحيوان، الحصان.

أعراض التسمم: إسهال شديد مع تقيؤ

العلاج: الراحة، إعطاءه السوائل، عند رجوع الأعراض ينقل إلى اقرب مركز صحي.

الملحوظات: أنواع أخرى لنفس الجنس

- E. arvense*
- E. fluviatile*
- E. hiemale*
- E. hyemale*
- E. laevigatum*
- E. palustre*
- E. pratense*
- E. scirpoides*
- E. sylvaticum*
- E. telmateia*



(101)

العرقون

الاسم اللاتيني: *Euphrasia officinalis* L.

الاسم الإنكليزي: Eye – bright

الأسماء الأخرى: كاسر النظارات، حاسر النظر، بهجة العيون، عرقون مخزني.

العائلة: الخنازيريات Scrophulariaceae

موطن النبات: مراعي شرق البحر الأحمر.

الوصف النباتي: نبات صغير ارتفاعه 20 سم، ساقه منتصبه متفرعة، الأوراق خضراء رمادية

مقابلة بيضاوية مسننة، الأزهار بيضاء موشحة بالبنفسجي وسطها اصفر (تموز

– يوليو)، الثمرة علبة مسطحة مشعرة فيها عدد كبير من البذور، والجذور فيها

مصاصات تلتصق بجذور النباتات المجاورة.

الجزء الطبي: المجموع الخضري الجاف.

المواد الفعالة: زيت عطري، تانين، سكريات، راتنج.

الأثر الطبي: مخفف للألم، مضاد للالتهابات، قابض، يخفف من الم العيون.

الملاحظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس

E. CHRISTII
E. CONFUSA
E. PICTA
E. ROSTKOVIANA



* لا توجد معلومات عن هذا النبات في قاعدة البيانات الخاصة التي استخدمتها

(102)

مضاض

الاسم اللاتيني: *Evonymus europaeus* L.

الاسم الإنكليزي: Fusain

الأسماء الأخرى: عرقية الراهب، اوفونيموس.

العائلة: القاتيات Celastraceae

موطن النبات: غابات حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: شجرة يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، الأوراق متقابلة لها سويق دقيقة التسنين،

الأزهار خضراء شاحبة (أيار - مايو)، تتجمع فيما يشبه الخيمات، الثمرة وردية

تحتوي 5 بذور صفراء.

الجزء الطبي: البذور والأوراق.

المواد الفعالة: تانين، دهنيات، حوامض عضوية، صبغيات، فيتامين (C).

الأثر الطبي: مفرغ للصفراء، منظم للمعدة.

الملاحظات: * تم استخلاص مبيدات حشرية من النبات.

* يستخرج منه فحم خشب النبات الذي يستخدم للرسم.



(105)

كف السبع

الاسم اللاتيني: *Ficaria manunculoides* Roth

الاسم الإنكليزي: Ficaire

الأسماء الأخرى: صفير، زر الذهب، عشبه البواسير.

العائلة: الشقيقية Ranunculaceae

موطن النبات: غابات وأدغال الوطن العربي.

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 25 سم، الساق أجرد رخو مورق، الأوراق خضراء لامعة قلبية محبة معرقة، الأزهار صفراء لامعة (آذار- مارس)، لها درنات متطاولة لاذعة.

الجزء الطبي: الدرنات والأوراق

المواد الفعالة: زيت عطري، صابونين، فيتامين (C).

الأثر الطبي: مهدئ للألم، مضاد للالتهابات.



(106)

ملكة المروج

الاسم اللاتيني: *Filipendula ulmaria* L.

(*Spiraea ulmaria*)

الاسم الإنكليزي: Bridewort Queen of The Meadow

الأسماء الأءرى: بوقيصي

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: الأراضى الرطبة فى حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتى: نبة معمرة كبيرة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر أوراقها كبيرة خضراء

غامقة مؤلفة من 5-17 ورقة مسننة، الأزهار ذات لون ابيض سكري

(حزيران – يونيو)، البذور بنية والجذور ليفية.

الءء الطبي: الأوراق والجذور.

المواد الفعالة: تانين، أملاح معدنية، فيتامين (C) قلويدات Amine, ISO-Amyl

وفلافينويدات Avicularin Quercetin* Flavonol.

الأءر الطبي: مضاد للتشنج والإلتهبات ومضاد للفيروسات، قابض، لانم للجروح، مدر

للبول، معرق، منشط ويعالج النقرس كما يستخدم للأورام السرطانية.

الملحوظات: تستخدم فى مجال التجميل والبيطرة.



(109)

أكليل الملك

الاسم اللاتيني: *Fritillaria imperialis*

الاسم الإنكليزي: Crown Imperial, Persian fritillary

الأسماء الأخرى: شلير، دوغو، ميلق، حشيشة الجمل

العائلة: الزنبقية Liliaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: أبصال تنمو في المناطق الجبلية، ارتفاع النبات 100سم، الأوراق قاعدية

سيفيه غامقة، الزهرة تاجية في الأعلى تتدلى منها زهيرات صغيرة (آذار - مارس).

الجزء الطبي: البصلة الغضة.

المواد الفعالة: Toxic alkaloid ($C_{35}H_{60}NO_4$)

الأثر الطبي: ملين للجلد، مبددة للرمل والحصى.

السمية: الإنسان والحيوان.

أعراض التسمم: ألم شديد في البطن.

العلاج: محلول ملحي لمواجهة اختلال موازنة الجسم.

الملاحظات:

* البصلة سامة يجب التعامل مع النبات بحذر

* يوجد أنواع أخرى لهذا الجنس *A Fpersic*





(110)

التوت البري

الاسم اللاتيني: *Fragaria vesca*

الاسم الإنكليزي: Perpetual Strawberry, Strawberry, Alpine
و Alder Buckthorn

الأسماء الأخرى: الفريز البري، توت الأرض.

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: مراعي وبساتين الوطن العربي.

الوصف النباتي: أعشاب زاحفة معمرة يصل طولها إلى 25 سم، الأوراق خضراء طرية لماعة مسننة، الأزهار بيضاء (أيار - مايو) والثمرة حمراء بيضاوية الشكل.

الجزء الطبي: الثمار والجذور.

المواد الفعالة: أملاح معدنية، سكريات، بروتينات، تانين، فيتامين (C) وقلويدات Anthranilate, Methy فلافينويدات Catechin وكاربوهيدراتية Fructose وتربينات أحادية Carveol Acetate وزيت عطري.

الأثر الطبي: قابض، مهدئ، منق للدم، مدر للبول، منشط مضاد للإلتهابات والبكتيريا.

الملاحظات: جنس آخر لنفس النوع *F. alnus*



(113)

رأس الهر

الاسم اللاتيني: *Galeopsis dubai* Leers

الاسم الإنكليزي: *Galeopsis*

الأسماء الأخرى: الجمالج، غليوبسيس، قريس منتن.

العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: حقول الوطن العربية.

الوصف النباتي: نبات سنوي ارتفاعه 50 سم، له ساق مغطى بوبر، الأوراق متقابلة بيضاوية مسننة، الأزهار صفراء وبيضاء وبنفسجية ووردية (تموز - يوليو).

الجزء الطبي: المجموع الخضري الجاف.

المواد الفعالة: تانين، صابونيزيد، سيليس.

الأثر الطبي: مضاد لفقر الدم، قابض، طارد للبلغم.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

G. ladanum

G. segetum

G. angustifolia

G. speciosa

G. pubescens

G. tetrahi

G. bifida



(114)

غاليون

الاسم اللاتيني: *Galium verum* L.

الاسم الإنكليزي: Lady's Bedstraw, Hierba Sanjuanera, Galio

الأسماء الأخرى: غليون

العائلة: البنية Rubiaceae

موطن النبات: حقول وتلال الأرياف في الوطن العربي.

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 75 سم، ساقه منتصبه قليلة التفرع، الأوراق دقيقة خيطية شوكيه، الأزهار صفراء ووردية حسب النوع، تنتظم في دوائر أو عثاكيل في أعلى الساق (حزيران - يونيو)، الثمرة ناعمة جرداء فيها رائحة العسل.

الجزء الطبي: الأقسام الزهرية

المواد الفعالة: حوامض، دهنيات، فيتامين (C) انثراكينون Anthraquinone, 1-6-

Dihydroxy-2-Methyl تربينات ايرودية Iridoid Monotropein*

.Monoterpene

الآثر الطبي: مضاد للتشنج، قابض، مفرغ للصفراء، مدر للبول، شاف للجروح مضاد للمقص ومقوى عام.

الملاحظات*: *G. aparine* هذا النوع يسمى اللصقي أو حشيشه الأفعى وأزهاره بيضاء، ويستخدم لعلاج الغدد اللمفاوية وداء الصدفية.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

G. jepsonii
G. johnstonii
G. matthewsii
G. mollugo
G. multiflorum
G. munzii
G. murale
G. muricatum
G. nuttallii
G. obtusum
G. odorata
G. odoratum
G. parisiense
G. pilosum
G. porrigens
G. serpenticum
G. texense
G. tinctorium
G. tricornutum

G. ambiguum
G. andrewsii
G. andrewsii
G. arkansanum
G. bolanderi
G. boreale
G. borealis
G. californicum
G. circaezans
G. clementis
G. cliftonsmithii
G. concinnum
G. divaricatum
G. glabrescens
G. grande
G. grayanum
G. hardhamiae
G. hilendiae
G. hypotrichium



(117)

إبرة الراعي

الاسم اللاتيني: *Robertianum Geranium L.*

الاسم الإنكليزي: Geranium, Dragon's Blood, Red Robin

الأسماء الأخرى: غرنوق، جارونية، جيرانيوم.

العائلة: الجارونيات Geraniaceae

موطن النبات: غابات الوطن العربي.

الوصف النباتي: نبات ساقه يميل إلى الحمرة، ارتفاعه 30 سم، أوراقه خضراء زاهية مفصصة، الأزهار وردية، بنفسجية (نيسان - إبريل).

الجزء الطبي: المجموع الخضري.

المواد الفعالة: تانين * Geraniin ، زيت عطري، راتنج، فيتامين (C) جلوكسيدات كرومون

Quercetin-3-O-Rhamno- Maltol * Chromone

.Maempferol-3-O-Rhamno-Galactoside * Glactoside

الأثر الطبي: مضاد للتشنج، قابض، مدر للبول، موقف للنزيف، خافض للسكر، منشط مضاد للمقص، مقوى ويعالج تقرحات المعدة والأورام.

الملاحظات: * يستخدم في التجميل والبيطرة.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

G. oreganum
G. phaeum
G. platypetalum
G. pratense
G. pusillum
G. pyrenaicum
G. retrorsum
G. richardsonii
G. rotundifolium
G. sanguineum
G. sessiliflorum
G. silvaticum
G. sylvaticum
G. texanum
G. tuberosum
G. viscosissimum

G. anemonifolium
G. arboreum
G. argenteum
G. bicknellii
G. caespitosum
G. californicum
G. canariense
G. carolinianum
G. columbinum
G. cuneatum
G. dissectum
G. erianthum
G. homeanum
G. ibericum
G. lucidum
G. macrorrhizum
G. maculatum
G. mexicanum
G. molle
G. multiflorum



(118)

الحشيشة المباركة

الاسم اللاتيني: *Geum urbanum* L.

الاسم الإنكليزي: Bennett Radix, Caryophyllate, Star of the Earth

الأسماء الأخرى: حشيشة القديس بنوا، حشيشة المحارب.

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: الأراضي الرطبة في حقول وبساتين الوطن العربي.

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 50 سم، ساقه منتصبه مغطاة بالوبر، الأوراق ريشية تتألف من 5-7 وريقات مسننة، الأزهار صفراء (أيار - مايو)، الثمرة مغطاة

بوبر، الجذور سمراء قصيرة.

الجزء الطبي: الأوراق والجذور.

المواد الفعالة: تانين، راتنج، سكريات، فيتامين (C) حامض السيتريك زيت عطري تربينات

أحذية: * Myrtanal, CIS.

الأثر الطبي: قابض، مقاوم للحمى، هاضم، معرق، منشط، شاف للجروح مطهر ويستخدم في الطب البيطري.

الملاحظات:

* أنواع أخرى لنفس
الجنس

G. coccineum

G. montanum

G.

pyrenaicum

G. reptans

G. rivale

G. urbanum

G. aleppicum

G. canadense

G. flavum

G. virginicum

G. macrophyllum G. vernum G. pulchrum G. peckii G. rossii



(121)

لبلاب ارضي

الاسم اللاتيني: *Glechoma hederacea* L.

الاسم الإنكليزي: Run-Away-Robin, Erva-Terrestre Ivy, Ground Cat's Foot

الأسماء الأخرى: الحلباب الأرضي، كفنة، عشقة.

العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: السياج في حدائق الوطن العربي.

الوصف النباتي: نبات معمر زاحف، يصل طوله إلى 25 سم، الأوراق خضراء رخوة محببة قلبية الشكل، الأزهار زرقاء بنفسجية (آذار - مارس).

الجزء الطبي: المجموع الخضري وعصير النبات.

المواد الفعالة: زيت عطري، تانين، سكريات، راتنج سيسكو تربين Muurolene, Epsilon

وتربينات أحادية * Myrcene وتلاثية Oleanolic Acid * Triterpene

وفلافونيدات * Luteolin-7-Di-O-Beta-D-Glucoside.

الأثر الطبي: مدر للبول، منشط، شاف للجروح، مضاد للأمراض الصدرية لعلاج السكري

والسعال وألم الطمث وأمراض الكبد.

الملحوظات: يدخل في إعداد الشاي السويسري.



(122)

الكوندور

الاسم اللاتيني: *Gonolobus condurango*

الاسم الإنكليزي: Condurango

الأسماء الأخرى: الكندورانغو

العائلة: الدفلية Apocynaceae

موطن النبات: جبال أمريكا الجنوبية.

الوصف النباتي: نبتة متسلقة تشبه العنب تتعلق بجذوع الأشجار وتنتج نحو القمة بحثاً عن النور، أوراقها قلبية، وأزهارها خماسية، ولثمارها هيئة اللفت، جذورها منتفخة نصفها في التربة والنصف الثاني هوائي.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: مادة الغلوكوسيد.

الأثر الطبي: هاضم، مخفف لألم المعدة، يستخدم في المجالات البيطرية.

الملاحظات: يقال أن نسر الكوندور يستعين بها ليتقي لدغ الأفاعي.



(125)

عود الأنبياء

الاسم اللاتيني: *Guaiacum sanctum*

الاسم الإنكليزي: Guaiacum, Guayaco و Holy wood tree

الأسماء الأخرى: جواياكم، خشب القديسين

العائلة: الرطراطية (الزيجوفيلية) Zygophyllaceae

موطن النبات: المكسيك.

الوصف النباتي: أشجار دائمة الخضرة، سيقانها مستقيمة، الأوراق خضراء متبادلة،

الأزهار بنفسجية، الثمار حمراء عنبية.

الجزء الطبي: إفرازات السيقان.

المواد الفعالة: الإفرازات هي مواد راتنجية تسمى (جواياكم)، صمغ Gaiacol لجنان

* Lignan * Alpha: Guaiaconic Acid، فيتامين ج

الأثر الطبي: تستخدم كمادة ملينة ومنبه، معرق ومقوي مسكن وخافض للحرارة مبول

والروماتيزم.

الملحوظات:

* نوع آخر لنفس الجنس *G. officinale*



(126)

شالموجرا

الاسم اللاتيني: *Gymnocardid adorata*

الاسم الإنكليزي: Chaulmoogra

الأسماء الأخرى: شالم كورا.

العائلة: الفلاكورتية Flacouriacede

موطن النبات: آسيا.

الوصف النباتي: شجرة طويلة تنمو في الغابات الكثيفة، لها ثمار قطيفية الملمس تشبه ثمار النارج.

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: زيت دهني.

الأثر الطبي: لعلاج البرص والجذام.

الملاحظات: ذكرت في كتب الهندوس القديمة.



(129)

طاقية

الاسم اللاتيني: *Helichrysum arenarium*

(*Helichrysum Rubicundum*, *Antennaria Rubicunda*)

الاسم الإنكليزي: Imortelle

Straw flower yellow everlasting

الأسماء الأخرى: خالدة طاقية.

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: شرق البحر الأحمر.

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر، ساقه ترتفع إلى 25 سم، الأوراق ملعقيه مستطيلة

بيضيه - الأزهار صفراء عذقية التجمع.

الجزء الطبي: الرؤيسات المزهرة.

المواد الفعالة: جلوكوسيدات فلافونيدية Naringenin-4'-O-Beta-D-Glucoside

وفلافينويدات* Apigenin تربينات أحادية وثلاثية Arnidiol

وسيسكوتيربينات Muurolol, Alpha ولاكتون* Helipyron

الأثر الطبي: مدر للبول، علاج لعسر التبول، علاج لعلل المرارة مضاد للمقصف ومخفض

لضغط الدم.

الملحوظات: أنواع أخرى لنفس الجنس

H.

bracteatum

H. frigidum

H. italicum

H. petiolare

H. petiolatum

H. stoechas



(130)

خربق اسود

الاسم اللاتيني: *Helleborus niger*الاسم الإنكليزي: Christmas Flower, Hellebore, Black Rose
الأسماء الأخرى:

العائلة: الشقفيّة Ranunculaceae

موطن النبات: غابات الجبال في حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: عشبه ارتفاعها 30 سم، الأوراق دائمة الخضرة سوقها طويلة وهي
مجنحة (7 – 9) أجنحة خشنة اللمس ومسننة في الأجزاء العليا من جوانحها،
الأزهار نجمية خماسية كبيرة وبيضاء عند نضجها ثم وردية، الجذور كثيرة
التفرع سوداء من الظاهر وبيضاء من الداخل رائحتها كريهة.

الجزء الطبي: العشبية بكاملها

المواد الفعالة: Digital glykoside و Hellebrin و Helleborelin
protoanemonin مركبات قلبية * Cardenolide و Hellebrin
ولاكتون Misc Lactone * Protoanemonin وقلويدات
Corytuberine وستيرودات Polypodine B وفلافينويدات
Quercitrin, ISO :

الأثر الطبي: لعلاج ضعف القلب وأمراض الكبد - مخدر، مدرة للبن وإخراج المشيمة.
السمية: الإنسان والحيوان
أعراض التسمم: عصارته تحرق الجلد إذا لامسته واكل جزء منها يؤدي إلى فقدان الوعي
العلاج: إعطاء الكريمات المرطبة للجلد وغسل المعدة عند الحاجة مع الراحة التامة.
الملاحظات: * مسجل النبات في الدستور الطبي الألماني، حيث تم تصنيع عقار
(Radix Melleebori nigri) يستعمل لعلاج ضعف القلب وأمراض الكبد.
* أنواع أخرى لنفس الجنس

H. dumetorum
H. foetidus
H. lividus
H. odorus
H. orientalis
H. foetidus
H. orientalis



(133)

حشيشة الفتق

الاسم اللاتيني: *Herniaria glabra*

الاسم الإنكليزي: Rupturewort و Turks herbe

الأسماء الأخرى: حشيشة الفتق المرداء، نومان امرد، نبات الشيخ

العائلة: النومانيات Illecebraceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نبات عشبي بري معمر، ساقه متفرعة، الأوراق صغيرة متقابلة بيضيه النصل، ملساء البشرة، الأزهار ابطية وتاجية، وتتجمع في عناقيد صغيرة.

الجزء الطبي: العشبة كلها عدا البذور.

المواد الفعالة: زيوت، صابونين، هرينارين. تربينات ثلاثية Blabroside C وكيومارين

* Umbelliferone جلوكسيدات صابونية 5 Herniaria Saponin

وفلافينويدات Rutin.

الأثر الطبي: مسكن لألام المسالك البولية والكليتين، لعلاج المثانة، مدر للبول وخافض للضغط الدم.



(134)

زهرة المساء

الاسم اللاتيني: *Hesperis matronalis* L.

الاسم الإنكليزي: Julienne

الأسماء الأخرى: بنفسجة دمشق، جوالينا، لورانس الصباح.

العائلة: الصليبية Brassicaceae

موطن النبات: سياجات الحدائق في الوطن العربي.

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 50 سم، الساق منتصب مستقيم اسطواني متفرع نحو الأعلى، الأوراق أحادية مسننة خشنة، الأزهار بيضاء ووردية وأرجوانية (أيار

– مايو) تنتظم في كتاكيل، الثمرة خردلية طويلة محدبة تضم بذرتين.

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: زيت دهني، فيتامين (C).

الأثر الطبي: مدر للبول، طارد للبلغم، معرق، علاج للخراج، علاج للنقرس.

الملاحظات: تنشر عطرها عند المساء، يرغب النحل في رحيقها



(137)

الشعير

الاسم اللاتيني: *Hordeum vulgare*

(*Hordeum sativum*)

الاسم الإنكليزي: Pearl Barley, Common Barley, Barley

الأسماء الأخرى: شيتعور، قلت، قصيل

العائلة: النجيلية Poaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: عشبي حولي شتوي، له أوراق رمحية والأزهار سنبلية فيها الحبوب.

الجزء الطبي: الحبوب

المواد الفعالة: نشا وبروتين و عناصر معدنية مثل الحديد والفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم

و Apiol Myristicin و Mildly toxic terpenes مواد بروتينية

Calmodulin و كاربوهيدراتية 2-Carboxy Arabinitol: وقلويدات

Cyclic AMP, وكيومارين Aesculetin وكيونويد

Benzoquinone, 1-4: وسيسكوثيربينات * Absciscic ACID

وفلافينويد: Catechin, (+) مواد بينزينية Alkyl Resorcinol

الأثر الطبي: ماء الشعير لعلاج السعال وتخفيض درجة الحرارة - حبوب الشعير مقوية

للأعصاب ومنشطة للكبد - (الهوردنين) المستخرج من الشعير يستعمل حقناً

تحت الجلد أو شراباً لعلاج الديزانثري والتهاب الأمعاء، مغلي نخالة الشعير

لعلاج الجروح المتقيحة. يستعمل كغذاء ولإلتهابات الكلى وخارجياً كمطرب

ولعلاج الأنفلونزا والحصبة.

الملاحظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس

H. distichon

H. intercedens

H. jubatum

H. leporinum

H. marinum

H. murinum

H. pusillum



(138)

ختم الذهب

الاسم اللاتيني: *Hydrastis canadensis*

الاسم الإنكليزي: Golden Seal, Ground Raspberry, Jaundice Root

الأسماء الأخرى: هيدراستس

العائلة: الشقية Ranunculaceae

موطن النبات: شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نبات معمر، له أوراق حرشفية في الجزء السفلي من النبات والأوراق العليا كثيرة ومفصصة، الأزهار بيضاء مفردة في نهايات الأفرع، وله رايزومات أرضية.

الجزء الطبي: الجذور (الرايزومات)

المواد الفعالة: قلويدات (Hydrastine و Hydrastinine) *Berberine

وفلافينويدات Luteolin,6-C-Methyl: 7-Methyl Ether

وكاربوهيدراتية Galactose,D ومركبات اوكسجينية Furan-2-

Carboxaldehyde,5-(Hydroxy-Methyl):

الأثر الطبي: قابض، مقوي، علاج للنزلات الصدرية، علاج التهابات الأغشية المخاطية، علاج المثانة والرحم والروماتيزم واحتقان الأنف ومدر للعصارة الصفراوية.



(141)

المتة

الاسم اللاتيني: *Ilex paraguariensis* L.

الاسم الإنكليزي: Mate و Paraguay tea

الأسماء الأخرى: شاي الجزويت، الماتي، شاي اليسوعيين.

العائلة: الهبشيات Aquifoliaceae

موطن النبات: الأرجنتين.

الوصف النباتي: شجرة تزيينه ارتفاعها يصل إلى 10 أمتار، الأوراق خضراء قاتمة

متموجة مسننة شائكة لماعة، الأزهار بيضاء (أيار – مايو) والعلبة رمادية

تتحول إلى اللون الأحمر عند النضج تحتوي 4-5 بذور.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: قلويد الكافيين 1.5%، تانين.

الأثر الطبي: تنبيه الجملة العصبية، زيادة حركة الأمعاء.

الملاحظات: تستخدم الأوراق المجففة في الظل، بديل للشاي والقهوة.



*هذه النبتة لم أجد لها في قاعدة البيانات التي استخدمتها

(142)

الجاذبة

الاسم اللاتيني: *Illicium anisatum* Hook

(*Illicium religiosum*)

الاسم الإنكليزي: Bastard Anise, Chinese Star Anise

الأسماء الأخرى: انيسون نجمي، بديان نجمي.

العائلة: المنغنوليات Illiciaceae

موطن النبات: الصين.

الوصف النباتي: شجرة ارتفاعها 5 أمتار، لها قشرة بيضاء، الأوراق لامعة، الأزهار نجمية بيضاء كبيرة جميلة.

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: سكريات، زيوت، الانيتول زيت عطري * Anethole سيسكوتيربينات

وإلليسينون E,11-EPI لجنان Majucin,6-Deoxy

.Procyanidin A-1

الأثر الطبي: طارد للغازات، مقوية، لعلاج فقر الدم، لعلاج عسر الهضم منه.

الملاحظات: أنواع أخرى لنفس الجنس *I. floridanum* و *I. verum*



(145)

الجوز

الاسم اللاتيني: *Juglans regia* L.

الاسم الإنكليزي: Walnut Tree, Persian Walnut, Bamnet Tree

الأسماء الأخرى: خسف، كوز

العائلة: الجوزيات Juglandaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: شجرة كبيرة يصل ارتفاعها إلى 25 متراً، الأوراق دائمة بيضيه مركبة، الأزهار خضراء وحيدة المسكن، الثمرة جوزة كروية يحيط بها غلاف لحمي اخضر يسود بالتجفيف

الجزء الطبي: الأوراق، قشرة الثمرة، اللب.

المواد الفعالة: الهبوليات، الغلوسيد، أملاح معدنية، فيتامينات، زيت الجوز في الأوراق (2%) وفي الثمار (50%)، سليكوز، تانين Glanstin C، أحماض امينية،

فيتامين (C) جلوكسيدات-1-O: Naphthalene,4-8-Dihydroxy:

* Beta-D-Glucoside سيسكوتيريبيانات Farnesene,Alpha

وفلافينويد Hyperoside .

الأثر الطبي: مغذ جيد، مجدد للنشاط، طارد للدودة الوحيدة، مقوي للشعر، منق للدم، مضاد للسكر، مضاد للسفلس، خافض للكوليسترول الضار، مخفض لضغط الدم، مضاد للفطريات يساعد في التئام الجروح.

J. ailanthifolia

J. californic

J. cinerea

J. hindsii

J. major

J. microcarpa

J. nigra



(146)

جوز كالابار

الاسم اللاتيني: *Justicia adhatoda*

الاسم الإنكليزي: Malabar nut

الأسماء الأخرى: الجوز الاصفر

العائلة: الافنثيات Acanthaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط.

الوصف النباتي: شجيرة لها ساق اسطوانية متفرعة، الأوراق اهليلجية معنقة متقابلة،

الأزهار زنبقية الشكل، هامية الارتكاز وصفراء اللون.

الجزء الطبى: الأوراق

المواد الفعالة: تانين، زيت.

الأثر الطبي: علاج للأمراض الجلدية، مضاد للتشنج، مقوي.

الملحوظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس.

J. americana

J. aurea

J. betonica

J. brandegeeeana

J. californica

J. ovata

J. runyonii

J. secunda

J. spicigera

J. wrightii



(149)

القريص الأبيض

الاسم اللاتيني: *Lamium album* L.

الاسم الإنكليزي: Stingless Nettle, White Dead Nettle

Lamier blanc

الأسماء الأخرى: قريص الدجاج

العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: حوافي الطرقات في أماكن عدة من الوطن العربي.

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 50 سم، الساق صلب أجوف، الأوراق قلبية مسننة، الأزهار بيضاء (نيسان - ابريل).

الجزء الطبي: المجموع الخضري الجاف في الظل.

المواد الفعالة: تانين، سكريات، زيت عطري، حوامض امينية، بوتاسيوم قلويدات

Quercetin-5-O-Beta-D-Flavonoid Stachydrine, L: *

Glucoside مواد كاربوهيدراتية Stachyose و مواد صابونية * O

Caryoptoside* Iridoid تربينات Saponins (Nuspecified

.Monoterpene Alboside B* Secoiridoid Monoterpene

Lamalbid* Misc Lactone ولاكتون

الأثر الطبي: مضاد للالتهابات، قابض، منق للدم، طارد للبلغم، قاطع للنفز، لاثم لجروح

سرطان الثدي ومطهر وللروماتيزم.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

L. amplexicaule

L. galeobdolon

L. garganicum

L. maculatum

L. orvala

L. purpureum





(150)

حشيشة الأثداء

الاسم اللاتيني: *Lapsana communis*

الاسم الإنكليزي: Nipplewort Lampsane

الأسماء الأخرى: دجاجة سمينية، المطهرة، خنج مبذول.

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: المراعي في الوطن العربية.

الوصف النباتي: نبات بري سنوي، يرتفع إلى 100 سم - الساق منتصب متفرع من الأعلى

فيه سائل حليبي - الأوراق متعاقبة لها أسنان متباعدة - الأزهار صفراء تتفتح

صباحا وتنقبض مساء (أيار - مايو) تنتظم (8-12) زهرات في رؤيسة.

الجزء الطبي: الأوراق والعصارة.

المواد الفعالة: سيسكوتيريبيين Tectoroside Lapsanoside B وفلافينويد

Cynaroside* Luteolin*

الأثر الطبي: مضاد للسكري، ملين، منعش، لانم للجروح. مضاد لبكتيريا السل والتهابات.

الملحوظات: يستخدم طعام للآرانب



(153)

رجل الأسد

الاسم اللاتيني: *Leontopodium alpinum*

الاسم الإنكليزي: Edelweiss

الأسماء الأخرى: ذينان جبلي

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: جبال شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر، ارتفاعه 30سم، الأوراق كثيفة التجمع نصلها ابيض، الزهرة كبيرة مفردة مخملية الأوراق بيضاء اللون.

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: تانين، راتنج زيت عطري سيسكوترين Caryophyllene,

Diastereoisomer A وكيومارين * Obliquin

الأثر الطبي: قابض - مضادة للسعال - يستخدم لأمراض الحيوانات الأليفة والأورام السرطانية ومضاد للالتهابات.



(154)

ذنب الأسد

الاسم اللاتيني: *Leonurus cardiaca* L.

الاسم الإنكليزي: Agripaume, Lion's Tail, Five-Lobed Bladderwort
Roman Motherwort

الأسماء الأخرى: فراسيون القلب، قفيل.

العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 50 سم، ساقه كثير التفرعات مغطى بالأوراق، الأوراق خضراء داكنة مسننة ومخرمة، الأزهار وردي أرجواني (حزيران - يونيو).

الجزء الطبي: الأطراف المزهرة.

المواد الفعالة: زيت عطري، سكريات، تانين. قلويدات Stachydrine, L:

وسيسكوتربينات* Caryophyllene وتربينات ثنائية Ballotenol, ISO:

Acetate* وتربينات ثلاثية * Ursolic Acid تربينات أيرودية

* Ajugoside وستيرويدات* Stigmasterol وفلافينويدات

* Apigenin-4'-O-Beta-D-Glucoside* وفيتامينات Cosmosiin*

ج Ascorbic Acid و أ * Vitamin A

الأثر الطبي: مضاد للتشنج، لائم للجروح، منظم، طارد للبلغم. مدره للطمث ولألم الروماتيزم وكمخدر.

الملحوظات: * أزهاره جاذبة للنحل



(157)

حشيشة الشقوق

الاسم اللاتيني: *Linaria cymbalaria*

الاسم الإنكليزي: Cymbalaria

الأسماء الأخرى: مخلصه، حباب مبدول.

العائلة: الخنازيريات Scrophulariaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط..

الوصف النباتي: نبات عشبي بري، ارتفاعه 50 سم، الأوراق متعاقبة، الأزهار بنفسجية

موشحه بالأصفر (حزيران - يونيو).

الجزء الطبي: المجموع الخضري.

المواد الفعالة: تانين، راتنج، أحماض.

الأثر الطبي: لائم للجروح، علاج للبواسير، قاطع للنزيف مقوى عام ومبول.

الملحوظات: أنواع أخرى لنفس الجنس

L. alpina

L. bipartita

L. canadensis

L. dalmatica

L. japonica

L. maroccana

L. micrantha

L. pelisseriana

L. purpurea

L. repens

L. saxatilis L. triornithophora L. triphylla L. vulgaris



(158)

جاوي

الاسم اللاتيني: *Lindera benzoin*

(*Laurus Benzoin*, *Benzoin Aestivale*)

الاسم الإنكليزي: Benzoin, Spice Bush, Feverwood

الأسماء الأخرى: بنجوان مخزني

العائلة: القرفية Lauraceae

موطن النبات: إيران.

الوصف النباتي: شجرة ارتفاعها 4 أمتار، الأوراق اهليلجية خضراء تشبه أوراق البرتقال، الأزهار نورية التجمع، الثمار لحمية بيضيه الشكل حمراء اللون.

الجزء الطبي: اللحاء الخارجي (القف)

المواد الفعالة: راتنج خليط من اللاكتونات Obtusilactone A, ISO: * Misc

Lactone قلويدات I * Laurotetanine وسيكوتربينات

Nerolidol, CIS: (+): *

الأثر الطبي: مثير للشهوة، قابض، مضاد للربو والتهاب الشعب الهوائية والسل الرئوي. مخفض للحرارة مدر للطمث وطارد للديدان.

الملحوظات: * يصنع من القلف افخر أنواع البخور

* نوع آخر لنفس الجنس *L. chunii*



(161)

الطباق الهندي

الاسم اللاتيني: *Lobelia inflata*

الاسم الإنكليزي: Indian Tobacco Gagroot, Asthma Weed

الأسماء الأخرى: اللوبليا، التبغ الهندي

العائلة: الجريسات Campanulaceae

موطن النبات: أمريكا الشمالية.

الوصف النباتي: عشب صغير حولي ارتفاعه 50 سم، الساق قائمة قليلة التفرع ملساء، الأوراق صغيرة بسيطة متبادلة معنقة، الأزهار في نورات محدودة زرقاء صغيرة ولكن كثيرة في العدد.

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: 14 قلويد تشكل 0.6% من النبات، أهمها قلويد Lobelline، زيوت طيارة وثابتة، راتنج. قلويدات: Nor: Sedamine, Allo: Lobelidine* ومواد

بروتينية-2-OXO-L-Phenylalanine, Aminotransferase

Glutarate: *

الأثر الطبي: طارد للبلغم، نافع في حالات البرد والنزلات الشعبية. للازما والحساسية ومقئ.

الملاحظات: * يحتوي نيكوتين بما يعادل النيكوتين الموجود في التبغ الاعتيادي لذا يستخدم في حالة التقليل من استخدام التبغ.

* أنواع أخرى لنفس

الجنس

L. berlandieri

L. canbyi

L. cardinalis

L. cirsiifolia

L. digitalifolia

L. dortmanna

L. gloria-montis

L. irasuensis

L. kalmii

L. laxiflora

L. puberula L. reverchonii L. siphilitica L. spicata L. splendens



(162)

زوان

الاسم اللاتيني: *Lolium temulentum*

(*Bromus Temulentus*)

الاسم الإنكليزي: Darnel, Poison, Darnel, Drunkgras Wimmera

Tares و Ryegrass

الأسماء الأخرى: رويطة، شيلان، جليف، غلاب

العائلة: النجيلية Poaceae

موطن النبات: حقول القمح في الوطن العربي

الوصف النباتي: عشبه حولية ارتفاعها 90 سم، ساقها خضراء أوراقها شريطية ضيقة

طويلة برأس دقيق، سنابلها الصغيرة تمتد صفيين على جانبي الساق، حبوبها

طويلة سمراء، تزهر في (نيسان - ابريل).

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: Temulin وهو قلوي. قلويدات Perloline* Quinoline Alkaloid

Loine, Nor: N-Acetyl: Pyrrolizidine Alkaloid و مواد

كاربوهيدراتية * Fructan

الأثر الطبي: لعلاج الآلام الأعصاب، مضاد لمغص المعدة، مخفف لحكة الجلد. مهدئ

السمية: الإنسان، الخيول، الأغنام

أعراض التسمم: فقدان التوازن و هلوسة

العلاج: غسل الفم و غسل المعدة و إعطاء السوائل و الراحة.

ملحوظة: تعتبر قلويدات البريزودلين من المواد المسرطنة

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

L. perenne

L. rigidum

L. rigidum

L. multiflorum

L. perenne



(165)

عوسج

الاسم اللاتيني: *Lycium barbarum* Dun

(*Lycium Halimifolium*, *Lycium Vulgare*)

الاسم الإنكليزي: jasmine, bastard Box thorn

Box-thorn و jessamine wolfberry

الأسماء الأخرى: العوشز

العائلة: الباذنجانية solanaceae

موطن النبات: أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: شجيرة برية شوكية واسعة الانتشار دائمة الخضرة ارتفاعها 3 أمتار، الأوراق وبرية مزرقة، الأزهار طويلة ومعنقة، الجذور وتدية عميقة سريعة النمو.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: Lycin, Tropein Cholin قلويدات * Hyoscyamine* Atropine*

Melatonin* صابونينات * Diosgenin وكيومارين* Scopoletin*

وستيرويدات s * Daucosterol تربينات ثلاثية* Echinoidide مواد

كاربوهيدراتية * Lycium O-Glycan وفلافينويدية * Kaempferol*

فيتامينات* Vitamin b-2 * Vitamin b-1 مواد غير عضوية

Hydrocyanic Acid* Calcium*

الأثر الطبي: أدوية مسهلة، مقوي للشهوة الجنسية. طارد للبلغم مدر للبول والطمث، منوم ومضاد للمقصد.

الجزء السام: الأوراق

السمية: الإنسان والحيوانات

أعراض التسمم: إسهال شديد

العلاج: غسل المعدة الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

L. andersoni
L. berlandieri
L. californicum
L. carolinianum
L. cooperi
L. europaeum
L. ferrocissimum
L. fremontii
L. intricatum
L. sandwicense
L. texanum



(166)

رجل الذئب

الاسم اللاتيني: *clavatum Lycopodium*

الاسم الإنكليزي: Lycopode, Lycopodium Moss, Club

الأسماء الأخرى: الخدرية، مسيكة

العائلة: الخدريات Lycopodiaceae

موطن النبات: غابات شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نبات معمر طوله يصل إلى المتر، الساق متفرع مداد جذري له فروع صاعدة متباعدة، الأوراق كثيفة صغيرة مترابطة تنتهي بخيوط حريري أبيض طويل، الفروع مخصبة مورقة منتصبة تنتهي بسنابل طويلة من القنابات المثلثة تضم أكياس البوغ الصفراء الزاهية (تموز - يوليو).

الجزء الطبي: الابواغ

المواد الفعالة: دهنيات * Lipid Stearic Acid, 9-10-Dihydroxy: * ، سيليلوز،

سكريات، هيولات، أملاح معدنية. تربينات ثلاثية Lycopoclanol, 16-

Campesterol, 22- وستيرويدات Serratenediol, Diepi: OXO: *

Dehydro: * Clavatine و مواد بروتينية * Prolamine

الأثر الطبي: ملين، علاج للأمراض الجلدية ولتقلصات العضلات وكمقئ ومدر للطمث
الملاحظات: * مسحوق الابواغ تستخدم في صناعة الألعاب النارية، حيث للزيت قدرة على الاحتراق.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

L. annotinum

L. cernuum

L. complanatum

L. crassum

L. digitatum

L. obscurum

L. selago

L. sitchense

L. tristachyum



(169)

دم الجريح

الاسم اللاتيني: *Lythrum salicaria*

الاسم الإنكليزي: Sage Willow, Rainbow Weed, Loose Strife

Salicaria

الأسماء الأخرى: الفرندل، جوفران، السفناخ البري

العائلة: Lythraceae

موطن النبات: ألمانيا.

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 120 سم، الساق منتصب قوي مربع الزوايا، الأوراق

مشعرة بيضوية مسننة متقابلة، الأزهار وردي إلى بنفسجي (حزيران - يونيو)

تنتظم في دوائر على هيئة سنابل طرفية.

الجزء الطبي: الأطراف المزهرة.

المواد الفعالة: تانين، سكريات، كولين، اوكلات الكالسيوم، حديد. تانين * Castalagin

* Galloyl-Glucose, 1-6-DI-O: ، فلافينويد * Orientin ، كيومارين

* Ellagic Acid ، تربينات ثلاثية * Ursolic Acid و سيسكوتيربين

* Loliolide

الأثر الطبي: قاطع للنزيف، قابض، منشط. لعلاج الجروح والدسنتاريا والإسهال والسكري.

الملاحظات: * تستخدم أزهاره كأصباغ حمراء طبيعية للأغذية وتلوين الملابس.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

L. alatum

L. californicum

L. hyssopifolia

L. hyssopifolium

L. junceum

L. maritimum

L. tribracteatum





(170)

البردقوش

الاسم اللاتيني: *Majorana hortensis* L.

الاسم الإنكليزي: Margoram

الأسماء الأخرى: بردقوش، مردقوش، مردكوش، مرزنجوش، العترة، الدوش.

العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر ارتفاعه 80 سم مستديم الاخضرار غزير التفرع، الأوراق بسيطة خضراء ذات تسنين بسيط بيضاوية، الأزهار صغيرة في مجموعات راسية، الثمار كروية.

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: زيت عطري (Terpinen-Thymol).

الأثر الطبي: طارد للبلغم، مزيل لأمراض الكبد، طارد للغازات، يلمع ويثبت شعر الرأس



(171)

التفاح

الاسم اللاتيني: *Malus communis* Poir.

الاسم الإنكليزي: Apple

الأسماء الأخرى: سيب

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: أشجار معروفة، ارتفاعها 5 أمتار، الأوراق خضراء، الأزهار بيضاء وردية، الثمار كروية تمتاز بعدة ألوان حسب النوع.

الجزء الطبي: الثمار

المواد الفعالة: سكريات 12%، حوامض عضوية، فيتامينات،

الأثر الطبي: ينشط الأمعاء، يمنع الإمساك المزمن، يفتت الحصى في الكلى والحالب والمثانة والمرارة، يزيل حامض البول، يدر البول، ينقي الدم، ينشط الكبد، يزيل الاحتقانات الصفراوية، يهدئ الأعصاب، يخلص الجسم من الأحماض والدهون، يسهل إفرازات غدد اللعاب والأمعاء والكبد، ينشط القلب، يخفف آلام التهاب الأعصاب، يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، مضاد للتصلب الشرياني وضغطه المرتفع، يساعد على التخلص من عسر الهضم والبدانة تستعمل الأوراق للسعال العقارب.

الملاحظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس

M. domestica
M. domesticus
M. florentina
M. fusca
M. hupehensis
M. microM.
M. pumila
M. sikkimensis
M. sylvestris





(172)

ترنجان

الاسم اللاتيني: *Melissa officinanalis* L.

الاسم الإنكليزي: Lemon balm

الأسماء الأخرى: المليسة، حبق ترنجاني، ماليا، مفرحة القلب، حشيشه النحل.



العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عشبي شجيري معمر، ارتفاعه 60 سم، الأوراق بيضيه متقابلة معنقة مسننة، الأزهار بيضاء أو وردية فاتحة (حزيران - يونيو).

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: زيت عطري، كحول، تانين، مواد مرة.

الأثر الطبي: الزيت مضاد للتشنج والمغص المعوي وطارد للغازات ومسكن عصبي.

الملاحظات: * يستخدم الزيت في صناعة مستحضرات التجميل.

* نبات يرغبه النحل

(173)

العسلية

الاسم اللاتيني: *Melittis melissophilum* L.

الاسم الإنكليزي: Balm melittis و Bastard balm

الأسماء الأخرى: تربخان نتن

العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: غابات البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر، الساق منتصب، الأوراق سويقية مسننة كبيرة، الأزهار صغيرة بيضاء وردية تتجمع في دورات (أيار - مايو).

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: كمارين

الأثر الطبي: مطهر، مدر للبول، مطمئ، مهدئ، لعلاج داء النقرس.

الملاحظات: * من نباتات الزينة



(174)

نفل الماء

الاسم اللاتيني: *Menyanthes trifoliata* L.

الاسم الإنكليزي: Boy bean و Marsh trefoil

الأسماء الأخرى: فصّة الماء، اطريفل الماء.

العائلة: النفلديات Menyanthaceae

موطن النبات: المستنقعات والبحيرات والاهوار في الوطن العربي

الوصف النباتي: نبات نصفه مغمور بالماء، وهو نبات معمر مداد، الأوراق ثلاثية كبيرة،

الأزهار بيضاء (نيسان - ابريل) تنتظم في شمراخ.

الجزء الطبي: الأوراق المجففة في الظل.

المواد الفعالة: كولين، يود، فيتامين (C)، أنزيمات.

الأثر الطبي: مضاد للإسقربوط، فاتح للشهية، مطمئ، مطفي الحمى، هاضم، منشط.

الملاحظات:

الملاحظات: * من نباتات الماء الجميلة.



(177)

القفص الصدري

الاسم اللاتيني: *Monstera acuminata*

الاسم الإنكليزي: Split-Leaf Philodendron ،Mexican Bread Fruit

الأسماء الأخرى: القشطة الهندية

العائلة: الأرامية Araceae

موطن النبات: المكسيك.

الوصف النباتي: احد نباتات الزينة المعروفة التي تنتشر في المنازل والمكاتب، للنبات ساق رئيسي يرتفع إلى 6 أمتار، الأوراق خضراء لامعة تنمو طويلا ذات أعناق مع وجود تمزق وشقوق بيضاوية تميز الورقة، الزهور بيضاء تنضج إلى فاكهة صالحة للأكل لها رائحة بين الموز والأناناس، الجذور هوائية.

الجزء الطبي: الثمار

المواد الفعالة: حامض الأوكساليك

الجزء السام: المادة السائلة من المجموع الخضري

السمية: الإنسان

أعراض التسمم: تلغم النطق وفقدانه

العلاج: غسل الفم وغسل المعدة وإعطاء السوائل مع الراحة التامة.

الأثر الطبي: الثمرة علاج فعال للحنجرة

الملاحظات: * ينمو النبات في درجة حرارة 20-30 °م

* أنواع أخرى لنفس الجنس *M. deliciosa* و *M. tenuis*



(178)

اذان الفار

الاسم اللاتيني: *Myosotis scorpioides* L.

(*Myosotis Palustris*)

الاسم الإنكليزي: True Forget-Me-Not

Forget me not

الأسماء الأخرى: ميوسوطيس، عين الهدهد، لاتنسني

العائلة: الحمحميات Boraginaceae

موطن النبات: إيران ثم انتقل إلى الوطن العربي

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 35 سم، الأوراق كثيرة متطاولة مسننة رخوة،

الأزهار زرقاء (أيار - مايو).

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: عناصر غذائية أهمها البوتاسيوم، تانين.

قلويدات: Scorpioidine,7-Acetyl: * و O * Pyrrolizidine Alkaloids

Myoscorpine *

الأثر الطبي: مضاد للالتهابات، مهدئ، منشط، لعلاج الوهن، لعلاج التهاب العيون.

الملاحظات: Pyrrolizidine Alkaloids تعتبر مواد مسرطنة

* أنواع أخرى لنفس الجنس

M. alpestris

M. asiatica

M. discolor

M. latifolia

M. laxa

M. sylvatica



(181)

نرجس

الاسم اللاتيني: *Narcissus pseudo* L.

الاسم الإنكليزي: Narcissus , Daffodil

الأسماء الأخرى: دايفودول، محلا زمانه، قهد، عبهر.

العائلة: النرجسية Amaryllidaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: يصل حولي شتوي يصل ارتفاعه 45 سم، الأوراق ضيقة قائمة أو طويلة

شريطة لونها اخضر غامق، الأزهار مختلفة الألوان والغالب هو الأبيض

والأصفر، وتعتبر من زهور القطف، البصلة تتكون من ساق قرنية.

الجزء الطبي: الأوراق المجففة.

المواد الفعالة: Phenanthridine و Scillain و Tannin Inuin و Nacriclasine

Calcium oxalate crystals و alkaloids lycorine

الأثر الطبي: مسهل، لعلاج الزكام، علاج السعال الديكي.

الجزء السام: البصلة

السمية: الإنسان والحيوان.

أعراض التسمم: ألم شديد في البطن، إسهال شديد.

العلاج: غسل الفم و غسل المعدة و إعطاء السوائل مع الراحة التامة.

الملاحظات: * النبات مسجل في الدستور الطبي الألماني، ومنه تم تصنيع عقار Bulbus

Naroissi يستخدم في حالة الزكام والنزلات الشعبية والسعال الديكي.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

N. elegans

N. hybrid

N: papyraceus

N. poeticus

N. jonquilla

N. cyclamines

N. tazetta

N. triandrus



• لم أجد معلومات عن هذه النبتة في قاعدة البيانات التي استخدمتها.

(182)

القَطْرَم

الاسم اللاتيني: *Nepeta cataria* L.

الاسم الإنكليزي: Catwort, Catnip Herb, Cataire, Catsmint

الأسماء الأخرى: نبات القط، نعناع القط

العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: الحقول والمراعي في الوطن العربية.

الوصف النباتي: نبات معمر، الساق منتصب متفرع ارتفاعه 1.5 متر، الأوراق عريضة

محببة مسننة خضراء قلبية، الأزهار زرقاء بنفسجية (حزيران - يونيو) تنتظم

في دورات متقاربة.

الجزء الطبي: الأطراف المزهرة

المواد الفعالة: ثيمول، لاكتون زيت عطري يحتوي على ستيرويدات Sitosterol, Beta:

وتربينات ثلاثية Ursolic Acid * Triterpene مواد تيربينية ايرودية

وإحدى **Geraniol** **وإحدى** **Nepetaside** * **Iridoid** **وسيسكوثيربينية**

.Caryophyllene,Beta: * Farnesene,Beta:

الأثر الطبي: مضاد للتشنجات، طارد للرياح، هاضم، شاف للجروح. مدر للبن، للهلوسة

وَألم المعدة وومدر للطمث كما يستخدم لإضرابات النوم.

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

N. nepeta

N. cataria

N. faassenii

N. mussinii

N. neverosa

N. sibirica



(185)

الاينتي

الاسم اللاتيني: *Oenanthe sarmentosa* L.

الاسم الإنكليزي: *Oenanthe*

الأسماء الأخرى: مشفيل

العائلة: الخيمية *Apiaceae*

موطن النبات: شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نبات عشبي ارتفاعه واحد متر، يفضل العيش في الماء، الأوراق ذات وريقات تشبه أوراق الكرفس، الأزهار خيمية في نورات بيضاء اللون، الجذور لحمية.

الجزء الطبي: الجذور

المواد الفعالة: غير معروفة

الأثر الطبي: غير مدروسة

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

O. aquatica

O. fistulosa

O. pimpinelloides



(186)

الاخدرية

الاسم اللاتيني: *Oenothera biennis* L.

الاسم الإنكليزي: Wild Evening Primrose, Kings Cure-All

Onagre Primrose, Tree

الأسماء الأخرى: أخدرية، حشيشه الحمار، رأس الجاموس، انغرا.

العائلة: الاخدريات Oenotheraceae

موطن النبات: حواف الطرق والمنحدرات في أوروبا ثم انتشر إلى الوطن العربي.

الوصف النباتي: نباتات ثنائية الحول ارتفاعها 120 سم، الأوراق موبرة بسيطة أو متعاقبة حاضنة بيضيه، الأزهار صفراء بتلاتها كبيرة، الجذر لحمي احمر اللون.

الجزء الطبي: الجذور

المواد الفعالة: مادة لعابية، فيتوسول، تانين. مواد دهنية Linoleic Acid وتربينات ثلاثية

Amyrin, Alpha: مواد فلافينويدية Catechin, (+): ستيرويدات

Campesterol

الأثر الطبي: للحمى، للسعال الديكي، للروماتزم، منق للدم، مضاد للتشنج، مهدئ ولبخه للنزيف ومرهم للإلتهابات الجلدية.

الملاحظات: * يطلق عليها في أوروبا نجمة المساء لأنها تتفتح ليلاً
* أنواع أخرى لنفس الجنس

O. odorata

O. speciosa



(189)

أسد العدس

الاسم اللاتيني: *major Orobanche*

الاسم الإنكليزي: Broom-rape

الأسماء الأخرى: هالوك ريحي، أسد الزعتر، جعفيل.

العائلة: الأوروبانجية *Orobanchaceae*

موطن النبات: مراعي شرق وجنوب البحر الاحمر

الوصف النباتي: نبات طفيلي، جذوره تلتصق مع ما يجاورها من نباتات وتنمو على ذلك

الساق كبيرة عفسية ارتفاعها 60 سم، الأوراق مدببة متقابلة متباعدة، الأزهار

كبيرة وردية.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: غير مدروسة

الأثر الطبي: مدر للصفراء، لعلاج مرض السرطان.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

O. alba

O. bulbosa

O. californica

O. cernua

O. cooperi

O. corymbosa

O. crenata

O. fasciculata

O. fasciculata

O. gracilis

O. hederæ

O. lavandulacea

O. pinorum

O. ramosa



O. ludoviciana

O. major

O. minor

O. uniflora

O. vallicola

(190)

شاي جاوا

الاسم اللاتيني: *Orthosiphon aristatus* Benth

الاسم الإنكليزي: Tea Jaoa

الأسماء الأخرى: شارب الهر

العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات منتصب معمر ارتفاعه 50 سم، الأوراق خضراء ملتوية حول الساق، الأزهار في شكل نورات ملتفة بيضاء.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: تانين، أملاح معدنية

الأثر الطبي: لعلاج الكلى والمفاصل، مفرغ للصفراء، خافض لكوليسترول الدم، مدر للبول.

الملاحظات: * نوع آخر لنفس الجنس *O. stamineus*

* تقطع الأوراق وتجفف وتعمل كالشاي الاعتيادي.



(193)

الجانسنغ

الاسم اللاتيني: *Panax schinseng*

الاسم الإنكليزي: Ginseng

الأسماء الأخرى: جنسينج، اليبروج، اللفاح

العائلة: الاراليات (الارالية) Araliaceae

موطن النبات: شرق آسيا.

الوصف النباتي: نبات مستديم، الأوراق مفردة مسننة، الأزهار بيضاء في نورة، الجذر متفرع يشبه جسم الإنسان.

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: مواد منبه، مواد مقوية، هرمونات.

الأثر الطبي: منشط جنسي، مثير للجنس، منشط للجسم، لعلاج مرضى سكر الدم.

الملاحظات: * الجنسنج في الصيدليات بأسم (جنسانا - كبسولات) لإزالة الضعف الجنسي.

* كلمة جنسنج تعني منشط، ويطلق عليه في الصين واليابان (روح الأرض)

و(حارس الشباب) ويقولون عنه كمركب المديم للحياة والراجع بالشيخ إلى

صباه.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

P. trifolius

P. quinquefolius

P. quinquefolium



(194)

زهرة الساعة

الاسم اللاتيني: *Passiflora incarnate* L.

الاسم الإنكليزي: Passion Flower, Passiflore

الأسماء الأخرى: زهرة الالام

العائلة: الالاميات Passifloraceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نباتات متسلقة ذات حوالق، الأوراق مسننة، الزهرة بنفسجية كبيرة جميلة المنظر، الثمار بيضاوية صفراء اللون بحجم البيضة.

الجزء الطبي: المجموع الخضري المجفف.

المواد الفعالة: تانين، لعاب نبات، فيتامين (C)، قلويد هارمين. قلويدات * Harman

* Indole Alkaloid * فلافينويدات * Orientin * Luteolin * تربينات

أحادية * Linalool مركبات بروتينية، Alanine * Glutamine

* Phenyl: ومركبات كاربوهيدراتية * Glucose .

الأثر الطبي: مخفف للألم، مضاد للتشنج، منوم، خافض للضغط، مهدئ للأرق ومنبهة ومضاد للمقصر.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

- P. apetala*
- P. caerulea*
- P. citrina*
- P. coccinea*
- P. colinvauxii*
- P. edulis*
- P. foetida*
- P. laurifolia*
- P. ligularis*
- P. lutea*
- P. mollissima*
- P. serratifolia*
- P. suberosa*
- P. subpeltata*
- P. tarminiana*
- P. tenuiloba*
- P. tripartita*
- P. vitifolia*



(197)

حشيشة القرعان

الاسم اللاتيني: *Petasites hybridus* L.

الاسم الإنكليزي: Butter-Dock, Langwort, Umbrella Plant

Petasite

الأسماء الأخرى: الباطاسيطس، سنج

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: بحيرات وجداول شمال إفريقيا

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها 50سم، الشمرخ مزهر وأوبر أجوف، مغطى بحراشف شقراء، الأوراق جذرية تظهر بعد الازهار، لها نصل كبير قلبي مقلوب خضراء رمادية، الأزهار وردية بنفسجية (آذار - مارس) أنبوية في رؤيسات تنتظم في سنبله طرفية كبيرة هرمية.

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: اينولين، راتنج، لعاب النبات، تانين. سيسكوتربين * Fukinanolide

* Senecionine قلويدات * Integerrimine * Petasin

* Senecionine مركبات دهنية * Lauric acid * Margarinic Acid

.*

الأثر الطبي: قابض، مدر للبول، مطمئ، طارد للبلغم، معرق، شاف للجروح. وفتح للشهية طارد للديدان ومرطب ولالتهابات الرئة.

الملاحظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس

P. albus

P. amplus

P. frigidus

P. hybridus

P. ovatus

P. paradoxus

P. spurius



(198)

شمار الخنازير

الاسم اللاتيني: *Peucedanum ostruthium* Koch

(*Selinum Ostruthium*, *Imperatoria Ostruthium*)

الاسم الإنكليزي: Master-wort و Imperatire

الأسماء الأخرى: بخور الأكراد، بوسيدان، بقلة الرئيس

العائلة: المركبة *Apiaceae*

موطن النبات: شرق البحر الأحمر

الوصف النباتي: نباتات عشبية حولية تتحول إلى معمرة، ارتفاعها متر، الساق كثير التفرع اخضر منتصب اسطواناني، الأوراق خضراء رخوة تشبه أوراق نبات الكرفس، الأزهار بيضاء (حزيران - يوليو)، تنتظم في خيمات مسطحة كبيرة، الثمرة صغيرة مجنحة خيمية، الجذر بني وتدي، محاط بحلقات فيه عصارة حليبية.

الجزء الطبي: الأوراق والجذر

المواد الفعالة: زيت عطري، راتنج، عنصر كومارين، امبراتورين، استروتين، اميتين،

استروتول، تانين، نشا. كيومارين *Imperatorin** *Auraptene**

Flavone,3-3'-4'-5-7- وفلافيونيد *Byakangelicin**

*Pentahydroxy: 3-(6"-O-ACETYL-BETA-D-Glucoside)**

*Peucenin * Chromone * Hesperidin* F* وكرمرون

الأثر الطبي: فاتح للشهية، طارد للبلغم، هاضم، معرق، مسكن، يخفف داء الشقيقة، علاج

للالتهابات الجلدية. يستعمل في الطب البيطري كمقوى ويستعمل كبديل للسكر

وكعلاج للملاريا

الملاحظات: * علاج للتسمم ولعضات الكلب.

* نوع آخر لنفس الجنس *P. palustre*



(201)

لسان الاوز

الاسم اللاتيني: *Pinguicula vulgaris* L.

الاسم الإنكليزي: Grassette

الأسماء الأخرى: حشيشه الدهن، حشيشه النجارين، لسان الوز

العائلة: اللسنيات Lentibulariaceae

موطن النبات: الينابيع في جبال شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: عشب نجمي معمر ارتفاعه 130 سم، الساق تحت أرضي قصير له شمراخ زهري دقيق وناعم، الأوراق لحمية صفراوية على شكل باقة قاعدية ملتصقة بالأرض بيضاوية، الزهرة بنفسجية أرجوانية (أيار - مايو) أفقية.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: تانين، لعاب النبات، سكريات، أنزيمات. فلافينويد * Scutellarein

Hypolaetin * وتربينات أحادية أيرودية Catalpol * Globularicisin *


*

الأثر الطبي: مضاد للتشنج، مهدئ للسعال، لانم للجروح، مقاوم للحمى. مضاد للمقصر والقيء.

الملاحظات: * النبات مفترس لصغار الحشرات، وتستطيع هضمها بعد ثلاثة أيام من أسرها، وقد اثبت فحص الأوراق أن في كل 1 سم² يبلغ عدد الغدد الهضمية خمسة وعشرين ألفا.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

- P. agnata*
- P. alpina*
- P. antarctica*
- P. caerulea*
- P. caudata*
- P. ehlersae*
- P. errerian*
- P. esseriana*
- P. grandiflora*
- P. leptoceras*
- P. longifolia*
- P. lusitanica*
- P. lutea*
- P. moranensis*
- P. primuliflo*



(202)

الصنوبر الحرجي

الاسم اللاتيني: *Pinus sylvestris*

الاسم الإنكليزي: Pin Slyvestre, Scotch Pine

Common pine

الأسماء الأخرى: أبو رأس احمر

العائلة: الصنوبرية Pinaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: شجرة كبيرة الحجم ارتفاعها 25 متر، مستديمة الخضرة، تتلون الأفرع بالأحمر، الأوراق أبرية قصيرة زوجية، الثمار مخروطية بنية متخشبة.

الجزء الطبي: البراعم

المواد الفعالة: زيت عطري 65%، مركبات فينولية، أحماض عضوية، راتنج. تربينات

أحادية Borneol* Cymol,Para:* وثنائية Abienol,ISO:* وسيسكوترابين

3-Beta-Acetoxy:* Biformene,Trans: وفلافيونيد

Bicyclogermacrene Cadinene,Alpha:* وولجان

Prodelphinidin* Aromadendrin,C-6-O-7-dimethyl و

Benzofuran-5-Propanol,2-3-Dihydro-2-(4'-Hydroxy-3'-

Methoxy-Phenyl)-3-Hydroxy-Methyl-7-Hydroxy واستيرويد

Stigmasterol * و Pinosylvin-3-O-Methyl Ether * Stilbene

*

الأثر الطبي: لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، مدر للبول والعرق، علاج للروماتزم. السعال

وطارد للديدان للنقرس والروماتيزم وطارد للبلغم.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

P. albicaulis

P. aristata

P. attenuata

P. balfouriana

P. banksiana

P. canariensis

P. cembroides

P. contorta

P. coulteri

P. densiflora

P. edulis

P. elliottii

P. flexilis

P. flexillis

P. glabra

P. halepensis

P. jeffreyi

P. koraiensis

P. lambertiana

P. leucodermis

P. longaeva



(205)

دلب

الاسم اللاتيني: *Platanus occidentalis*

الاسم الإنكليزي: Buttonwood, Occidental

الأسماء الأخرى: صنار اجنار

العائلة: الدلبيات Platanaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: أشجار كبيرة ارتفاعها 35 متر، الأوراق متساقطة خماسية أو سباعية التفصيص، الثمار كروية لها رؤوس مدببة.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: تانين، أنزيمات، فيتامينات.

الأثر الطبي: قابض، لائم للجروح، علاج للإسهال المزمن. لتسهيل الولادة ومسببه للإجهاض.

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

P. acerifolia

P. racemosa



(206)

الحشيشة الرصاصية

الاسم اللاتيني: *Plumbago europaea*

الاسم الإنكليزي: Tootheort, Lead Wort

Loud-wort

الأسماء الأخرى: حشيشة الأسنان

العائلة: الرصاصيات Plumbaginaceae

موطن النبات: شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها متر، الأوراق معنقة أو ذينية نصلها جامد، النسيج مسنن الحافة عابق الخضار، الأزهار عريضة بنفسجية (حزيران - يونيو)

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: تانين، اوكلالات كينويد* Plumbagin وكروتينويد* Carotene

وفلافيينويد Europetin-3-O-Alpha-L-Rhamnoside

الأثر الطبي: معالجة الجرب، معالجة حكة الجلد. والأورام السرطانية مدر للبول ولتسهيل التنفس وللقرحة والأسهال.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

P. ariculata

P. auriculata

P. capensis

P. scandens

P. zeylanica



(209)

خاتم سليمان

الاسم اللاتيني: *Polygonatum officinale* Desf

الاسم الإنكليزي: Sceau Salomon

الأسماء الأخرى: عقدا، كثير العقد.

العائلة: الكونفارية Convallariaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها 50 سم، الساق أجرد منتصب مقوس، الأوراق متعاقبة ومنتصبة بيضاوية منتظمة في صفين متقابلين، الأزهار بيضاء موشحه بالأخضر (نيسان - ابريل) متدلية، الجذر لحمي ليفي كثير العقد.

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: صابونين، موسيلاج، اوكرلات الكالسيوم.

الأثر الطبي: محلل لدم، خافض للسكر، تزيل البقع من الوجه، لاثم للجروح.

الملاحظات: * في كل عام يظهر جذر جديد يختفي قبل حلول الشتاء مخلفاً ندبة إضافية شبيهة بأثر الخاتم في الأصبع.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

P. commutatum

P. multiflorum



(210)

أضراس الكلب

الاسم اللاتيني: *Polypodium vulgare*

الاسم الإنكليزي: Female Fern, Common Polypody, Root, Fern

Polypode commun

الأسماء الأخرى: كثير الأرجل الشائع، بسفايج

العائلة: السرخسيات Polypodiaceae

موطن النبات: أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها 50 سم، المقلاع ملتفا على شكل قوس متطاوول فوق الجذر يحتوي 30 جزءاً سنانياً، أكياس البوغ زنيديّة مائلة إلى الأصفر، الجذر أفقي سميك لحمي مداد مغطى بحراشف شقراء خضراء.

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: دهنيات، تانين، راتنج، صابونين، لعاب نبات، أملاح معدنية. تريبنات ثلاثية

Cryptoxanthin, Beta: و كارتينويد Serratene* Cycloartanol *

* قلويدات واستيرويد Abutasterone وفلافيونيد Catechin-7-O-D-

Apioside *

الأثر الطبي: مفرغ للصفراء، طارد للبلغم، مسهل، طارد للديدان. الم المعدة و للسعال، مدر للطمث.

الملاحظات: * طعم الجذر يشبه طعم جذر السوس.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

P. aureu m
P. billardieri
P. crassifolium
P. decumanum
P. pellucidum
P. percussum
P. polycarpon



(213)

صند هندي

الاسم اللاتيني: *Pterocarpus officinalis*

الاسم الإنكليزي: Kinos

الأسماء الأخرى: كينو

العائلة: البقولية Fabaceae

موطن النبات: الهند.

الوصف النباتي: أشجار شاهقة، الأوراق مركبة صغيرة عديدة لامعة خضراء، الأزهار في

عشكول بيضاء موشحه بالوردي، تتحول إلى قرنات فيها عدة بذور، الجذر

عصاري.

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: الراتاني، لعاب نباتي، تانين

الأثر الطبي: لعلاج اضطراب الحنجرة، قابض

الملحوظات: * عقار (Malay medicine) مستخرج من جذور هذه الشجرة يستخدم في

علاج الإسهال والدوسنتاريا.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

P. acapulcensis

P. echinatus

P. rohrii



(214)

زهرة الربيع

الاسم اللاتيني: *Primula veris* L.

(Primula Officinalis)

الاسم الإنكليزي: Rose, Butter Cowslips, Primrose

Paige و Cowslip

الأسماء الأخرى: زهرة الربيع المرجية

العائلة: الربيعيات Primulaceae

موطن النبات: أوروبا.

الوصف النباتي: عشبه معمرة ارتفاعها 25 سم، الشمرخ مزهر، الأوراق على شكل باقة بيضاوية خضراء، الأزهار جرسية صفراء فاقعة (نيسان - ابريل) متجمعة على شكل خيمة وحيدة فوق زند جذري اجرد، الجذر سميك.

الجزء الطبي: العشبة بأكملها

المواد الفعالة: صبغيات فلافونية * Flavone, 3'-4'-5'-Trimethoxy:

* Kaempferol-3-Gentiatrioside، ايتروزيدات، أنزيمات، صابونين،

أملاح معدنية، فيتامينات، بريموفرين. تربينات ثلاثية Primulasaponin

* 2 مواد كاربوهيدراتية Polysaccharides .

الأثر الطبي: مضاد للتشنج، مهدئ، مدر للبول، طارد للبلغم، مقاوم للحمى، مفيدة لعلاج الروماتزم. للسعال الديكي والصداع مهدئ ومنوم

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

P. acaulis
P. amethystina
P. angustifolia
P. auricula
P. bhutanica
P. boothii
P. burmanica
P. carniolica
P. daeionensis
P. darialica
P. denticulata
P. gaubeana
P. Integrifolia
P. parryi
P. redolens



P. Elatior
P. glutinosa
P. Laurentiana
P. patens
P. renifolia

P. Eximia
P. Halleri
P. marginata
P. primulina
P. rusbyi

P. Farinosa
P. Hirsuta
P. minima
P. pulcra
P. sonchifolia

(217)

أجاص

الاسم اللاتيني: *Prunus domestica* L.

الاسم الإنكليزي: Ameixas

الأسماء الأخرى: برقوق بستاني

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: غابات شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: أشجار ارتفاعها 6 أمتار، الأوراق كثيفة لامعة مفردة اهليلجية، الأزهار بيضاء خماسية البتلات، الثمار حمراء وسوداء.

الجزء الطبي: الثمار

المواد الفعالة: حامض السيانيد، جكلوسيد، حوامض عضوية فيتامينات، سكريات

الأثر الطبي: منق للدم، مقاوم للحمى، مسهل، منبه.

الملاحظات:

* الأنواع الأخرى للجنس *Prunus*

- P. melanocarpa*
- P. mexicana*
- P. minutiflora*
- P. mume*
- P. nipponica*
- P. padus*
- P. pennsylvanica*
- P. persica*
- P. rivularis*
- P. salicina*



(218)

البرقوق

الاسم اللاتيني: *Prunus spinosa* L.

الاسم الإنكليزي: Thorn, Black, Sloe Tree

Prunellier

الأسماء الأخرى: أجاص شائك، قراصيا

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: غابات شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: أشجار ارتفاعها 3 أمتار، الفروع منبسطة وبره، الأوراق خضراء معتمة صغيرة بيضوية مسننة، الأزهار بيضاء مبقعة بلون وردي (آذار - مارس) كثيرة العدد صغيرة، الثمرة عنبية زرقاء مسودة جرداء مغطاة بمادة شمعية بداخلها نواة كروية.

الجزء الطبي: الثمار

المواد الفعالة: تانين، ايتروزيدات، فيتامين(C).

سيسكوترابين * Vomifoliol * 3-Hydroxy: Ionone, Beta: فلافينويد

Coumarin, 5-Avicularin Catechin, EPI: (-): **

Hydroxy-6-METHOXY: 7-O-Beta-D-Glucoside *

الأثر الطبي: قابض، منق للدم، مدر للبول، مغذي، منشط. للدستاريا الأميبية وملين ولألام الاسنان والذن والظهر

الملاحظات: * يضاف بعض مدخني الغليون أوراقها المجففة إلى التبغ.

الأنواع الأخرى للجنس *Prunus*

- P. serotina*
- P. serrulata*
- P. subcordata*
- P. subhirtella*
- P. tenella*
- P. tomentosa*
- P. triloba*
- P. umbellata*
- P. virens*



(221)

زهرة الفصح

الاسم اللاتيني: *Pulsatilla vulgaris* Mill

(*Anemone Pulsatilla*)

الاسم الإنكليزي: Pulsatilla

Anemone Pulsatilla

الأسماء الأخرى: شقار الفصح، هواية، زهرة المشتري

العائلة: الشقيقية Ranunculaceae

موطن النبات: مراعي وحقول شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها لا ساق له، الأوراق على شكل باقة ورد فضية اللون مغطاة بالوبر، الأزهار بنفسجية أرجوانية (آذار - مارس).

الجزء الطبي: العشبة بكاملها

المواد الفعالة: انيمونين، أنزيمات، تانين، صابونين، استيرول، زيت. أستيرويدات

* Ecdysone, Beta: لاكتون * Protoanemonin فلافينويد

* Kaempferol * Quercetin تربينات ثلاثية *Anemone*

Pulsatilla Saponins

الأثر الطبي: مضاد للتشنجات، مدر للعرق، مدر للبول، طارد للبلغم، مهدئ، كمادات

لمعالجة الدوالي، معالجة المفاصل.

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

P. alpina
P. cernua
P. grandis
P. montana
P. patens
P. vernalis



(222)

العرموط

الاسم اللاتيني: *Pyrus malus*

الاسم الإنكليزي: Acuk

Quince-tree

الأسماء الأخرى: عرموط

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: شجرة معمرة ارتفاعها 6 أمتار، الأوراق بسيطة كاملة متقابلة بيضيه الشكل قلبية القاعدة، الأزهار خماسية بيضاء، الثمرة كروية أو شبه كروية مستطيلة، تحتضن عدة بذور.

الجزء الطبي: الثمار

المواد الفعالة: فيتامينات، أملاح معدنية، تانين، بكتين، سكريات، جكلوسيد
الأثر الطبي: لعلاج عسر الهضم، للمصابين بالعلل الرئوية، لمعالجة الإسهال، طارد للغازات، يستخدم لبخة لعلاج تشقق الثدي والبواسير وقروح الفم. ضربة الشمس للسكري.

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

P. calleryana

P. calleryana

P. communis

P. melanocarpa

P. ussuriensis

P. malus

P. amygdaliformis

P. arbutifol



(225)

الراتانيا

الاسم اللاتيني: *Rauwolfia serpentine* L.

الاسم الإنكليزي: Ratanhia

الأسماء الأخرى: راولفيا، الجذر الثعбاني، الراوولفيا

العائلة: الدفلية Apocynaceae

موطن النبات: آسيا.

الوصف النباتي: شجيرات معمرة مستديمة الخضرة نموها قائم أو شبه مفترش، الأوراق بسيطة كبيرة متقابلة جالسة مسننة، الأزهار صغيرة بيضاء أو حمراء، الثمار عنبية بداخلها بذرة واحدة كروية الشكل.

الجزء الطبي: الجذور

المواد الفعالة: قلويد Reserpine و Alstonine

الأثر الطبي: علاج ضغط الدم العالي، يهدئ من التوتر العصبي الحاد، علاج الكوليرا. الملحوظات:

* في الهند تعالج مناطق لدغة الثعابين بجذور هذا النبات الذي يسمى عندهم (تشاندر)

* أنواع أخرى لنفس الجنس *R. vomitoria* و *R. densiflora*



(226)

النبق المسهل

الاسم اللاتيني: *Rhamnus cathartica* L.

الاسم الإنكليزي: Nerprun, Buckthorn Berries

الأسماء الأخرى: سويد، الكاسكارا، عوسج فارس، زفرين الجرد.

العائلة: السدریات Rhamnaceae

موطن النبات: غابات حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: شجيرة ارتفاعها 4 أمتار، الأوراق متقابلة مسننة، الأزهار خضراء ضاربة

إلى نحو الصفرة (نيسان - ابريل)، الثمرة لذيذ ثم مر.

الجزء الطبي: القشرة (اللحاء الخارجي)، الثمرة

المواد الفعالة: جليكوسيدات، مشتقات انثرائين Anthracenes * Polycyclic ، كيونويد

Chrysophanic Acid * فيتامين (C)، بروتين * Protein * Proteid *

مواد كاربوهيدراتية * Pectin فلافينويد Catharticin * Flavonol ايمودين

Emodin-8-O-Beta-Primveroside * كرومون * Chelidonic Acid *

Chromone *

الأثر الطبي: منق للدم، مدر للبول، مسهل، مفرغ، يفيد في علاج الكبد والطحال والسرطان.

الملحوظات: * يستخدم خشبه في صنع المنحوتات

* أنواع أخرى لنفس الجنس

- R. alnifolia*
- R. betulifolia*
- R. californica*
- R. caroliniana*
- R. cathartica*
- R. crocea*
- R. frangula*
- R. globosus*
- R. ilicifolia*
- R. insula*
- R. lanceolata*
- R. parvifloras*
- R. purshiana*
- R. rubra*
- R. saxatilis*
- R. tomentella*



(229)

الخروع

الاسم اللاتيني: *Ricinus communis* L.

(*Croton spinosa*)

الاسم الإنكليزي: Castor oil Bush, Castor Oil Castor Bean

الأسماء الأخرى: اسبقار، وسبار، طمرا، سباء، ويذانجيل.

العائلة: الحليبية (السوسبية) (البنية) (اليتويعيات) (الفربيونيات) Euphorbiaceae

موطن النبات: أنحاء الوطن العربي

الوصف النباتي: شجيرة معمرة دائمة الخضرة، الأوراق كبيرة الحجم مفصصة راحية لها

أعناق طويلة وحواف مسننة، الأزهار في نورات قمعية عنقودية، الثمرة خضراء

عليها زوائد كثيرة، البذور قصيرة صدفية بنية اللون.

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: زيت (40-70 %) قلويدات Ricin , Ricinine , Phytotoxin resin

قلويدات * Ricinine * مواد بروتيينية * Glutamic ACID * Ricin E *

مركبات نتروجينية * Chlorophyll B مركبات كبريتية Diethylene

GLYCOL Disulfide ستوريدات * Brassicasterol تربينات ثنائية

* Casbene تانين Geraniin * Furosin ومواد كاربوهيدراتية

* Galactinol

الأثر الطبي: زيت الخروع مسهل غير عنيف ولكنه سريع التأثير، لمعالجة البواسير، لعلاج

النزلات الصدرية. مدر للبلن وطارد للديدان ولتساقط الشعر.

الملحوظات: * الزيت يستخدم لإغراض التشحيم والإضاءة والطباعة والشامبو ومواد التجميل

ولأغراض الطبية



(230)

الحاذ الشوكي

الاسم اللاتيني: *Salsola kali* L.

الاسم الإنكليزي: Sea Grass, Salt Wort, Thistle,

Russian thistle

الأسماء الأخرى: خطمي كاذب

العائلة: الرمرامية (السرمدية) Chenopodiaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عشبي حولي ارتفاعه متر، الأوراق متبادلة تنتهي بشوكة ضعيفة، الأزهار وردية حمراء بشكل نورات سنبلية مؤلفة من عدة زهيرات (أيار - مايو).

الجزء الطبي: العشب بكاملها

المواد الفعالة: قلويد السالسولين، السالسوليدين، أملاح معدنية، بروتين، دهنيات. قلويدات

Rhamnetin, Iso: 3-O-Beta-D- فلافينويد Salsolidine *

Rhamnetin, Iso: 3-O-Rutinoside * لاكتونات Glucoside

Flavonol * Pyrone, 2: 4-6-Dicarboxylic Acid وستيرويدات

Estrone *

الأثر الطبي: خافض للضغط، مضاد للتشنج، مدر للبول، طارد للديدان، طارد للرياح. مدر للطمث مدر للبول ملين.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

S. iberica

S. paulsenii

S. soda

S. species

S. tragus



(233)

شافية

الاسم اللاتيني: *Sanicula europaea* L.

الاسم الإنكليزي: Wood Sanicle, Sanikel

Wood-march

الأسماء الأخرى: السكسب الأوربي، سكب العرب، عشب القديس لوران

العائلة: الخيمية Apiaceae

موطن النبات: الغابات في شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر، ارتفاعه 50 سم، الساق منتصب دقيق، الأوراق خضراء

لامعة راحية مقطعة قاعدية التواجد، الأزهار بيضاء وردية (أيار - مايو) صغيرة

على شكل خيمة، الجذر بني كثير العقد ليفي.

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: صابونين، تانين، زيت عطري. فلافينويد * Rutin قلويدات * Allantoin

وتربينات ثلاثية * Saniculoside D

الأثر الطبي: قابض، مفيد للسعال، لعلاج البواسير، لائم للجروح، منظف، ولعلاج الإسهال

والدسنتاريا والم الطمث والتقرحات.

الملاحظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس

- S. arctopoides*
- S. arguta*
- S. bipinnata*
- S. bipinnatifida*
- S. canadensis*
- S. crassicaulis*
- S. europaea*
- S. graveolens*
- S. gregaria*
- S. laciniata*
- S. maritima*
- S. peckiana*
- S. saxatilis*
- S. smallii*
- S. tuberosa*



(234)

الصندل الأبيض

الاسم اللاتيني: *Santalum album* L.

الاسم الإنكليزي: White Sandal, Sandalwood, East India

Sandal wood

الأسماء الأخرى: صندل

العائلة: الصندليات Santalaceae

موطن النبات: جنوب شرق آسيا.

الوصف النباتي: شجرة دائمة الخضرة، شبه متطفلة على الأشجار الأخرى، ارتفاعها 5 أمتار

الجزء الطبي: الخشب عند عمر 30 سنة.

المواد الفعالة: زيت طيار مائل إلى الاصفرار فاتح سميك القوام لزج يحتوي مادة السنتالين.

تربينات أحادية* Santenol Limonene,(+): سيسكوتربين

* Bergamotenone, Curcumene مواد بروتينية * Alanine وقلويدات

* Spermidine, Pyrrole, 1-Furfuryl و مواد دهنية * Oleic Acid

الأثر الطبي: علاج الحمى، لعلاج الإسهال، تقوية الناحية الجنسية، مطهر للأغشية المخاطية. قاتل للحشرات مهدئ مسبب للإجهاض.

الملاحظات: * يفضل في صناعة التحف الخشبية الثمينة وأخشاب المعابد الدينية.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

S. ellipticum

S. freycinetianum

S. haleakalae



(237)

فول العرب

الاسم اللاتيني: *Saponaria vaccaria*

الاسم الإنكليزي: Cow-herb

الأسماء الأخرى: عشب البقر

العائلة: القرنفلية Caryophyllaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عشبي ارتفاعه 50 سم، الأوراق بسيطة متقابلة، الأزهار وردية (حزيران - يونيو).

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: صابونين

الأثر الطبي: لعلاج الجروح والخراجات، مدر للطمث والحليب.

الملاحظات: * دغل ينمو في مزارعات مصر اسمه اللاتيني *Vaccaria oxydonta* يشبه

نبات *Saponaria vaccaria*



* هذه النبتة لم أجد لها معلومات في قاعدة البيانات التي أتعامل معها

(238)

بوقيه

الاسم اللاتيني: *Sarracenia minor*

الاسم الإنكليزي: Indian cup

الأسماء الأخرى: أم الأبواق

العائلة: البوقيات Sarraceniaceae

موطن النبات: أمريكا.

الوصف النباتي: نباتات عشبية، ارتفاعه 30 سم، الأوراق أكواب منتصبة على شكل أبواق جميلة الشكل مزخرفة الألوان، الأزهار واحدة شمراخية مستديرة الكأس عديدة البتلات بيضيه الشكل صغيرة الاسدية مظلية الميسم، الجذر معمر قرصي.

الجزء الطبي: الأوراق والجذر

المواد الفعالة: ساراسنين، راتنج، تانين ملونة احمر ارجواني تسمى (Alkaverdine).

فلافينويد Rhamnetin, ISO: 3-O-Galactoside * Foeniculin

FLAVONOL أيروديات سيكرويدية Sarracenin * Secoiridoid

Monoterpene *

الأثر الطبي: مدر للبول، علاج للجذري

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

S. alabamensis

S. alata

S. flava

S. jonesii

S. leucophylla

S. oreophila

S. psittacina

S. purpurea

S. rosea



(241)

اسقيل

الاسم اللاتيني: *Scilla maritima*

الاسم الإنكليزي: Squill و Sea onion

الأسماء الأخرى: بصل العنصل، بصل الفار، اسقال، اسقيل، عنصلاء

العائلة: الهايسنتية Hyacinthaceae

موطن النبات: شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نبات حولي، الأوراق قرصية مستطيلة، الأوراق فردية التجميع قصيرة الزناد

سداسية البتلات زرقاء، البصلة كبيرة الحجم هرمية.

الجزء الطبي: البصلة

المواد الفعالة: سكريات، مواد هلامية، دكسترين، اوكزلات الكالسيوم، سيلانين، سيليبكرين،

سيللوتوكزين. مركبات قلبية * Cardenolide * Scilliroside وستيرويدات

* Steroid * Campesterol و مواد دهنية * Lipid * Palmitic Acid

الأثر الطبي: مدر للبول، مقو للقلب، طارد للبلغم، علاج للسعال والنزلات الشعبية.

مضاد للفيروسات.

الملاحظات: * له تأثيرات على القلب تشابه نبات (الديجيتال)

*نبات سام، الحذر في استخدامه

* أنواع أخرى لنفس الجنس

S. bifolia

S. seihei

S. siberica

S. siehei



(242)

عشبة البواسير

الاسم اللاتيني: *Scrophularia nodosa*

الاسم الإنكليزي: Water fig wort

الأسماء الأخرى: حشيشه الخنازير

العائلة: الخنازيريات Scrophulariaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط

الوصف النباتي: عشبة برية معمرة ارتفاعها 120 سم، الساق صلب ممتلئ، الأوراق بسيطة متقابلة بيضاوية مستدقة الرأس لها شكل القلب مسننة، الأزهار رمادية إلى مخضرة موشحه باللون الأحمر (حزيران - يونيو) صغيرة تنتظم في عتاكيل رخو، الثمرة بيضاوية ذات فلتتين، الجذر ضخم بني رمادي.

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: صابونين، جكلوسيد، حوامض، فيتامينات.

الأثر الطبي: منشط لإفراز الصفراء، لائم للجروح، منق للدم، مدر للبول، خافض للسكر.

الملاحظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس

- S. atrata*
- S. auriculata*
- S. californica*
- S. desertorum*
- S. juratensis*
- S. laevis*
- S. lanceolata*
- S. macrantha*
- S. marilandica*
- S. umbrosa*
- S. vernalis*



* هذه النبتة لم أجد عنها معلومات في قاعدة البيانات التي أستخدمها.

(245)

يقطوم

الاسم اللاتيني: *Sedum telephium*

الاسم الإنكليزي: Balsam, Frighten Bad Spirit Away,

Sedum

الأسماء الأخرى: الطيلافيون، حيون، حي عالم بري، بخور البربر

العائلة: المخلدات Crassulaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر ارتفاعه 50 سم، الساق منتصب قليل الفروع، الأوراق

متقابلة دوارة كروية مسننة، الأزهار أرجوانية أو بيضاء أو زرقاء (حسب النوع)

(حزيران - يوليو) متجمعة بشكل عذق.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: أملاح معدنية، تانين، سكريات. مواد كاربوهيدراتية *Sedum*

* Polysaccharide Nas-2 وفلافينويدات-3-O-Quercetin

Neohesperidoside-7-O-Alpha-Rhamnoside وخليط من

. Telephinone B * Misc Lactone اللاكتونات

الأثر الطبي: قابض، منظم، ملين، لائم للجروح. مضاد للإلتهابات.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

S. reflexum

S. rosea

S. spectabilis

S. stellatum

S. tephium

S. ternatum

S. villosum

S. weinbergii

S. wrightii

S. acre

S. album

S. anglicum

S. annuum

S. anopetalum

S. caespitosum

S. divergens

S. hintonii

S. lanceolatum

S. laxum

S. madrense

S. maximum

S. niveum

S. nuttallianum

S. obtusatum

S. oregonense

S. paradisum

S. pulchellum

S. radiatum



(246)

أنبوب الراعي

الاسم اللاتيني: *Sempervivum tectorum* L.

الاسم الإنكليزي: Live-For-Ever, Sengreen House Leek,

Marsh nut

الأسماء الأخرى: حي العالم، مخلدة السطوح، لحية جوبيتر، ايزون، خلود عنكبوتي،

العائلة: المخلدات Crassulaceae

موطن النبات: الجبال والصخور في شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر، ارتفاعه 30 سم، الشمراخ (الساق) مزهر ومنتصب لحمي

كثير الأوراق، الأوراق قاعدية على شكل باقة متراكبة متطاولة لها رؤوس

مستدقة، الأزهار وردية مثلثة بالأرجواني (حزيران - يوليو).

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: تانين، لعاب النبات، حامض الماليك والفورميك. فلافينويدات * Kaempferol

Myricetin * Gallocatechin, Epi: (-): * Astragalin *

الأثر الطبي: مضاد للتشنج، قابض، ملين، شاف للجروح، مسكن للألام الأسنان، مفيد لالتهاب

الأذن، يزيل المسامير والثآليل. للإلتهابات مزيل للألم.

الملاحظات: * يزرع للزينة في الحدائق والبساتين.

* أنواع أخرى لنفس

الجنس

S. arachnoideum

S. arenarium

S. calcareum

S. ciliosum

S. leucanthum

S. mamoreum

S. montanum

S. tectorum



(249)

فجل الجمال

الاسم اللاتيني: *Sisymbrium officinale* L.

الاسم الإنكليزي: Hedge Mustard, Quemes, Relinchones

Sisymbrium

الأسماء الأخرى: السمارة، فقط بري، تودكري، قصيصة

العائلة: الصليبية Brassicaceae

موطن النبات: شرق البحر الأحمر

الوصف النباتي: نبات حولي ارتفاعه 50 سم، الساق صلب منتصب، الأوراق كثيرة التخريم لها فصوص مسننة، الأزهار صفراء شاحبة (أيار - مايو) صغيرة الحجم متجمعة على شكل عناقيد.

الجزء الطبي: الأطراف المزهرة

المواد الفعالة: مشتقات الكبريت * Sinigrin ، Glucosinolate, Iso-Propyl:

كاردينوليد وفلافيونيد * Glucocheirolin

الأثر الطبي: مهدئ للسعال، مدر للبول، طارد للبلغم، منشط. لإلتهاب الحنجرة.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

S. altissimum

S. irio

S. loeselii

S. orientale

S. sophia



(250)

صبرين

الاسم اللاتيني: *Smilax aspera* L.

الاسم الإنكليزي: Sarzaparrilla, Norza Cerrajuda

Salsepareille

الأسماء الأخرى: الفشاغ الأوربي، العشب الطيبة

العائلة: الصبرينية Smilacaceae

موطن النبات: شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر متسلق يرتفع إلى متر، الساق مزود بأشواك، الأوراق دائمة لامعة قلبية مبقعة بالأبيض، محاطة بأشواك، الأزهار بيضاء مخضرة (آب – أغسطس) خيمية تتحول إلى ثمرة عنبية حمراء اللون، الجذر خشبي طويل لونه رمادي.

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: جكلوسيدات (سرسابونين) سكريات، كولين، صابونين، تانين، أملاح معدنية.

كاردينولويد * Asperoside وصابونيات * Sapogenin * Asperin

ومركبات أكسوجينية حلقة * Tocopherol, Alpha:

الأثر الطبي: منق للدم، مدر للبول، معرق، علاج للسيلان، علاج للروماتزم، لعلاج الجرب وحصاوى الكلى والسكري والضعف العام.

الملحوظات: * تشير بعض المصادر إلى انه من العائلة الزنبقية (Liliaceae)

* أنواع أخرى لنفس الجنس

S. californica

S. ecirrhata

S. glauca

S. herbacea

S. jamesii

S. laurifolia

S. smallii

S. tamnoides



(253)

غبيراء برية

الاسم اللاتيني: *Sorbus aucuparia* L.

(*Pyrus Aucuparia*)

الاسم الإنكليزي: Rowan Berries, Mountain Ash

Sorbier

الأسماء الأخرى: غبيراء الصيادين، شجرة السمن

العائلة: الوردية Rosaceae

موطن النبات: غابات شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: أشجار صغيرة ارتفاعها 5 أمتار، الأوراق متقابلة كبيرة ريشية تضم وريقات

مسننة، الأزهار بيضاء (أيار - مايو) صغيرة عذقية، الثمار عنبية برتقالية اللون

ملساء، طعمها حلو- حامض.

الجزء الطبي: الأوراق والثمار

المواد الفعالة: حوامض الباراسوربيك والتفاحيك والليمونيك والتارتريك، تانين، سكريات،

فيتامين (C). تربينات ثلاثية * Amyrin,Alpha: * سيسكوتربين Absciscic

* Acid فلافينويد * (-): Catechin,Epi * Asozone كارتيينويد

* Carotene,Alpha: * وفيتامين E كاربوهيدرات * Sorbitol

* Carbohydrate وستيرويدات * Sitosterol,Beta:

الأثر الطبي: موقف للنزيف، قابض، مدر للبول. تستعمل كغذاء

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

S. americana

S. aria

S. californica

S. domestica

S. scopulina

S. sitchensis

S. suecica



(254)

حليان

الاسم اللاتيني: *Sorghum halepense*

الاسم الإنكليزي: Millet grass, Seibanmorokosi

الأسماء الأخرى: سفرندة، حشيش الفرس

العائلة: النجيلية Poaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط وشرق البحر الأحمر

الوصف النباتي: نبات عشبي حولي، ساقه ليفية منتصبه جامدة، الأوراق سنبلية متدلية، الأزهار

عنقودية عثكولية، الثمار حبوب مستديرة وسنابل، الإزهار (نيسان - ابريل).

الجزء الطبي: الأزهار

المواد الفعالة: نشويات، سكريات، فيتامينات، أملاح معدنية، حوامض، بكتين. تربينات ثلاثية

Trigonelline و مواد بروتينية Amyrin, Beta: *



الأثر الطبي: قابض، قاطع للنزف، قاطع

للإسهال. مدر للبول

لإلتهابات المجري البولية

الجزء السام: الأوراق

السمية: الحيوانات

أعراض التسمم: انتفاخ في البطن، إصابة

العين

العلاج: غسل الفم و غسل المعدة و

إعطاء السوائل مع الراحة

التامة

المواد السامة: Hydrocyanic،

Dhurrin

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس

الجنس



Sorghum halepense

Sorghum bicolor

Sorghum vulgare

Sorghum alnum

(257)

القسطران

الاسم اللاتيني: *Stachys officinalis* L.

(*Betonica Officinalis*)

الاسم الإنكليزي: Common Betony, Betonica Oficial

Betoiné

الأسماء الأخرى: بطونيقا، شاطرا، تبغ الحرس

العائلة: الشفوية Lamiaceae

موطن النبات: غرب وجنوب البحر الأحمر

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها 50 سم، الساق منتصب دقيق أحادي، الأوراق

خضراء بيضاوية الشكل محبة، الأزهار أرجوانية وردية (حزيران - يونيو)،

تنتظم في سنبله عند نهاية الساق.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: تانين، سكريات، صابونيات، كولين، بيتاين، زيوت. تربينات ثنائية

Reptoside * C * Betonicoside وتربينات أيرودية

Apigenin * Tricin,7-Methoxy: Harpagide,Acetyl: * فلافينويد

* مركبات بروتيني Arginine * Histidine أنثوسياندين

الأثر الطبي: فاتح للشهية، قابض، مقبئ، طارد للبلغم، معطس، شاف للجروح. منظم للدورة

الشهية للإلتهابات والأمراض الجلدية مدر للبول وللصرع والتشنجات.

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس



S. officinalis
S. palustris
S. pycnantha
S. recta
S. rigida
S. sieboldii
S. silvatica
S. sylvatica
S. tenuifolia
S. tournefortii

S. ajugoides
S. albens
S. arvensis
S. bullata
S. bullela
S. byzantina
S. byzantinia
S. chamissonis
S. coccinea
S. cooleyae
S. crenata
S. densiflora
S. germanica
S. macrantha
S. monnieri

(258)

قزازه

الاسم اللاتيني: *Stellaria media* L.

(*Stellaria Media*)

الاسم الإنكليزي: Starwort Chickweed *Stellariae Herba*

Morgeline

الأسماء الأخرى: النجمية، حشيشه القزاز، حشيشه العلق، كبين، منقار العصفور، أذان الفار.

العائلة: القرنفلية *Caryophyllaceae*

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: عشبه برية حولية مداده ارتفاعها 40 سم، الساق رخو على شكل باقة متسلقة، الأوراق جرداء كاملة متقابلة، الأزهار بيضاء على شكل نجمة (شباط - فبراير).

الجزء الطبي: عصارة النبات

المواد الفعالة: أملاح معدنية وبخاصة البوتاسيوم والسيليكون، صابونين. مواد دهنية

Docosanoic Acid, 2-Hydroxy: * *Behenic Acid* * *Lipid* *

أسترويدات * *Daucosterol* وفلافينويد *Apigenin, 6-8-Di-C-Hexosyl*:

* *Galactoside*. قلويد *Indole Alkaloid* *

الأثر الطبي: موقف لإفراز الحليب، مدر للبول، منشط، شاف للجروح، مسكن لآلام الروماتزم،

لعلاج الحكة والاكزيما. للأزما والتهابات الجهاز التنفسي طارد للبلغم ومغذي

ومقوي.

* أنواع أخرى لنفس الجنس *S. aquatica* *S. crispa*

S. graminea

S. holostea

S. jamesiana

S. littoralis

S. nemorum

S. nitens

S. obtusa

S. pallida

S. porsildii

S. pubera

S. umbellata



(261)

لبان الحاوي

الاسم اللاتيني: *Styrax benzoin*

الاسم الإنكليزي: Siam Benzoin, Jawi

Benjamin و Benzion

الأسماء الأخرى: الحاوي، الميعة، اصطرك، لبنى، حوز، العبهر

العائلة: الجاوية Styracaceae

موطن النبات: جنوب شرق آسيا ثم انتشر في شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: أشجار ارتفاعها مترين، الساق جوفاء مخططة، الأوراق خشبة مسننة، الأزهار بيضاء سداسية البتلات (آب - أغسطس)، الجذور سمراء غليظة.

الجزء الطبي: البلسم

المواد الفعالة: البلسم الزيتي، الراتنج يحتوي 40% من حامض البنزويك والسناميك. لجنان

* Pinoresinol

الأثر الطبي: مطهر لالتهابات الأوعية اللمفاوية، لعلاج نوبات السعال، لدهن الجلد الوهن تحت

الفرش، مدر للبول. وللأورام يستخدم في البخور

الملاحظات: * يحصل على الراتنج بإحداث شقوق في سيقان الشجرة فيسيل الراتنج عند قطعها وهي عصارة لزجة بيضاء تتحول إلى مادة صلبة قابلة للكسر.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

S. californicus

S. japonicus

S. officinalis

S. rediviva

S. redivivus



(262)

رأس الذئب

الاسم اللاتيني: *Succisa praemorsa* Gilib

الاسم الإنكليزي: Scabieuse

الأسماء الأخرى: البقنقومون، عضه الشيطان

العائلة: الدبساسيات Dipsacaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عشبي معمر، ارتفاعه واحد متر، الأوراق متقابلة ببيضاوية، الأزهار زرقاء بنفسجية (تموز - يوليو)، فيها رؤيسات معزولة كروية الشكل، لها قنابات عشبية، الجذر مبثور قرب ساق النبتة يميل إلى اللون الأسود.

الجزء الطبي: الرؤيسات والجذر

المواد الفعالة: سكايبوزيد، نشاء، أملاح معدنية، صابونوزيد، تانين.

الأثر الطبي: قابض، منق للدم، طارد للبلغم، هاضم، معرق، منشط، شاف للجروح.

الملاحظات: * كلمة *Succisa* تعني الجرب، لأنها استخدمت في القرون الوسطى علاجا للجرب والطاعون والسفلس.



(263)

أذن الحمار

الاسم اللاتيني: *Symphytum officinale*

الاسم الإنكليزي: GUM PLANT, CUMPHREY BLACKWORT,

Consound comfrey

الأسماء الأخرى: سمفوطن، السنفيتون، حشيشه الجرح، لسان البقرة

العائلة: الحمحميات Boraginaceae

موطن النبات: المستنقعات والاهوار والبحيرات في حوض البحر المتوسط

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها 75 سم، الساق جوفاء متفرعة مكسوة بشعيرات خشنة،

الأوراق ببيضاوية الشكل مغطاة بوبر خشن، الأزهار بيضاء ووردية تنتظم في

عناقيد لولبية متدلّية، الجذر اسود شكله يشبه الجزر.

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: تانين، زيت، سكريات، تربينات ثلاثية * Alpha-L-Arabinopyranosyl]:

قلويدات * Allantoin . مركبات كاربوهيدراتية Starch * C* Fructosan

* C استيرويدات * Cholesterol لجنان * Lithospermic ACID كاروتين

* Carotene, Beta: فلافينويد * Kaempferol وفيتامينات ب 1 وفيتامينات

وب 12 وفيتامين أ

الأثر الطبي: قابض، مهدئ للسعال، لائم للجروح، ملين، لعلاج الدوالي. مرطب للجلد

للإلتهابات ولانم لكسور العظام والسكري والم الدورة.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس *S. asperum* و *S. tuberosum*



(264)

الليك

الاسم اللاتيني: *Syringa vulgaris* L.

الاسم الإنكليزي: Common Lilac

الأسماء الأخرى: ليك

العائلة: الزيتونية Oleaceae

موطن النبات: حوض البحر المتوسط

الوصف النباتي: أشجار ارتفاعها 5 أمتار، الأوراق قلبية دائمة الخضرة، الأزهار بيضاء ووردية في نورات دوارة متجمعة.

الجزء الطبي: الأوراق والأزهار

المواد الفعالة: Syringo picrine و Glucoside وزيت عطري. تربينات أحادية

* Borneol Acetate * Jasminidine * وثلاثية * Ursolic Acid

* TRITERPENE * ولجنان Lariciresinol-4-O-Beta-D-

* Glucopyranoside * وايرودويد * Kingisidic Acid,8-Epi:

* Secoiridoid Monoterpene

الأثر الطبي: مقوي، علاج لداء المفاصل، مضاد للآلام العصبية، مهدئ، مسكن لعرق النسا
الملحوظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس

S. velutina

S. wolfii

S. julianae



(265)

قرنفل التوابل

الاسم اللاتيني: *Syzygium aromaticum*

(*Myrtus Caryophyllus*, *Caryophyllus Aromaticus*, *Eugenia Caryophyllata*, *Eugenia Caryophyllus*, *Eugenia Aromatica*)

الاسم الإنكليزي: Cloves

الأسماء الأخرى: قرنفل

العائلة: الآسيات Myrtaceae

موطن النبات: جنوب شرق آسيا.

الوصف النباتي: شجرة دائمة الخضرة، الأزهار حمراء زاهية تشبه المسمار، له قاعدة اسطوانية.

الجزء الطبي: البراعم الزهرية

المواد الفعالة: زيت القرنفل 20%، تانين 10%، تربينات ثلاثية * Crategolic Acid

Tسيسكوترينين * Cadinene, Gamma: وتربينات أحادية

Dieugenol, Dehydro: ولجنان * Geranial Cuminaldehyde

ستيرويدات* Campesterol-3-O-Beta-D-Glucoside تانين

Ellagitannin * Casuarictin * Galloyl-Glucose, 2-3-Di-O: *

وكيومارين * Ellagic Acid كرومونات * Biflorin, ISO:

الأثر الطبي: طارد للغازات، يساعد على الهضم، مسكن موضعي للأسنان. مركبات التجميل،

للملاريا إلتهابات الحنجرة وكعلاج للفطريات وللوحم Morning Sickness.

عند الحمل وللروماتيزم ولسعات الحشرات.

الملاحظات: * يستخدم كتوابل في عمل الحلوى والمشروبات والمخللات.

* اسمه العلمي القديم *Eugenia caryophyllata*

* أنواع أخرى للجنس

Syzygium

S. aromaticum

S. jambos

S. malaccense

S. sandwicensis



(266)

القطيفة

الاسم اللاتيني: *Tagetes erecta* L.

الاسم الإنكليزي: Lemon Marigold , Marigold, African, Marigold

الأسماء الأخرى: قطيفة

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: المكسيك ثم انتقل إلى الوطن العربي

الوصف النباتي: نباتات عشبية حولية صيفية ارتفاعه 100 سم، الأوراق ريشية مركبة مكونة

من 11-13 ورقة مسننة، الأزهار نورة مركبة تتكون من زهرات أنبوية في

الوسط ملونة بالأصفر والبرتقالي، البذور كبيرة الحجم كلوية مجعدة.

الجزء الطبي: النورات

المواد الفعالة: الزانثوفيل، الكاروتينات، فيتامينات ج، زيوت متطايرة. كارتينويد

Flavoxanthin، فلافينويد Kaempferol-7-O-Rhamnoside ، تربينات

أحادية، Limonene ومواد كاربوهيدراتية Mannitol

الأثر الطبي: الزيت يدخل في صناعة الروائح ومستحضرات التجميل والصابون، الزيت أيضا

لإكساب الطعام رائحة ولون وطعم متميز، الأزهار مدر للبول، طاردة للغازات،

يعالج أمراض الجهاز التنفسي، والبرد وأمراض العيون والمغص المعوي وعسر

الهضم وعلاج الحروق والبثور والخراجات. والصداع، مدر للطمث طارد

للحشرات مقوي عام وخافض لدرجة الحرارة.

الملاحظات: * من أجمل زهور القطف الصيفية.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

T. lemmoni

T. lucida

T. minuta

T. patula

T. tenuifolia



(269)

هندباء برية

الاسم اللاتيني: *Taraxacum officinalis*

الاسم الإنكليزي: Pissenlit

الأسماء الأخرى: الطرخشقون، العلت، مرير، خس بري

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نباتات برية معمرة ارتفاعها 50 سم، الأوراق على شكل باقة كثيفة جرداء طويلة مخرمة، الأزهار صفراء (آذار - مارس) تشكل رؤساً كبيراً فوق زند جذري طويل.

الجزء الطبي: الأوراق والجذر

المواد الفعالة: قلويد، زيت، اينولين، تانين، أملاح معدنية، فيتامينات.

الأثر الطبي: فاتح للشهية، منشط للصفراء، منق للدم، مدر للبول، مسهل، هاضم، منشط.

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

T. californicum

T. officinale

T. palustre

T. rubicundum



(270)

زرنب

الاسم اللاتيني: *Taxus baccata* L.

الاسم الإنكليزي: Irish Yew/European, Common Yew

الأسماء الأخرى: شرب الغشاع، هدس، سرو تركستان، أرجل الجراد، طقسوس، ريحان ترجاني.

العائلة: الطقوسية (الطقسوسيات) Taxaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: شجرة ارتفاعها 15 متر، اللحاء الخارجي للساق أحمر، الأغصان تتدلى إلى الأسفل، الأوراق مبسطة، الأزهار المذكرة صفراء صغيرة عند قاعدة الورقة والأزهار المؤنثة خضراء على سوق صغيرة، الثمار عنبية حمراء وفي داخلها بذرة سوداء.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: راتنج، تانين، زيت سيسكوثيربين

، Ginkgetin ، فلافينويد Absciscic Acid

، Inositol, O-Methyl مواد كاربوهيدراتية

ولجنان Lariciresinol وستيرويدات

Ecdysone, Beta:

الأثر الطبي: علاج أمراض الفم، مطمئ، مقو للقلب

مسبب للإجهاض مدر للبول وسم للأسماك

الجزء السام: الأوراق والثمار والقشرة

السمية: الإنسان

أعراض التسمم: ضيق في التنفس، اضطراب في القلب

العلاج: عمل تنفس اصطناعي مع الراحة التامة.

المواد السامة: Taxin , Taxine

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

T. brevifolia
T. canadensis
T. chinensis
T. cuspidata
T. media



(271)

الكاكاو

الاسم اللاتيني: *Theobroma cacao* L.

الاسم الإنكليزي: Cacao, Chocolate

الأسماء الأخرى: كاكاو

العائلة: الاستيركولية Sterculiaceae

موطن النبات: البرازيل وانتشر إلى غرب أفريقيا.

الوصف النباتي: شجرة ارتفاعها 5 أمتار، الأوراق خضراء كبيرة متساقطة، الأزهار ابطية

دائمة التجدد على مدار السنة، الثمار جرابيه صفراء أو حمراء عند النضج بداخلها

50 بذرة بنية.

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: دهن 50% (هو زيت الكاكاو)، قلويد 2%، كافيين. قلويدات

Alanine ،Carboline,Beta: 1-2-3-4-Tetrahydro: 1-Methyl

وكيومارين Aesculetin فلافينويد: (+)Catechin وأحماض دهنية

Arachidic Acid

الأثر الطبي: يستخدم كغذاء وعلاج للسعال، منشط، مدر للبول، مريح للجهاز العصبي، ملين

للبشرة مسبب لأمراض الشرايين وموسع للشعب.

الملاحظات: * يصنع منه الشيكولاته المعروفة، ويشرب مع الحليب، يضاف للمعجنات.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

T. bernoullii

T. bicolor

T. simiarum

T. speciosum



(272)

عفص

الاسم اللاتيني: *Thuja occidentalis* L.

الاسم الإنكليزي: Thuya و Arbor

الأسماء الأخرى: شجرة الحياة الشرقية، عفصية شرقية، العرعر، شجرة العفص.

العائلة: الصنوبرية (السرويات) Cupressaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: شجرة يبلغ ارتفاعها نحو عشرة أمتار، فروعها صاعدة، الأوراق قشور متراصة تغطي بعضها البعض كقرميد السطوح، رؤوسها الصنوبرية مقرنة.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: السيتون (روح العفص)

الأثر الطبي: طاردة للديدان، منق الدم، لخلع مسمار الرجل اللحمي (الثفن)، موقف للنزيف، مدر للبول، مهدئ، لعلاج الصدفية، الروماتزم، الفالول (الثآليل).

الجزء السام: رؤوس الأفرع

السمية: الإنسان

أعراض التسمم: تشنج العضلات، نزيف في الكبد، إجهاض للحوامل.

العلاج: غسل الفم وغسل المعدة و إعطاء السوائل مع الراحة التامة

المواد السامة: Thujon

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس *T. nrticuiiaia* , *T. plicata*



(273)

شرعوب

الاسم اللاتيني: *Tordylium officinalis*

الاسم الإنكليزي: Hartwort

الأسماء الأخرى: ساسالي، كشيم، بقل

العائلة: الشرعوبية Plumbaginaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عشبي بري حولي، الأوراق معنقة متعاقبة كثيرة التشقق، الأزهار بيضاء في خيمة، الجذر وتدي.

الجزء الطبي: الجذور

المواد الفعالة: غير مدروسة.

الأثر الطبي: علاج الصرع، تسكين الصداع مدره للطمث.

الملاحظات: * تنتشر هذه الاعشاب في الحقول والمراعي في فصل الربيع





(274)

لحية التيس

الاسم اللاتيني: *Tragopogon pratensis* L.

الاسم الإنكليزي: Salsifis, Goat's Beard

الأسماء الأخرى: ذنب الخيل، طراغو بوغن

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نباتات برية ثنائي الحول، ارتفاعه 70 سم، الساق منتصب، الأوراق على

طول الساق ضيقة، الأزهار صفراء (أيار - مايو) على شكل رؤيسات منفردة،

الجذر وتدي مغزلي بني فاتح فيه لبن ابيض.

الجزء الطبي: الأوراق، الجذر

المواد الفعالة: سكريات، دهنيات تريبنات ثلاثية Lactuceryl, Alpha فلافينويد Luteolin

Quercetin ومواد كاربوهيدراتية Inositol

الأثر الطبي: منق للدم، مدر للبول، معرق، يزيل الكلف والنمش، مهدئ للسعال.

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

T. dubius

T. dubius

T. hybridus

T. longirostris

T. mirus

T. porrifolium

T. porrifolius

T. pratensis



(276)

القمح

الاسم اللاتيني: *Triticum aestivum* L.

(*Triticum Vulgare*, *Triticum Sativum*)

الاسم الإنكليزي: Wheat,

الأسماء الأخرى: حنطة، قمح، بر، فوم، غلة

العائلة: النجيلية Poaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط وهو اليوم يزرع في جميع أنحاء العالم.

الوصف النباتي: نبات عشبي حولي شتوي، الأوراق شريطية، له سنابل شامخة فيها الحبوب.

الجزء الطبي: الحبوب

المواد الفعالة: جكلوسيد، نشويات، دهنيات، أملاح معدنية، حوامض امينية، فيتامينات Biotin .

سيسكوترابين Ionone, Beta وتربينات ثلاثية Achilleol A وستيرويدات.

Campesterol-3-O-Beta-D-Glucoside

الأثر الطبي: غذاء، لعلاج الكلف وإعادة النضارة إلى البشرة، لعلاج النحافة وتقوية البدن، السنابل

تنظف المجاري البولية وتدر البول وتنقي الدم وتفتت الحصى. يخلط مع العرقسوس

والسدر لعلاج الأرق والاستقرار النفسي.

الملاحظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس

T. compactum

T. compositum

T. durum

T. monococcum

T. polonicum

T. spelta

T. turgidum



(277)

الزهرة الكروية

الاسم اللاتيني: *Trollius europaeus* L.

الاسم الإنكليزي: Common globe-flower و Upolín evropský

الأسماء الأخرى: ترواليلوس

العائلة: الشفوية Ranunculaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: عشبة برية ارتفاعها 50 سم، الأوراق خضراء، الأزهار قرصية كروية صفراء (أيار - مايو).

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: انيمونين، زيت، تانين

الأثر الطبي: مسهل، لزقا يفيد الروماتزم

الملاحظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس

T. chinensis

T. laxus



(278)

أبو خنجر

الاسم اللاتيني: *Tropacolum majus* L.

الاسم الإنكليزي: Inodian cress, Capucine

الأسماء الأخرى: الكبوسين الكبير، طرطور باشا

العائلة: الغرنوقيات (السلبونييات) Tropacolaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات ليفي مداد عارش عشبي ارتفاعها 3 أمتار، الأوراق قلبية مفردة، الأزهار صفراء برتقالية ولها ألوان أخرى حسب الأنواع، الجذر نحيل كثير التشعب.



الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: إيتيروزيد كبريتي، زيت عطري، فيتامين (C).

الأثر الطبي: فاتح للشهية، يسهل الهضم، يساعد على النوم، طارد للبلغم، مهدئ للسعال.

الملحوظات: * من نباتات الزينة الجميلة

* أنواع أخرى لنفس الجنس

T. azureum

T. brachyceras

T. peregrinum

T. polyphyllum

T. tricolor



(279)

الكمأة

الاسم اللاتيني: *Tuber album*

الاسم الإنكليزي: Kamah، Truffle

الأسماء الأخرى: الفقع، شجرة الأرض، بيضة الأرض، العسقل، نبات الرعد، قرحان.

العائلة: التيرفزية Tuberaceae

موطن النبات: شرق البحر الأحمر

الوصف النباتي: نوع من النباتات الفطرية، تنبت تحت سطح الأرض على أعماق متفاوتة ما

بين 2-50 سم، ولا يظهر شيء من أجزائها فوق الأرض، ليس لها ورق أو زهر

أو جذر تنبت في المناطق الصحراوية والبيئات الرملية وهي ذات أشكال كروية أو

شبه كروية، ورخوة لحمية الملمس، يتدرج لونها من الأبيض إلى الرمادي والبني

والأسود لها رائحة نفاذة.

الجزء الطبي: الدرنات

المواد الفعالة: 60 % هيدرات الكربون، 7 % دهون، 4 % ألياف، 18 % مواد

بروتينية 9%، نشويات وسكريات 13%، وتم التعرف على 17 من الأحماض

الأمينية في بروتينات الكمأة.

الأثر الطبي: مجدد للحوية، لعلاج المرضى المصابين بالرمد الحبيبي أو التراخوما.

الملاحظات: تنبت بعد سقوط الأمطار وحدوث الرعد. تكثر في السنوات الماطرة وخاصة إذا

كان المطر غزيراً أول الشتاء، حجمها يختلف ما بين الحمصة وحتى البرتقالة ولها

رائحة عطرية، يستدل على وجود الكمأة بوجود نباتات الرقوق والارفة والجريد

بالقرب منها.



(280)

شابق

الاسم اللاتيني: *Turnera panamensis*

الاسم الإنكليزي: Damiana

الأسماء الأخرى: زداغ شابق، دميانا

العائلة: الزداعيات Turneraceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نباتات عشبية لها سيقان مزغبة له غدد دهنية، الأوراق معنقة متعاقبة غددية مسننة، الأزهار صفراء مفردة خماسية البتلات.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: تانين، زيت، راتنج

الأثر الطبي: مقوي، مدر للبول

الملاحظات: * نوع آخر لنفس الجنس *T. ulmifolia*



(281)

حشيشة السعال

الاسم اللاتيني: *Tussilago farfara* L.

الاسم الإنكليزي: Colts foot, Foal's-Wort, Horse-Hoof

الأسماء الأخرى: فيخيون، رجل الحمار

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: جبال شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها 25 سم، الأوراق على شكل وردة عريضة سميكة مضلعة مسننة، الأزهار صفراء ذهبية (شباط - فبراير) على شكل رؤيسات منفردة، الجذر لحمي طعمه مر.

الجزء الطبي: العشبة بكاملها

المواد الفعالة: تانين، ابنولين، صبغات، أملاح معدنية مواد كاربوهيدراتية Mucilage وفلافينودية Kaempferol * Flavonol وتربينات ثلاثية Lupeol ،

الأثر الطبي: ملطف، مهدئ، منق للدم، طارد للبلغم، معرق، مضاد للسعال خافض للحرارة ولالتهابات المثانة.

الملحوظات: * تحسن الصوت وتطرد السعال ومن هنا جاء اسمها.

* تستخدم أوراقها في صناعة سيجائر خاصة بدون نيكوتين.



(282)

السندب

الاسم اللاتيني: *Utricularia vulgaris*

الاسم الإنكليزي: Bladder-wort

الأسماء الأخرى: أبو حلاوة

العائلة: اللسنيات Lentibulariaceae

موطن النبات: البحيرات والاهوار في شرق البحر الأحمر

الوصف النباتي: نبات عشبي بري مائي، ساقه شمراخية، الأوراق مركبة، الأزهار عنقودية التجمع لونها (حسب النوع) بيضاء أو صفراء أو حمراء أو زرقاء.

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: تانين، زيت، أملاح عضوية.

الأثر الطبي: مدر للبول، لائم للجروح، قابض.

الملاحظات: أنواع أخرى لنفس الجنس

U. alpina
U. calycifida
U. cornuta
U. gibba
U. inflata
U. intermedia
U. macrorhiza
U. major
U. minor
U. ochroleuca
U. radiata
U. subulata
U. vulgaris



*هذه نبتة لم أجد عنها معلومات في قاعدة البيانات المستعملة

(283)

عرق الذهب

الاسم اللاتيني: *Uragoga ipecacuanha*

الاسم الإنكليزي: ipecacuanhu

الأسماء الأخرى: عرق الذهب المخزني

العائلة: Rubiaceae البنية

موطن النبات: شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: نبات عشبي ليفي صغير، ارتفاعه 40 سم، الساق منتصب، الأوراق متقابلة معنقة كاملة، الأزهار عنقودية التجميع أو تاجية الارتكاز، الثمار جلدية يابسة، الجذر متشعب ملتف ذو عقد ظاهرة.

الجزء الطبي: الجذر

المواد الفعالة: إيميتين، سيفلين، صابونين.

الأثر الطبي: لعلاج الإسهال المزمن، مقى، مضاد للامبييا

الملاحظات: * تستخدم الجذور وهي يابسة.



(284)

عنب الدب

الاسم اللاتيني: *Vaccinium myrtillus* L.

الاسم الإنكليزي: Blue Berry, Myrtile Burren Myrtle

الأسماء الأخرى: الاويس، عنب الاحراج

العائلة: الخلنجيات Ericaceae

موطن النبات: جبال شمال أفريقيا

الوصف النباتي: شجرة ارتفاعها 50 سم، سيقانها كثيرة التفرع، الأوراق خضراء متساقطة بيضاوية مسننة، الأزهار وردية (نيسان - ابريل) الثمرة عنبية كثيرة العصارة لونها اسود بنفسجي، فيها بذور كثيرة، الجذور تكون شبكة كثيفة.

الجزء الطبي: الأوراق والثمار.

المواد الفعالة: صبغات، أملاح معدنية، تانين، حوامض، فيتامين (A و C) تربينات أيرودية

Myrtine, EPI: * Quinolizidine وقلويدات Asperuloside * Iridoid

Alkaloid تربينات احادية * Nerol وستيرويدات Stigmastan-3-Beta

OL* وكيومارين * Scopoletin مواد كاربوهيدراتية * Glucose خليط من

اللاكتونات * Decalactone, Gamma: * وتربينات ثلاثية Cycloartenol

* وفلافينويدات * Catechin, (+) Anthocyanins, Astragalin

الأثر الطبي: مضاد للإسهال، موقف للنزيف، مطهر، خافض للسكر الإلتهابات وأمراض الباطنة وطارد للديدان.

الملاحظات: * تستخدم الثمار في عمل المربيات

* أنواع أخرى لنفس الجنس

- V. arboreum*
- V. caespitosum*
- V. calycinum*
- V. cespitosum*
- V. coccineum*
- V. corymbosum*
- V. hirsutum*
- V. myrtillus*
- V. occidentale*



(285)

عنبة

الاسم اللاتيني: *Vaccinium idaea* L.

الاسم الإنكليزي: Airelle

الأسماء الأخرى: عنبة حمراء، الحشيشة الحمراء، ايدا اريزا.

العائلة: الخنجيات Ericaceae

موطن النبات: جبال شمال أفريقيا

الوصف النباتي: نبات معمر ارتفاعه 30 سم، سيقانها نائمة مستديرة، الأوراق خضراء لماعة

بيضاوية مسننة، الأزهار وردية (أيار - مايو). الثمرة عنبة كثيرة العصارة لونها

احمر فيها بذور كثيرة، الجذور حامضة متفرعة.

الجزء الطبي: الأوراق والثمار.

المواد الفعالة: سكريات، تانين، حوامض عضوية، فيتامين (A و C)

الأثر الطبي: فاتح للشهية، قابض، منق للدم، مطهر، مدر للبول، خافض للسكر.

الملاحظات: * تستخدم الثمار في عمل المربيات والخل.

* الأنواع الأخرى لنفس الجنس

V. ovatum

V. oxycoccus

V. oxycoccus

V. parvifolium

V. reticulatum

V. stamineum

V. uliginosum

V. vacillans



(288)

الخروب

الاسم اللاتيني: *Vanilla planifolia* Andr.

(*Vanilla fragrans*, *vanilla mexicana*, *vanilla silvestris*,
vanilla vanilla, *epidendrum vanilla*)

الاسم الإنكليزي: Mexican vanilla

الأسماء الأخرى: الفانيليا

العائلة: الأركيدية Orchidaceae

موطن النبات: المكسيك.

الوصف النباتي: نباتات عشبية معمرة متسلقة، الساق اسطوانية طويلة 12 متر، الأوراق
بيضاوية متوازية جلدية، الأزهار صفراء مخضرة في نورات عنقودية صغيرة،
الثمرة قرون اسطوانية خضراء، لها جذور هوائية.

الجزء الطبي: القرون (الثمار)

المواد الفعالة: فانيلين، تانين، رانتج. ستيرويدات: Cholesterol, 24-Methylene:

تربينات أحادية * Limonene وكيومارين * Coumarin ولاكتون

Hexalactone, Gamma: * Misc Lactone

الأثر الطبي: منعش، هاضم، مدر للصفراء، مقوي. لإضرابات الطمث ومجهض.

الملاحظات: * مادة الفانيليا، مادة بلورية بيضاء تستخدم في المعجنات والفطائر والحلوى.

* نوع آخر لنفس الجنس *V. phaeantha*



(289)

خربق

الاسم اللاتيني: *Veratrum album*

(*Veratrum Lobelianum*)

الاسم الإنكليزي: White Hellebore

Corn Lily, False Hellbore-Veratre

الأسماء الأخرى: خربق ابيض

العائلة: الزنبقية Liliaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط وشرق البحر الأحمر

الوصف النباتي: عشبة ارتفاعها نحو متر ونصف، وفي وسطها ساق طويلة تحمل في جزئها

الأعلى أزهارا بيضاء بمجموعات شبه سنبلية، تحيطها أوراقا مخطط معينية كبيرة

في الأسفل وصغيرة في الأعلى.

الجزء الطبي: العشبة بكاملها

المواد الفعالة: قلويدات *cylopamine* - قلويدات ستيرودية * *Germitetrine*

* *Veracintine Steroid Alkaloid* ومواد فلافينودية * *Quercetin*

* *Flavonol Luteolin* * *Flavone*

الأثر الطبي: يستخدم في الطب اليوناني كمانع للحمل مجهض ومدر للطمث. كما يستعمل مبيد للحشرات.

السمية: الأغنام، أعراض السمية تتضمن دوران وطمام وإستفراغ وضربات زائدة في القلب وتتم المعالجة بواسطة علاج الأعراض أو استخدام الاتروبيين في العلاج.

أعراض التسمم: اضطرابات في الجهازين الهضمي والعصبي.

العلاج: غسل الفم و غسل المعدة و إعطاء السوائل مع الراحة التامة

الملاحظات: * أنواع أخرى لهذا الجنس

V. californicum

V. fimbriatum

V. insolitum

V. nigrum

V. tenuipetalum

V. viride

V. woodii



(290)

زهرة الحواشي المائية

الاسم اللاتيني: *Veronica beccabunga* L.

الاسم الإنكليزي: Horse Cress , Brook Lime, Pimpernel,

Beccabunga

الأسماء الأخرى: زهرية الماء

العائلة: الخنازيريات Scrophulariaceae

موطن النبات: ألمانيا.

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها 50 سم، سيقانها ممتددة لها جذور هوائية، الأوراق

متقابلة بنية مسننة ومستديرة، الأزهار بيضاء (أيار - مايو) تتجمع في عناقيد

صغيرة طرفية.

الجزء الطبي: الأطراف المزهرة

المواد الفعالة: تانين، راتنج، جكلوسيد -7-O-Beta-D-Scutellarein,4'-Methoxy:

* Glucoside. أيرويدات تربينية * Aucubin فلافينويدات * Cosmosiin

Flavone

الأثر الطبي: منق للدم، طارد للبلغم، مدر للحليب، هاضم، شاف للجروح. مدر للطمث مرطب

للجلد

الملحوظات: * تنمو في السواقي والترع والاهوار والمجاري

* أنواع أخرى لنفس الجنس

V. hederifolia

V. longifolia

V. officinalis

V. peregrina

V. persica

V. polita

V. repens

V. scutellata

V. serpyllifolia

V. spicata

V. teucrium

V. wormskjoldii



(291)

زهرة الحواشي

الاسم اللاتيني: *Veronica officinalis* L.

الاسم الإنكليزي: Veronique Betony, Paul's Heel,

الأسماء الأخرى: ويرونكة

العائلة: الخنازيريات Scrophulariaceae

موطن النبات: ألمانيا.

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها 30 سم، سيقانها صلبة، الأوراق متقابلة بنية وبره بيضاوية مسننة ومستديرة، الأزهار زرقاء بيضاء (أيار - مايو) تتجمع في عناقيد صغيرة طرفية.

الجزء الطبي: الأطراف المزهرة

المواد الفعالة: تانين، راتنج، جكلوسيد Luteolin, 6-Hydroxy: 7-O-Beta-D- . ومواد كاربوهيدراتية. Mannitol* تربينات ايرودية Catalpol* وستيرويدات

* Sitosterol, Beta: وفلافيونيدات Cynaroside*

الأثر الطبي: منق للدم، طارد للبلغم، مدر للحليب، هاضم، شاف للجروح. مقوى عام يستخدم لأمراض الكبد وكهاضم

الملاحظات: * في القرن السادس عشر الميلادي استخدمت علاج للسل الرئوي.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

- V. agrestis*
- V. americana*
- V. apylla*
- V. arvensis*
- V. beccabunga*
- V. catenata*
- V. chamaedrys*
- V. comosa*
- V. copelandii*
- V. cusickii*
- V. cymbalaria*
- V. filiformis*
- V. frutitosa*
- V. fruticans*
- V. gentianoides*



(292)

فيبرن

الاسم اللاتيني: *Viburnum lantana* L.

الاسم الإنكليزي: Wild tree baie

الأسماء الأخرى: فيبرني

العائلة: البلسانيات Caprifoliaceae

موطن النبات: سهول شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: شجيرة ارتفاعها 3 أمتار، الأغصان ملبدة تغطيتها شعيرات بنية نجمية، الأوراق سميقة متقابلة مسننة، الأزهار (نيسان - ابريل) صغيرة على شكل خيمة، الثمرة مسطحة خضراء ثم حمراء فسوداء عند النضج.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: حامض Viburnique

الأثر الطبي: قابض، منعش

الملاحظات: * الأنواع الأخرى لنفس الجنس

V. nudum
V. opulus
V. parvifolium
V. plicatum
V. prunifolium
V. rufidulum
V. sargentii
V. tinus



(293)

بلسان الماء

الاسم اللاتيني: *Viburnum opulus* L.

(*Opulus Glandulosa*, *Opulus Vulgaris*, *Viburnum Lobatum*, *Viburnum Trilobum*)

الاسم الإنكليزي: Common Snowball ,European Cranberry Bush
Wild tree baie

الأسماء الأخرى: الفيرن البيلسانى، خمان الماء، كرة الثلج، أفلوس، نبات الرباط، الرباطية.

العائلة: البلسانيات Caprifoliaceae

موطن النبات: سهول شرق البحر المتوسط

الوصف النباتي: شجيرة ارتفاعها 4 أمتار، لها قشرة بنية لامعة تتحول إلى صفراء - بنية مشققة بشكل طولي، الأوراق متقابلة، ذات آذنان دقيقة مقسمة إلى ثلاث فصوص مسننة، الأزهار بيضاء (أيار - مايو) تتجمع على شكل خيمة، الثمرة عنبية حمراء فيها بذرة واحدة.

الجزء الطبي: القشرة المجففة

المواد الفعالة: راتنج، حوامض، سكريات، تانين، جكلوسيد. فايتمينات ج و ك كارتيونيد
Carotene, Beta: * Lycopene * Carotenoid
Polysaccharide * Arabinose, L
Quercetin * ستيرويدات
Campesterol * تربينات ثلاثية
Oleanolic Acid Glucoside

وتربينات إيرودية * Opulus Iridoid I وكيومارين * Scopoletin

الأثر الطبي: مضاد للتشنج، مهدئ، لعلاج الذبحة الحلقية، لعلاج اللثة المتقرحة. للسكري وحصى الكلى و مضاد للمقصف وللنزيف المهبلي وللإجهاض.

الملاحظات: * الثمرة الحمراء سامة للإنسان، غير سامة للعصافير.

* في ألمانيا حضر من الأوراق دواء (Herba Viburni opuli) لتنظيم العادة الشهرية.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

V. acerifolium
V. carlesii
V. davidii
V. dentatum
V. dentatum
V. edule
V. ellipticum
V. furcatum
V. globosum
V. lantana
V. lantanoides



(294)

الونكة

الاسم اللاتيني: *Vinca major* L.

الاسم الإنكليزي: Pervenche, Periwinkle,

الأسماء الأخرى: العناقية، زهرة العناق

العائلة: الدفلية Apocynaceae

موطن النبات: غابات حوض البحر المتوسط

الوصف النباتي: نباتات معمرة ارتفاعها 20 سم، الساق مدادة حتى 3 أمتار، الأوراق متقابلة

بيضاوية لماعة دائمة، الأزهار بنفسجية (شباط - فبراير) لها خمس كأساء، الثمرة

جرابيه، فيها عدة بذور.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: سكريات، أملاح معدنية، حوامض عضوية، تانين، قلويدات Vincine

* Lirioresinol B * Lignan * Reserpinine * Akuammine * لجنان

ومواد كاربوايدراتية * Dambonitol * فلافينويد * Glucopyranoside

Flavonol تربينات ايرودية * Iridoid Monoterpene * Loganic Acid

الأثر الطبي: مضاد للسكري، قابض، موقف لإفراز الحليب، خافض للضغط، شاف للجروح.

للطفح الجلدي وللصداع ومسبب للإجهاض.

الملحوظات:

* أنواع أخرى لنفس الجنس *V. herbacea* و *V. minor*



(295)

الدبق

الاسم اللاتيني: *Viscum album* L.

الاسم الإنكليزي: Mistletoe

الأسماء الأخرى: هدا، خرطان، زرق الطير

العائلة: الدبقية Loranthaceae

موطن النبات: غرب وجنوب البحر الأحمر

الوصف النباتي: نباتات طفيلية ارتفاعها 50 سم، تنمو على الأشجار والشجيرات، سيقانها

خضراء مفصلية على شكل باقات دائرية متقابلة لحمية شوكية، الأزهار صفراء-

خضراء (آذار - مارس)، الثمرة بيضاء مستديرة لها لب لزج، الجذور تمتد إلى

النسيج الحي للأغصان التي تنمو عليها.


الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: Cholin و Acetylcholin و Viscotoxin Urson

الأثر الطبي: مضاد للتشنج، مدر للبول، خافض للضغط، مفرغ،

الملاحظات:

* في ألمانيا صنع من هذا النبات عقار (Herba Visci) يستخدم لعلاج تصلب الشرايين.



(296)

كف مريم

الاسم اللاتيني: *Vitex rotundifolia*

الاسم الإنكليزي: Gattilie, Round-Leaf Vitex

الأسماء الأخرى: بنجي كشت، فيتكس، شجرة إبراهيم.

العائلة: الفربيونية Verbenaceae

موطن النبات: شرق حوض البحر المتوسط.

الوصف النباتي: نباتات عشبي ارتفاعه 4 أمتار، الأوراق خضراء متقابلة معنقة، الأزهار

مدورة على الساق بنفسجية (حزيران - يونيو)، الثمرة تشبه ثمار الفلفل

الجزء الطبي: المجموع الخضري

المواد الفعالة: زيت عطري تربينات ثنائية Ferruginol * Diterpene وتربينات ايرودية

Eucommiol وفلافينويد Chrysosplenol * Flavonol وليجنان

Conidendrin, Detetrahydro: * Lignan

الأثر الطبي: هاضم، مخفف لنزلات البرد، مخمد للقوة الجنسية. للصداع و قابض

الملحوظات: * أنواع أخرى لنفس الجنس *V. cooperi* و *V. cymosa*



(297)

العنب

الاسم اللاتيني: *Vitis vinifera* L.

الاسم الإنكليزي: Grapes, Anab, Zabib

(Inab) ، Raisin

الأسماء الأخرى: الكروم، الكرمة، الحبله، دالية، زون، عرائش، زرجون، أنبالس، وين.

(الأخضر - حصرم) و(الجاف-زبيب)

العائلة: الكرمية (الكرميات) Vitaceae

موطن النبات: شرق البحر المتوسط وينتشر اليوم في جميع أنحاء العالم.

الوصف النباتي: شجرة متسلقة، سيقانها رفيعة تمتد إلى 10 أمتار، الأوراق متساقطة كبيرة

كفيه، الأزهار عنقودية تتحول إلى الثمار البيضاء والسوداء والحمراء (حسب

النوع)

الجزء الطبي: الثمار و الأوراق

المواد الفعالة: سكريات، تانين، حوامض حرة، فيتامين(H). فلافينويد * Procyanidin c-1

Spermidine * Paeonidin-3-O-Acetyl-Glucoside وقلويدات *

Alkaloid * وستيرويدات * Stigmasterol وتربينات احادية Limonene

* ثنائية و سيسكوتيربينية Jasmonic Acid وتربينات ثلاثية

Viniferone C * Triterpene * Taraxasterol ومركبات أكسجينية *

Oxygen Heterocycle ومركبات أمينية-Vitis Arabinogalactan

Protein Ag-P * Proteid وكاروتينويةViolaxanthin *

ستابلين Resveratrol * Stilbene

الأثر الطبي: ملين، مدر للبول، يخفف نسبة حمض البوليك في الدم، حفظ سلامة الكبد وتنشيط

وظائفه، علاج للزهايمر وتقليل الإصابة بالخرف، للوقاية من آلام اللثة وتساقط

الأسنان، يفتح الشهوة الجنسية، لعلاج السعال، لعلاج العلل القلبية وارتفاع ضغط

الدم وتخفيض كوليسترول الدم. مدر للطمث ولعلاج آلام الروماتيزم.

- V. amurensis*
- V. arizonica*
- V. californica*
- V. girdiana*
- V. labrusca*
- V. riparia*
- V. rotundifolia*
- V. rotundifolia*
- V. rupestris*
- V. vinifera*



(298)

حسك

الاسم اللاتيني: *Xanthium strumarium*

(*Xanthium Chinense*)

الاسم الإنكليزي: Lesser burdock , Louse, Bur weed , Cockle Bur
الأسماء الأخرى: شبيط، لزيج، منج الماء، باندجان بري، خروع بري، حشيشه الخنزيرة،
خذني معاك.

العائلة: المركبة Asteraceae

موطن النبات: ضفاف الأنهار في أنحاء الوطن العربي
الوصف النباتي: حوليات برية عشبية، لها أوراق كبيرة متعاقبة معنقة تشبه أوراق العنب،
الأزهار عثكولية التجمع، محورية الارتكاز (أيار - مايو) تنتج بذور ذات أشواك.

الجزء الطبي: البذور

المواد الفعالة: Xanthostrumarin , Xauthostrumin قلويدات * Choline

Xanthanol * Alkaloid-Misc فلافينويدات Kaempferol سيسكوتيربين * Xanthanol

وستيرويدات * Daucosterol مواد كاربوهيدراتية * Glucose * Fructose

* إلى جانب مواد غير عضوية * Cl * KCl * K₂so₄

الأثر الطبي: لعلاج الجدري وداء الخنازير والسرطان مقوى عام مهدئ ولامراض الكبد
والمالاريا والتهابات المجارى البولية.

الجزء السام: بادرات النبات.

السمية: الإنسان والماشية.

أعراض التسمم: إسهال شديد و فقدان القدرة على المشي و انخفاض حاد في درجة حرارة
الجسم. إكتئاب، ضعف عام انخفاض عام في الحرارة زيادة في ضربات القلب
والتنفس والموت بعد ساعات قليلة، المادة السامة هيدروكينون

Hydroquinone.

العلاج: إبعاد الحيوان عن المناطق الموبوءة وعند الإصابة الشديدة يفضل ذبح الحيوان.

الملحوظات: نوع آخر لنفس الجنس

X. spinosum



(299)

إبرة دم

الاسم اللاتيني: *Yucca filamentosa*

الاسم الإنكليزي: Soap weed و Adams needle

الأسماء الأخرى: يوكا

العائلة: الزنبقية Liliaceae

موطن النبات: شمال أفريقيا

الوصف النباتي: شجيرة تشبه الصبريات، الأوراق سميكة صلبة طويلة لها أطراف حادة أبرية، الأزهار بيضاء كبيرة الحجم توجد على هيئة نورة طويلة طرفية في شمراخ زهري طويل، والثمرة علبة تتفتح تفتحا حازبيا.

الجزء الطبي: الأوراق

المواد الفعالة: جلوكوسيد Steroidal Saponine و Barbalion ويحتوى على

الكالسيوم والفوسفور وفيتامينات (A و C). مواد صابونية * Yuccoside C

* Gitogenin * Hecogenin.

الأثر الطبي: مدر للبول، مدر للطمث، علاج للصدفية والأكزيما، عصير الأوراق لائم للجروح والالتهابات الجلدية.

الملحوظات: * تم تصنيع بعض مركبات الكورتيزون من هذا النبات.

* أنواع أخرى لنفس الجنس

Y. aloifolia

Y. arkansana

Y. brevifolia

Y. elata

Y. faxoniana

Y. gloriosa

Y. rostrata

Y. schidigera

Y. smalliana

Y. treculeana

Y. angustissima

Y. baccata

Y. constricta

Y. elephantipes

Y. glauca

Y. louisianensis

Y. rupicola

Y. shidigera

Y. torreyi

Y. whipplei



(300)

زنجبيل

الاسم اللاتيني: *Zingiber officinale*

الاسم الإنكليزي: Ginger، Zingiber، Gingembre

الأسماء الأخرى: جنزبيل، فتائل الرهبان، عرق حار، عوق حار، أدرك.

العائلة: الزنجبيلية Zingiberaceae

موطن النبات: جنوب شرق آسيا.

الوصف النباتي: نبات معمر، أوراقه رمحية، الأزهار صفراء ذات شفاة أرجوانية، الجذور رايزومية وهي عروق عقدية ولونها إما سنجابي أو أبيض مصفر وله رائحة نفاذة مميزة طيبة يعرف بها.

الجزء الطبي: الرايزومات

المواد الفعالة: 10 % ماء، 8 % بروتين، 50% نشأ، 8 % رماد، 3 % اليف، وعناصر غذائية (كالسيوم وفسفور وحديد) وThiamin وRiboflavin وNiacin وفيتامين (C) وزيت طيارة 4 % (Sesquiterpene Hydrocarbons) وهي المركبات المسؤولة عن الرائحة الاروماتية للزنجبيل ومركبات الهيدوكاربون السسكوأيتربينية ومركب Zingiberene وCucumene و Basabolene وSesquiphellandrene وكحولات والدهيدات احادية التربين Monoterpene aldehydes وAlcohols وهي المركبات المسؤولة عن الطعم المميز للزنجبيل وتضم هذه المركبات مشتقات كثيرة لمركب Gingerol ومركبات Gingerol مزالة الهيدروجين التي تسمى مركبات (Shogaols) ومركبات اخرى Eucalypylol وCamphene وGeronial وLinalool وBorneol وOlearesin وCitral وZingiberol وZingerone واسترت حامض الخليك وMethyl heptenone وعند تحليل بروتينات الزنجبيل تبين انها تضم حامض الارجنين وحامض الاسبارتيك والسستين والكلايسين والايزوليوسين والسيرين والثريولين والفالين والبرولين.

الأثر الطبي: يخفف نوبات الصداع، لتقوية الذاكرة وللحفظ وعدم النسيان، لعلاج العشى الليلي، للدوخة ودوار البحر وتقوية النظر، لعلاج بحة الصوت وطرث البغم والزكام وصعوبة التكلم، للأرق والقلق، للتبدل الذهني، للقولون العصبي، ملين، لضعف الكبد وكسله، لعلاج لسعة الحشرات، لعلاج تصلب المفاصل والفقرات، لتقوية القلب وتنشيط الدورة الدموية وإذابة الكولسترول، لعلاج التوتر العصبي، للقوة التناسلية، لعلاج صفرة الوجه، لعرق النساء، لجلطة الدماغ وزيادة تدفق الدم، لتوسيع الأوعية الدموية، مدر للبول، علاج عسر الهضم.



* أنواع الزنجبيل زنجبيل بلدي وهو الراسن - زنجبيل شامي - زنجبيل العجم- زنجبيل فارسي- زنجبيل الكلاب - زنجبيل هندي، وهو المعروف المستعمل، ويسمى بالكفوف.

*Zingiber
macradenia*



Zingiber spectabile



Zingiber zerumbet



جدول (1): فهرس النباتات الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربي مرتبة حسب الأسماء اللاتينية

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
1	بروس	Fabaceae	<i>Abrus precatorius</i> L.
2	رجل الدب	Acanthaceae	<i>Acanthus mollis</i> L.
3	خانق الذنب، أقونيظ	Ranunculaceae	<i>Aconitum napellus</i> L.
4	قصب الذريرة	Acoraceae	<i>Acorus calamus</i> L.
5	بلسانية	Ranunculaceae	<i>Actaea spicata</i> L.
6	بلوط بري، أبو فروة، كستناء الجبل	Hippocastanaceae	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.
7	بقدونس كاذب	Apiaceae	<i>Aethusa cynapium</i> L.
8	برجمان	Asteraceae	<i>Ageratum conyzoides</i> L.
9	غافت	Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.
10	نجل	Poaceae	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould <i>Agropyrum repens</i> (L.) P.Beauv.
11	القرنفل البري، خرم حنطة	Caryophyllaceae	<i>Agrostemma githago</i> L.
12	شجرة السما	Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle
13	رجل الأرنب، قدم أسد	Rosaceae	<i>Alchemilla vulgaris</i> L.
14	ألماندا	Apocynaceae	<i>Allamanda cathartica</i> L.
15	الحشيشة الثومية	Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande <i>Alliaria officinalis</i> Andrzej. ex M.Bieb.
16	الخولنجان الصيني	Zingiberaceae	<i>Alpinia officinarum</i> Hance
17	الستونيا	Apocynaceae	<i>Alstonia constricta</i> F. Muell.
18	الشنآن	Chenopodiaceae	<i>Anabasis articulata</i>

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
			(Forssk.) Moq.
19	الكازو	Anacardiaceae	<i>Anacardium officinarum</i> Gaertn.
20	خروب الخنزير	Fabaceae Papilionaceae	<i>Anagyris foetida</i> L.
21	ساق الحمام	Boraginaceae	<i>Anchusa azurea</i> Mill. <i>Anchusa italica</i> Retz.
22	رجل الهر، رجل قط	Asteraceae	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.
23	زهرة السباع، بابونج روماني	Asteraceae	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. <i>Anthemis nobilis</i> L.
24	بقونس افرنجي، كرفس رومي	Apiaceae	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.
25	برسيم اصفر	Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.
26	حلق السبع، حنك السبع، أبو فم	Scrophulariaceae	<i>Antirrhinum majus</i> L.
27	خوشان	Apocynaceae	<i>Apocynum cannabinum</i> L.
28	الاخليا	Ranunculaceae	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.
29	مشمش بري، قطلب	Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i> L.
30	أرططين، أرططيون	Asteraceae	<i>Arctium lappa</i> L.
31	عنب الدب	Ericaceae	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.
32	نخل فوفل	Arecaceae Palmae	<i>Areca catechu</i> L.
33	زراوند	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia maurorum</i> L.
34	فجل الحصان	Brassicaceae	<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn. <i>Armoracia lapathifolia</i> Gilib. ex Usteri.

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
35	زهرة العطاس	Asteraceae	<i>Arnica montana</i> L.
36	لوف ابقع	Araceae	<i>Arum maculatum</i> L.
37	غاب، قصب زل، بوص	Poaceae	<i>Arundo donax</i> L.
38	الناردين البري	Aristolochiaceae	<i>Asarum europaeum</i> L.
39	سبع الأرض	<u>Aspleniaceae</u>	<i>Asplenium antiquum</i> Makino
40	الشوفان	Poaceae	<i>Avena sativa</i> L.
41	سنديان الأرض	Lamiaceae	<i>Ballota foetida</i> Lam.
42	البوكو	Rutaceae	<i>Agathosma betulina</i> (P. J. Bergius) Pillans
43	بنونيا	Bignoniaceae	<i>Bignonia capreolata</i> L.
44	زهرة الربيع، لؤلؤة	Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> L.
45	السلق	Chenopodiaceae	<i>Beta vulgaris</i> L.
46	قنب مائي	Asteraceae	<i>Bidens tripartita</i> L.
47	لسان الثور	Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i> L.
48	البداليا، ليك، ذيل الهر	Buddleiaceae	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.
49	اكثار	Apiaceae	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.
50	الكتم، شمشير	<u>Buxaceae</u>	<i>Buxus sempervirens</i> L.
51	نعناع الجبل، ريحان بري، ريحان قرنقلي	Lamiaceae	<i>Calamintha officinalis</i> Moench.
52	حشيشة المكنسة	Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull
53	الشاي	Theaceae	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze
54	جريس، زهر جرس	Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i> L.
55	قرد مانا	Brassicaceae	<i>Cardamine pratensis</i> L.
56	أقسون	Asteraceae	<i>Carlina acaulis</i> L.
57	الكستناء	Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Mill.
58	عرق الذهب	Rubiaceae	<i>Psychotria ipecacuanha</i> (Brot.) Standl.

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
			<i>Cephaelis ipecacuanha</i> (Brot.) A.Rich.
59	دار فلفل	Piperaceae	<i>Chavica officinarum</i> Miq.
60	المنثور	Brassicaceae	<i>Cheiranthus cheiri</i> (L.) Crantz <i>Cheiranthus cheiri</i> L.
61	سيكران	Apiaceae	<i>Cicuta virosa</i> L.
62	الكينا، سنكونا، شجر الحمى	Rubiaceae	<i>Cinchona officinalis</i> L.
63	الكافور	Lauraceae	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl
64	دارسين، قرفة هندية	Lauraceae	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume
65	ياسمين بري	Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> L.
66	الشوكة المباركة، شوك مريمي	Asteraceae	<i>Cnicus benedictus</i> L.
67	حشيشه الملاحق	Brassicaceae	<i>Cochlearia officinalis</i> L.
68	الكولا	Sterculiaceae	<i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott & Endl.
69	سنا برية	Fabaceae	<i>Colutea arborescens</i> L.
70	العائق	Ranunculaceae	<i>Consolida regalis</i> Gray
71	زنبق الوادي	Asparagaceae Liliaceae	<i>Convallaria majalis</i> L.
72	الكوببية	Fabaceae	<i>Copaifera officinalis</i> (Jacq.) L.
73	اكيل	Fabaceae	<i>Coronilla varia</i> (L.) Lassen <i>Coronilla varia</i> L.
74	شجرة البندق	Betulaceae	<i>Corylus avellana</i> L.
75	أشران	Crassulaceae	<i>Cotyledon orbiculata</i> L.

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
76	ورد حوذان	Asteraceae	<i>Crepis foetida</i> L.
77	الشمار البحري	Apiaceae	<i>Crithmum maritimum</i> L.
78	كوسة، اليقطين	Cucurbitaceae	<i>Cucurbita pepo</i> L.
79	الحامول	Cuscutaceae	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.
80	لقلاف الزعتر	Cuscutaceae	<i>Cuscuta planiflora</i> Ten.
81	السفرجل	Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.
82	لسان الكلب	Boraginaceae	<i>Cynoglossum officinale</i> L.
83	هالوك مالطا	Cynomoraceae	<i>Cynomorium coccineum</i> L.
84	الجنستاء رتم	Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link
85	الدريس	Fabaceae	<i>Derris elliptica</i> (Wall.) Benth.
86	سمارة	Brassicaceae	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl
87	الريدار الأبيض	Rutaceae	<i>Dictamnus albus</i> L.
88	دقتمون ابيض	Rutaceae	<i>Dictamnus albus</i> L.
89	الديفنباخيا	Araceae	<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott <i>Dieffenbachia picta</i> Schott
90	ديوسمه	Rutaceae	<i>Diosma hirsuta</i> L.
91	الدراج	Dipsacaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Huds.) Clapham <i>Dipsacus sylvestris</i> Huds.
92	شجرة النشادر	Apiaceae	<i>Dorema ammoniacum</i> D. Don
93	النديّة	Droseraceae	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
94	الحورية	Rosaceae	<i>Dryas octopetala</i> L.
95	سرخس ذكر	Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott
96	الزيفون	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
97	الهيل، حبهان	<u>Zingiberaceae</u>	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton
98	ذيل الفرس، ذنب الخيل	<u>Equisetaceae</u>	<i>Equisetum arvense</i> L.
99	الكوكا	<u>Erythroxylaceae</u>	<i>Erythroxylum coca</i> Lam.
100	خد البنت	<u>Asteraceae</u>	<i>Eupatorium capillifolium</i> (Lam.) Small
101	العرقون، عشبة رمد، حشيشة العيون	<u>Scrophulariaceae</u>	<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm. <i>Euphrasia officinalis</i> L.
102	مضاض	<u>Celastraceae</u>	<i>Euonymus europaeus</i> L.
103	الحنطة السوداء	<u>Polygonaceae</u>	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench
104	زان، خشب زان	<u>Fagaceae</u>	<i>Fagus sylvatica</i> L.
105	كف السبع	<u>Ranunculaceae</u>	<i>Ficaria ranunculoides</i> Roth
106	ملكة المروج	<u>Rosaceae</u>	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.
107	العوسج الاسود	<u>Rhamnaceae</u>	<i>Frangula alnus</i> Mill.
108	لسان العصفور	<u>Oleaceae</u>	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl
109	أكليل الملك	<u>Liliaceae</u>	<i>Fritillaria imperialis</i> L.
110	التوت البري، فراولة	<u>Rosaceae</u>	<i>Fragaria vesca</i> L.
111	الفوقس	<u>Fucaceae</u>	<i>Fucus vesiculosus</i> L.
112	الزهرة المدرة	<u>Fabaceae</u>	<i>Galega officinalis</i> L.
113	رأس الهر	<u>Lamiaceae</u>	<i>Galeopsis dubia</i> Leers
114	غاليون، بقلة حليب	<u>Rubiaceae</u>	<i>Galium verum</i> L.
115	عنب القطا	<u>Ericaceae</u>	<i>Gaultheria procumbens</i> L.
116	عشبة مرة، جنثيانا	<u>Gentianaceae</u>	<i>Gentiana lutea</i> L.
117	إبرة الراعي، خبيزة، جيرانيوم	<u>Geraniaceae</u>	<i>Geranium robertianum</i> L.
118	الحشيشة المباركة	<u>Rosaceae</u>	<i>Geum urbanum</i> L.

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
119	جبلينية	Rosaceae	<i>Gillenia trifoliata</i> (L.) Moench
120	الجنكة	Ginkgoaceae	<i>Ginkgo biloba</i> L.
121	لبلاب ارضي	Lamiaceae	<i>Glechoma hederacea</i> L.
122	الكوندور	<u>Apocynaceae</u>	<i>Gonolobus condurango</i> Decne.
123	عشبة الفقراء، حشيشة الفقراء	Scrophulariaceae	<i>Gratiola officinalis</i> L.
124	الغرينداليا، عشبة الفقراء	Asteraceae	<i>Grindelia camporum</i> Greene <i>Grindelia robusta</i> Nutt.
125	عود الأنبياء، خشب القديس	Zygophyllaceae	<i>Guaiaacum sanctum</i> L.
126	شالموجرا	Flacouriacede	<i>Gynocardia odorata</i> R. Br.
127	كوسو	Rosaceae	<i>Hagenia abyssinica</i> (Bruce) J. F. Gmel.
128	بندق الساحرة، مشتركة	Hamamelidaceae	<i>Hamamelis virginiana</i> L.
129	طاقية	Asteraceae	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench
130	خربق اسود	Ranunculaceae	<i>Helleborus niger</i> L.
131	حشيشة الكبد	Ranunculaceae	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.
132	رجل الدب، هرقلية، سفندليون	Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> L.
133	حشيشه الفتق	Illecebraceae	<i>Herniaria glabra</i> L.
134	زهرة المساء، بنفسج السيدات	Brassicaceae	<i>Hesperis matronalis</i> L.
135	أذان الفيل، حشيشة غراب	Asteraceae	<i>Hieracium pilosella</i> L.
136	أبو فايس، هفوف،	Elaeagnaceae	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
	غاسول رومي		
137	الشعير	Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i> L.
138	ختم/خاتم الذهب	Ranunculaceae	<i>Hydrastis canadensis</i> L.
139	اشنان داود، شاي جبلي، حشيشة القدس	Lamiaceae	<i>Hyssopus officinalis</i> L.
140	شجرة الدبق، عود خير	Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L.
141	شاي المته، شاي باراغواي	Aquifoliaceae	<i>Ilex paraguariensis</i> St. Hil.
142	الجاذبة	Illiciaceae	<i>Illicium anisatum</i> L.
143	جلب	Convolvulaceae	<i>Ipomoea purga</i> (Wender.) Hayne
144	عين الحصان	Asteraceae	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter <i>Inula graveolens</i> (L.) Desf.
145	الجوز، عين الجمل	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.
146	جوز كالابار	Acanthaceae	<i>Justicia adhatoda</i> L.
147	الراتانيا	Krameriaceae	<i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B. B. Simpson <i>Krameria triandra</i> Ruiz & Pav.
148	أبنوس كاذب	Fabaceae	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.
149	القريص الأبيض	Lamiaceae	<i>Lamium album</i> L.
150	حشيشة الأثداء	Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> L.
151	أكليل الجبل	Ericaceae	<i>Ledum palustre</i> Harmaja

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
188	السحلب	Orchidaceae	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.
189	أسد العدس	Orobanchaceae	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm. <i>Orobanche major</i> L.
190	شاي جاوا	Lamiaceae	<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.
191	أرز، رز	Poaceae	<i>Oryza sativa</i> L.
192	السرخس الملكي، أوزمنده	Osmundaceae	<i>Osmunda regalis</i> L.
193	الجانسغ / الجينسغ	Araliaceae	<i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. <i>Panax schinseng</i> T. Nees
194	زهرة الساعة، زهرة الآلام	Passifloraceae	<i>Passiflora incarnata</i> L.
195	رئة العجل	Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i> L.
196	الافوكاتو	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill. var. <i>americana</i> <i>Persea gratissima</i> C. F. Gaertn.
197	حشيشة القرعان	Asteraceae	<i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn.
198	شمار الخنازير	Apiaceae	<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W. D. J. Koch
199	عنب الثعلب، عوامات، قلب الهوى	Solanaceae	<i>Physalis alkekengi</i> L.
200	جaborاندي	Rutaceae	<i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes
201	لسان الاوز	Lentibulariaceae	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.
202	الصنوبر الحرجي، صنوبر الغابات	Pinaceae	<i>Pinus sylvestris</i> L.
203	الصنوبر البحري	Pinaceae	<i>Pinus pinaster</i> Aiton

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
204	زقيم	Araceae	<i>Pistia stratiotes</i> L.
205	دلب	Platanaceae	<i>Platanus occidentalis</i> L.
206	أحشيصة الرصاصية	Plumbaginaceae	<i>Plumbago europaea</i> L.
207	التيوبروز، زنبق عروس	Agavaceae	<i>Polianthes tuberosa</i> L.
208	عنبر غالي، مستدرة	ceae Polygala	<i>Polygala vulgaris</i> L.
209	خاتم سليمان	Convallariaceae	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce <i>Polygonatum officinale</i> All.
210	أضراس الكلب، سرخس	Polypodiaceae	<i>Polypodium vulgare</i> L.
211	حشيشة الاوز، حشيشة قلب	Rosaceae	<i>Potentilla anserina</i> L.
212	الخمس ورقات	Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.
213	صند هندي	Fabaceae	<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq.
214	زهرة الربيع	Primulaceae	<i>Primula veris</i> L.
215	السمراء	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.
216	اللوذ	Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb <i>Prunus amygdalus</i> Batsch
217	أجاص، خوخ، برقوق	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i> L.
218	البرقوق، خوخ شائك	Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L.
219	كرز بري	Rosaceae	<i>Prunus virginiana</i> L.
220	حشيشة/عشبة الرئة	Boraginaceae	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.
221	زهرة الفصح	Ranunculaceae	<i>Anemone pulsatilla</i> L. <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.
222	العرموط	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> Borkh.

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
			<i>Pyrus malus</i> L.
223	البلوط	Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.
224	قلف الصابون	Rosaceae or Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina
225	الراتانيا	Apocynaceae	<i>Rauwolfia serpentina</i> Benth.
226	النبق المسهل	Rhamnaceae	<i>Rhamnus cathartica</i> L.
227	سماق، حشيشة الدباغين	Anacardiaceae	<i>Rhus coriaria</i> L.
228	الكشمش الاحمر	Grossulariaceae	<i>Ribes rubrum</i> L.
229	الخروع	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.
230	الحاذ الشوكي	Chenopodiaceae	<i>Salsola kali</i> L.
231	عرق الدم	Rosaceae	<i>Sanguisorba canadensis</i> L.
232	المرقنة	Rosaceae	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.
233	شافية، حشيشة صحة، عشبة القديس	Apiaceae	<i>Sanicula europaea</i> L.
234	الصندل الأبيض	Santalaceae	<i>Santalum album</i> L.
235	علاج	Asteraceae	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.
236	عرق الحلاوة، صابونية	Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i> L.
237	فول العرب	Caryophyllaceae	<i>Saponaria vaccaria</i> L.
238	بوقية	Sarraceniaceae	<i>Sarracenia minor</i> Walter
239	الساسفراس	Lauraceae	<i>Sassafras albidum</i> (Nutt.) Nees <i>Sassafras officinale</i> Nees & C. H. Eberm.
240	حبة الماش	Saxifragaceae	<i>Saxifraga granulata</i> L.
241	اشقيل	Hyacinthaceae	<i>Scilla maritima</i> (L)

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
242	عشبة البواسير	Scrophulariaceae	<i>Scrophularia nodosa</i> L.
243	مرير، دبح زراعي	Asteraceae	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
244	الشيلم، جويدار	Poaceae	<i>Secale cereale</i> L.
245	يقطوم	Crassulaceae	<i>Sedum telephium</i> (L.) H. Ohba
246	أنبوب الراعي	Crassulaceae	<i>Sempervivum tectorum</i> L.
247	كعيب	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.
248	قصب مر	Simaroubaceae	<i>Simarouba amara</i> Aubl.
249	فجل الجمال، عشبة المغنين	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.
250	صبرين	Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i> L.
251	سكرجا	Primulaceae	<i>Soldanella alpine</i> L.
252	عصا الذهب	Asteraceae	<i>Solidago virgaurea</i> L.
253	غبيرة بريّة	Rosaceae	<i>Sorbus aucuparia</i> L.
254	حليان، رزين	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
255	الوزال	Fabaceae	<i>Spartium junceum</i> L.
256	زهرة الرمال	Caryophyllaceae	<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.
257	القسطران	Lamiaceae	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.
258	قزازة	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.
259	ستروفانس	Apocynaceae	<i>Strophanthus hispidus</i> DC.
260	كيورير	Loganiaceae	<i>Strychnos toxifera</i> M. R. Schomb. ex Benth.
261	لبان الحاوي	Styracaceae	<i>Styrax benzoin</i> Dryand.
262	رأس الذئب	Dipsacaceae	<i>Succisa praemorsa</i> Asch.

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
263	اذن الحمار	Boraginaceae	<i>Symphytum officinale</i> L.
264	الليك	Oleaceae	<i>Syringa vulgaris</i> L.
265	قرنفل التوابل	Myrtaceae	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L. M. Perry
266	القטיפفة	Asteraceae	<i>Tagetes erecta</i> L.
267	الكرم البري، كرمه سوداء	Dioscoreaceae	<i>Tamus communis</i> (L.) Caddick & Wilkin <i>Tamus communis</i> L.
268	حشيشة الدود	Asteraceae	<i>Tanacetum vulgare</i> L.
269	هندباء برية	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg. Aggr.
270	زرنب، طقسوس	Taxaceae	<i>Taxus baccata</i> L.
271	الكاكاو	Sterculiaceae	<i>Theobroma cacao</i> L.
272	عقص	Cupressaceae	<i>Thuja occidentalis</i> L.
273	شرعوب	Plumbaginaceae	<i>Tordylium officinale</i> L.
274	لحية التيس	Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> L.
275	نفل	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i> L.
276	القمح	Poaceae	<i>Triticum aestivum</i> L.
277	الزهرة الكروية	Ranunculaceae	<i>Trollius europaeus</i> L.
278	أبو خنجر، أم الدروع، طرطور الباشا	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum majus</i> L.
279	الكمأة	Tuberaceae	<i>Tuber albidum</i> Pico (This is fungus)
280	شابق	Turneraceae	<i>Turnera panamensis</i> Urb.
281	حشيشة السعال	Asteraceae	<i>Tussilago farfara</i> L.
282	السندب	Lentibulariaceae	<i>Utricularia vulgaris</i> L.
283	عرق الذهب	Rubiaceae	<i>Psychotria ipecacuanha</i> (Brot.) Stokes

رقم النبات	الاسم العربي	العائلة	الاسم اللاتيني
			<i>Uragoga ipecacuanha</i> (Brot.) Baill.
284	عنب الدب، عنبية	Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.
285	عنبية	Ericaceae	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.
286	الناردين	Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> L.
287	خس النعجة، فاليريان، ناردين	Valerianaceae	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. <i>Valerianella olitoria</i> (L.) Pollich
288	الخروب، فانيلية	Orchidaceae	<i>Vanilla planifolia</i> Andrews
289	خربق	Liliaceae	<i>Veratrum album</i> L.
290	زهرة الحواشي المائية	Scrophulariaceae	<i>Veronica beccabunga</i> L.
291	زهرة الحواشي، عشبة برص	Scrophulariaceae	<i>Veronica officinalis</i> L.
292	فيبرن	Caprifoliaceae	<i>Viburnum lantana</i> L.
293	بلسان الماء	Caprifoliaceae	<i>Viburnum opulus</i> L.
294	الونكة	Apocynaceae	<i>Vinca major</i> L.
295	الدبق	Loranthaceae	<i>Viscum album</i> L.
296	كف مريم	Verbenaceae	<i>Vitex rotundifolia</i> L. f.
297	العنب، كرم	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.
298	حسك	Asteraceae	<i>Xanthium strumarium</i> L.
299	إبرة ادم	Liliaceae	<i>Yucca filamentosa</i> L.
300	زنجبيل، جنزبيل	Zingiberaceae	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe



فريق إعداد الجزء الثاني من
كتاب النباتات الطبية والعطرية والسامة
في الوطن العربي

مدير عام المنظمة والمشرف على إعداد الكتاب.
كلية الزراعة والغابات - جامعة الموصل.
المركز القومي للبحوث - السودان.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

معالي الدكتور / سالم اللوزي
الدكتور / مظفر أحمد الموصل
الدكتور / حسن السبكي خالد
الدكتور / حسن سالم الحسن

